

ஐஐஐசி/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

**NEW**

தமிழ்நாடு தேர்வுகள் திணைக்களம்  
Tamil Nadu Examinations Department

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்  
Sri Lanka Department of Examinations

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තු  
Sri Lanka Department of Examinations

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்  
Sri Lanka Department of Examinations

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020  
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2020  
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

රසායන විද්‍යාව	I
இரசாயனவியல்	I
Chemistry	I

**02 S I**

**பேரே டேவீ**  
இரண்டு மணித்தியாலம்  
*Two hours*

**ငါတို့ရဲ့:**

- \* ආවර්තිතා වගුවක් සපයා ඇත.
- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 09 කින් යුක්ත වේ.
- \* සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- \* ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- \* පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- \* පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් සැලකිලිමත්ව කියවන්න.
- \* 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගෙන, එය පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.

සාර්වත්‍ර වායු නියතය  $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 ඇවගාඩ්රෝ නියතය  $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

ප්ලැන්ක්ගේ නියතය  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$   
 ආලෝකයේ ප්‍රවේගය  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

1. පරමාණුක ව්‍යුහය හා සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන සොයා ගැනීම් සලකන්න.
- කැතෝඩ කිරණ නළය තුළ ධන කිරණ
  - සමහර න්‍යෂ්ටි වර්ග මගින් ඇති කරන විකිරණශීලීතාවය
- ඉහත I සහ II හි සඳහන් සොයා ගැනීම් කළ විද්‍යාඥයන් දෙදෙනා පිළිවෙළින්,
- (1) ජේ. ජේ. තොම්සන් සහ හෙන්රි බෙකරල්
  - (2) එයුජන් ගෝල්ඩ්ස්ටයින් සහ රොබට් මිලිකන්
  - (3) හෙන්රි බෙකරල් සහ එයුජන් ගෝල්ඩ්ස්ටයින්
  - (4) ජේ. ජේ. තොම්සන් සහ අර්නස්ට් රදර්ෆඩ්
  - (5) එයුජන් ගෝල්ඩ්ස්ටයින් සහ හෙන්රි බෙකරල්
2. මැංගනීස් පරමාණුවේ ( $Mn, Z = 25$ )  $l = 0$  සහ  $m_l = -1$  ක්වොන්ටම් අංක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා පිළිවෙළින්,
- (1) 6 සහ 4 වේ. (2) 8 සහ 12 වේ. (3) 8 සහ 5 වේ. (4) 8 සහ 6 වේ. (5) 10 සහ 5 වේ.
3.  $M$  යනු ආවර්තිතා වගුවේ දෙවන ආවර්තයට අයත් මූලද්‍රව්‍යයකි. එය ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණයක් ඇති  $MCl_3$  සහසංයුජ අණුව සාදයි. ආවර්තිතා වගුවේ  $M$  අයත් වන කාණ්ඩය වනුයේ,
- (1) 2 (2) 13 (3) 14 (4) 15 (5) 16
4. පෙරොක්සිනයිට්‍රික් අම්ල අණුවක් (සූත්‍රය  $HNO_4$ ,  $H-\ddot{O}-\ddot{O}-\overset{\overset{:\ddot{O}:}}{\underset{\oplus}{N}}-\ddot{O}^-$ ) සඳහා ඇඳිය හැකි අස්ථායී ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහ සංඛ්‍යාව වනුයේ,
- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5
5. දී ඇති සංයෝගයේ IUPAC නාමය වනුයේ,
- (1) 1-bromo-4-methyl-5-hydroxypent-1-en-3-one
  - (2) 5-bromo-1-hydroxy-2-methylpent-4-en-3-one
  - (3) 1-bromo-5-hydroxy-4-methylpent-1-en-3-one
  - (4) 5-bromo-2-methyl-3-oxopent-4-en-1-ol
  - (5) 1-bromo-4-methyl-3-oxopent-1-enol
- $$HO-CH_2-\overset{\overset{CH_3}{|}}{CH}-\overset{\overset{O}{||}}{C}-CH=CH-Br$$

6.  $O$ ,  $O^{2-}$ ,  $F$ ,  $F^{-}$ ,  $S^{2-}$ ,  $Cl^{-}$  යන ප්‍රභේදවල අරයන් අඩුවන පිළිවෙළ වන්නේ,

- (1)  $S^{2-} > Cl^{-} > O^{2-} > F^{-} > O > F$
- (2)  $S^{2-} > Cl^{-} > O^{2-} > F^{-} > F > O$
- (3)  $Cl^{-} > S^{2-} > O^{2-} > F^{-} > O > F$
- (4)  $Cl^{-} > S^{2-} > F^{-} > O^{2-} > O > F$
- (5)  $S^{2-} > Cl^{-} > O^{2-} > O > F^{-} > F$

7.  $T_1$  (K) උෂ්ණත්වයේදී සහ  $P_1$  (Pa) පීඩනයේදී දෘඪ-සංඛ්‍යා බඳුනක් තුළ පරිපූර්ණ වායුවක මවුල  $n_1$  ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. මෙම බඳුනට තවත් වැඩිපුර වායු ප්‍රමාණයක් ඇතුළු කළ විට නව උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය පිළිවෙළින්  $T_2$  සහ  $P_2$  විය. දැන් භාජනය තුළ ඇති මුළු වායු මවුල ප්‍රමාණය වන්නේ,

- (1)  $\frac{n_1 T_1 P_1}{T_2 P_2}$
- (2)  $\frac{n_1 T_1 P_2}{T_2 P_1}$
- (3)  $\frac{T_2 P_2}{n_1 T_1 P_1}$
- (4)  $\frac{n_1 T_2 P_2}{T_1 P_1}$
- (5)  $\frac{n_1 T_2 P_1}{T_1 P_2}$

8. ආම්ලික  $K_2Cr_2O_7$  ද්‍රාවණයක් භාවිත කර එතනෝල් ( $C_2H_5OH$ ) ඇසිටික් අම්ලය ( $CH_3COOH$ ) බවට ඔක්සිකරණය කිරීමේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී හුවමාරු වන සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව වන්නේ,

- (1) 6
- (2) 8
- (3) 10
- (4) 12
- (5) 14


9. ජලීය NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ඇල්ඩෝල් සංඝනනයට භාජනය විය හැක්කේ පහත දැක්වෙන කුමන සංයෝගය ද?

- (1)  $CH_3\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH$
- (2)  $CH_3\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OCH_3$
- (3)  $H-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OCH_3$
- (4)  $CH_3CH_2\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$
- (5)  $(CH_3)_3C\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-H$

10.  $AX(s)$ ,  $A_2Y(s)$  හා  $AZ(s)$  යනු ජලයෙහි අල්ප වශයෙන් දිය වන ලවණ වන අතර,  $25^\circ C$  දී ඒවායෙහි  $K_{sp}$  අගයන් පිළිවෙළින්  $1.6 \times 10^{-9}$ ,  $3.2 \times 10^{-11}$  සහ  $9.0 \times 10^{-12}$  වේ.  $25^\circ C$  දී  $A^+(aq)$  කැටායනයෙහි සාන්ද්‍රණය අඩුවන පිළිවෙළට මෙම ලවණවල සංතෘප්ත ද්‍රාවණ තුනේ පෙළගැස්ම පහත සඳහන් කුමක් මගින් පෙන්වයි ද?

- (1)  $AX(s) > A_2Y(s) > AZ(s)$
- (2)  $A_2Y(s) > AX(s) > AZ(s)$
- (3)  $AX(s) > AZ(s) > A_2Y(s)$
- (4)  $A_2Y(s) > AZ(s) > AX(s)$
- (5)  $AZ(s) > A_2Y(s) > AX(s)$

11. පහත දැක්වෙන සංයෝග සලකන්න.



සාපේක්ෂ  
අණුක  
ස්කන්ධය

86


86

86

86

88

මෙම සංයෝගයන්හි තාපාංක විචලනය වඩාත්ම හොඳින් පෙන්වනු ලබන්නේ,




12. NaCl, Na<sub>2</sub>S, KF හා KCl යන රසායනික විශේෂවල, සහසංයුජ ලක්ෂණ වැඩිවන පිළිවෙළ වනුයේ,

- (1) KF < NaCl < KCl < Na<sub>2</sub>S
- (2) KCl < NaCl < KF < Na<sub>2</sub>S
- (3) KF < KCl < NaCl < Na<sub>2</sub>S
- (4) Na<sub>2</sub>S < NaCl < KCl < KF
- (5) KF < Na<sub>2</sub>S < NaCl < KCl

13. 298 K දී H<sub>2</sub>(g), C(s) සහ CH<sub>3</sub>OH(l) හි සම්මත දහන එන්තැල්පීන් පිළිවෙළින් -286 kJ mol<sup>-1</sup>, -393 kJ mol<sup>-1</sup> සහ -726 kJ mol<sup>-1</sup> වේ. CH<sub>3</sub>OH(l) හි වාෂ්පීකරණයේ එන්තැල්පිය +37 kJ mol<sup>-1</sup> වේ. 298 K දී වායුමය CH<sub>3</sub>OH මවුල එකක උත්පාදන එන්තැල්පිය (kJ mol<sup>-1</sup>) වන්නේ,

- (1) -276
- (2) -239
- (3) -202
- (4) +84
- (5) +202



14. පහත දක්වා ඇති තුලිත රසායනික සමීකරණයෙන් පෙන්වන ආකාරයට විදුලි උෂ්මකයක් තුළ පොස්පරස් පිළියෙල කරගත හැක.



Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> 620 g, SiO<sub>2</sub> 180 g සහ C 96 g ප්‍රතික්‍රියා කර වූ විට P<sub>4</sub> 50 g ලබා දුනි. මෙම තත්ත්ව යටතේ සීමාකාරී ප්‍රතිකාරකය (සම්පූර්ණයෙන් වැයවන ප්‍රතිකාරකය) සහ P<sub>4</sub> වල ප්‍රතිශත ඵලදාව (% yield) පිළිවෙළින්, (C = 12, O = 16, Si = 28, P = 31, Ca = 40)

- (1) Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> සහ 80.7%
- (2) SiO<sub>2</sub> සහ 80.7%
- (3) C සහ 50.4%
- (4) SiO<sub>2</sub> සහ 40.3%
- (5) C සහ 25.2%


15. එකම තත්ත්ව යටතේදී වෙනත් දෘඪ-සංවෘත භාජන දෙකක් තුළ සිදුවන පහත සමතුලිත දෙක සලකන්න.



මෙම තත්ත්ව යටතේදීම 2H<sub>2</sub>S(g) + N<sub>2</sub>(g) + 3H<sub>2</sub>(g) ⇌ 2NH<sub>4</sub>HS(g) සමතුලිතය සඳහා K<sub>P</sub> වන්නේ,

- (1) 5.76 × 10<sup>-12</sup>
- (2) 7.2 × 10<sup>-10</sup>
- (3) 1.92 × 10<sup>-8</sup>
- (4) 3.40 × 10<sup>-6</sup>
- (5) 3.75 × 10<sup>-2</sup>

16. බ්‍රෝමොබෙන්සීන්හි නයිට්‍රෝකරණ ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී සම්ප්‍රයුක්තතාවය මගින් ස්ථායී වූ කාබොකැටායන අතරමැදි සෑදේ. මෙම අතරමැදියන්හි සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් නොවන්නේ පහත දක්වා ඇති ඒවායින් කුමක් ද?








17. ප්‍රතික්‍රියාවක් කාමර උෂ්ණත්වයේදී හා 1 atm පීඩනයේදී ස්වයංසිද්ධ නොවන අතර එම පීඩනයේදී හා ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී ස්වයංසිද්ධ බවට පත්වේ. කාමර උෂ්ණත්වයේදී මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි වේ ද? (ΔH සහ ΔS, උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය සමග වෙනස් නොවේ යැයි උපකල්පනය කරන්න).

- |     | ΔG  | ΔH  | ΔS  |
|-----|-----|-----|-----|
| (1) | ධන  | ධන  | ධන  |
| (2) | ධන  | සෘණ | සෘණ |
| (3) | ධන  | සෘණ | ධන  |
| (4) | සෘණ | ධන  | සෘණ |
| (5) | සෘණ | සෘණ | සෘණ |

18. ν ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන නියුට්‍රෝනයක ඩිබ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය λ වේ. මෙම නියුට්‍රෝනයේ වාලක ශක්තිය E (E =  $\frac{1}{2}mv^2$ ) හතර ගුණයකින් වැඩි කළ විට නව ඩිබ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය වන්නේ,

- (1)  $\frac{\lambda}{2}$
- (2)  $\frac{\lambda}{4}$
- (3) 2λ
- (4) 4λ
- (5) 16λ


19. පහත සඳහන් කුමක් මගින් MX ලවණයේ ජලීය ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම සඳහා ගොඩනගන ලද විද්‍යුත් විච්ඡේදන කෝෂය නිවැරදිව පෙන්වා දෙයි ද?



20. පහත දක්වා ඇති කුමන ප්‍රකාශය කාබොක්සිලික් අම්ලයක් සහ ඇල්කොහොලයක් අතර සිදුවන එස්ටරයක් සෑදීමේ ප්‍රතික්‍රියාව පිළිබඳව නිවැරදි වේ ද?

- (1) සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව කාබනයිල් සංයෝගයක නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (2) එය ඇල්කොහොලය නියුක්ලියෝෆිලිකයක් ලෙස ක්‍රියාකරන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (3) එය කාබොක්සිලික් අම්ලයේ O—H බන්ධනය බිඳෙමින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (4) එය ඇල්කොහොලයේ C—O බන්ධනය බිඳෙමින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (5) එය අම්ල-භස්ම ප්‍රතික්‍රියාවකි.

21. ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී  $\text{CH}_3\text{OH}(l)$  1 mol ක් පහත පරිදි වියෝජනය වේ.



පහත සඳහන් කුමක් ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අසත්‍ය වේ ද? (H = 1, C = 12, O = 16)

- (1)  $\text{CH}_3\text{OH}(g)$  1 mol වියෝජනය වන විට අවශෝෂණය වන තාපය 128 kJ ට වඩා අඩුවේ.
- (2)  $\text{CO}(g) + 2\text{H}_2(g)$  හි එන්තැල්පිය  $\text{CH}_3\text{OH}(l)$  හි එන්තැල්පියට වඩා වැඩි වේ.
- (3)  $\text{CO}(g)$  1 mol සෑදෙන විට 128 kJ ක තාපයක් පිට වේ.
- (4) ප්‍රතික්‍රියක මවුලයක් වියෝජනයේදී 128 kJ ක තාපයක් අවශෝෂණය වේ.
- (5) එල 32 g සෑදෙන විට 128 kJ ක තාපයක් අවශෝෂණය වේ.

22. පහත දැක්වෙන ඒවායින් වැරදි ප්‍රකාශය හඳුනාගන්න.


- (1) නයිට්‍රජන් වල  $[\text{N}(g)]$  ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගැනීමේ ශක්තිය ධන වේ.
- (2)  $\text{BiCl}_3(aq)$  ද්‍රාවණයක් ජලයෙන් තනුක කරන විට සුදු අවක්ෂේපයක් දෙයි.
- (3)  $\text{H}_2\text{S}$  වායුවට ඔක්සිකාරකයක් සහ ඔක්සිහාරකයක් යන දෙආකාරයටම ක්‍රියා කළ හැක.
- (4) He වල සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට දැනෙන සඵල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය ( $Z^*$ ) 2ට වඩා අඩු ය.
- (5) ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත් කළ වුවද ඇලුමිනියම්,  $\text{N}_2$  වායුව කෙරෙහි නිෂ්ක්‍රීය වේ.

23. 298 K දී දුබල අම්ලයක් වන HA හි තනුක ජලීය ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය  $C \text{ mol dm}^{-3}$  වන අතර එහි අම්ල විඝටන නියතය  $K_a$  වේ. මෙම ද්‍රාවණයෙහි pH පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශනය මගින් ලබාදෙයි ද?











- (1)  $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_a - \frac{1}{2} \log C$
- (2)  $\text{pH} = -\frac{1}{2} \text{p}K_a - \frac{1}{2} \log C$
- (3)  $\text{pH} = -\frac{1}{2} \text{p}K_a + \frac{1}{2} \log C$
- (4)  $\text{pH} = -\frac{1}{2} \text{p}K_a - \frac{1}{2} \log (1/C)$
- (5)  $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_a - \frac{1}{2} \log (1/C)$

24.  $\text{H}_2\text{O}_2$  ද්‍රාවණයක ප්‍රබලතාව, සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේදී හා පීඩනයේදී (සා.උ.පී.) ලබාදෙන  $\text{O}_2$  වායුවේ පරිමාව අනුව ප්‍රකාශ කළ හැක. උදාහරණයක් වශයෙන්, පරිමා ප්‍රබලතාව 20 වන  $\text{H}_2\text{O}_2$  (20 volume strength  $\text{H}_2\text{O}_2$ ) ද්‍රාවණයකින් ලීටරයක් සා.උ.පී. දී  $\text{O}_2$  ලීටර 20 ක් ලබා දෙයි. ( $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ ) (වායු මවුලයක් සා.උ.පී. හිදී ලීටර 22.4 ක පරිමාවක් ගන්නා බව උපකල්පනය කරන්න.)
- X ලෙස නම් කර ඇති බෝතලයක  $\text{H}_2\text{O}_2$  ද්‍රාවණයක් අඩංගු ය. මෙම X ද්‍රාවණයෙන්  $25.0 \text{ cm}^3$  තනුක  $\text{H}_2\text{SO}_4$  හමුවේ  $1.0 \text{ mol dm}^{-3} \text{KMnO}_4$  සමග අනුමාපනය කළවිට, අන්ත ලක්ෂ්‍යය එළඹීමට අවශ්‍ය වූ පරිමාව  $25.0 \text{ cm}^3$  විය. X ද්‍රාවණයේ පරිමා ප්‍රබලතාව වනුයේ,
- (1) 15 (2) 20 (3) 25 (4) 28 (5) 30
25.  $\text{M}(\text{OH})_2(\text{s})$  යනු 298 K දී  $\text{M}^{2+}(\text{aq})$  හා  $\text{OH}^-(\text{aq})$  අයන අතර ප්‍රතික්‍රියාව මගින් සෑදුණු ජලයේ අල්ප වශයෙන් දියවන ලවණයකි.  $\text{pH} = 5$  දී ජලයෙහි  $\text{M}(\text{OH})_2(\text{s})$  හි ද්‍රාව්‍යතාවය ( $\text{mol dm}^{-3}$ ) වන්නේ,
- (298 K දී,  $K_{sp\text{M}(\text{OH})_2} = 4.0 \times 10^{-36}$ )
- (1)  $\sqrt{2} \times 10^{-18}$  (2)  $2 \times 10^{-18}$  (3)  $1 \times 10^{-18}$  (4)  $\sqrt[3]{2} \times 10^{-12}$  (5)  $1 \times 10^{-12}$
26. 298 K දී සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක්, සම්මත Mg-ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් හා ලවණ සේතුවක් භාවිතයෙන් ගොඩනගන ලද සම්මත ගැල්වානි කෝෂයක් පහත සඳහන් කුමක් මගින් නිවැරදිව දැක්වෙයි ද?
- (1)  $\text{Mg}(\text{s}) | \text{Mg}^{2+}(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}) || \text{H}^+(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}) | \text{H}_2(\text{g}) | \text{Pt}(\text{s})$   
 (2)  $\text{Pt}(\text{s}) | \text{H}_2(\text{g}) | \text{H}^+(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}) || \text{Mg}^{2+}(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}) | \text{Mg}(\text{s})$   
 (3)  $\text{Mg}(\text{s}), \text{Mg}^{2+}(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}) || \text{H}^+(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}) | \text{H}_2(\text{g}) | \text{Pt}(\text{s})$   
 (4)  $\text{Mg}(\text{s}) | \text{Mg}^{2+}(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}), \text{H}^+(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}), \text{H}_2(\text{g}) | \text{Pt}(\text{s})$   
 (5)  $\text{Pt}(\text{s}), \text{H}_2(\text{g}) | \text{H}^+(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}) || \text{Mg}^{2+}(\text{aq}, 1.00 \text{ mol dm}^{-3}), \text{Mg}(\text{s})$
27. 298 K දී ඩයික්ලෝරෝමීතේන් සහ ජලය අතර ඒකභාස්මික කාබනික අම්ලයක ව්‍යාප්ති සංගුණකය  $K_D$  නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත ක්‍රමය භාවිත කරන ලදී.  $0.20 \text{ mol dm}^{-3}$  අම්ලයෙහි ජලීය ද්‍රාවණයකින්  $50.00 \text{ cm}^3$  ක් ඩයික්ලෝරෝමීතේන්  $10.00 \text{ cm}^3$  ක් සමග හොඳින් මිශ්‍ර කර ස්තර දෙක වෙන් වීමට තබන ලදී. ඉන්පසු ප්ලාස්තුමේ පහළ ඇති ඩයික්ලෝරෝමීතේන් ස්තරය ඉවත් කරන ලදී. ජලීය ස්තරයෙහි ඉතිරිව ඇති අම්ලය උදාසීන කිරීම සඳහා  $0.02 \text{ mol dm}^{-3} \text{NaOH}(\text{aq})$  ද්‍රාවණයකින්  $10.00 \text{ cm}^3$  ක් අවශ්‍ය විය. (කාබනික ස්තරයේදී අම්ලය ද්විඅවයවීකරණය නොවේ යැයි උපකල්පනය කරන්න.) ඩයික්ලෝරෝමීතේන් හා ජලය අතර 298 K දී අම්ලයෙහි  $K_D$  වනුයේ,
- (1) 0.05 (2) 0.25 (3) 4.00 (4) 20.00 (5) 245.00
28. දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී දෘඪ-සංචාන භාජනයක් තුළ  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$  ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වේ. යම් කාලයකට පසු  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$  වැය වීමට සාපේක්ෂව ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය  $x \text{ mol dm}^{-3} \text{s}^{-1}$  බව සොයාගන්නා ලදී. පහත සඳහන් කුමක් මගින් එම කාලය තුළදී ප්‍රතික්‍රියාවේ  $\text{O}_2(\text{g})$  වැයවීමේ,  $\text{CO}_2(\text{g})$  සෑදීමේ හා  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$  සෑදීමේ ශීඝ්‍රතා පිළිවෙළින් පෙන්වයි ද?
- ශීඝ්‍රතාව /  $\text{mol dm}^{-3} \text{s}^{-1}$
- |     | $\text{O}_2(\text{g})$ | $\text{CO}_2(\text{g})$ | $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| (1) | $\frac{3}{x}$          | $\frac{2}{x}$           | $\frac{2}{x}$                  |
| (2) | $x$                    | $x$                     | $x$                            |
| (3) | $\frac{x}{3}$          | $\frac{x}{2}$           | $\frac{x}{2}$                  |
| (4) | $\frac{1}{x}$          | $\frac{1}{x}$           | $\frac{1}{x}$                  |
| (5) | $3x$                   | $2x$                    | $2x$                           |
29. T උෂ්ණත්වයේදී දෘඪ-සංචාන බඳුනක් තුළ සිදුවන පහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.
- $\text{M}(\text{g}) + \text{Q}(\text{g}) \rightarrow \text{R}(\text{g}) + \text{Z}(\text{g})$
- M හා Q හි සාන්ද්‍රණ පිළිවෙළින්  $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$  හා  $2.0 \text{ mol dm}^{-3}$  වනවිට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය  $5.00 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{s}^{-1}$  වේ. M හි සාන්ද්‍රණය දෙගුණ කළවිට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය දෙගුණ විය. මෙම තත්ත්ව යටතේදී ප්‍රතික්‍රියාවේ වේග නියතය වන්නේ,
- (1)  $2.5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$  (2)  $12.5 \text{ s}^{-1}$  (3)  $25 \text{ s}^{-1}$  (4)  $50 \text{ s}^{-1}$  (5)  $500 \text{ s}^{-1}$

30. පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සලකන්න.



P සහ Q පිළිවෙළින් විය හැක්කේ,

- (1)  සහ  (2)  සහ  (3)  සහ   
 (4)  සහ  (5)  සහ 

- අංක 31 සිට 40 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (a), (b), (c) සහ (d) යන ප්‍රතිචාර හතර අතුරෙන්, එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හෝ නිවැරදි ය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර කවරේ දැයි තෝරා ගන්න.

- (a) සහ (b) පමණක් නිවැරදි නම් (1) මත ද  
 (b) සහ (c) පමණක් නිවැරදි නම් (2) මත ද  
 (c) සහ (d) පමණක් නිවැරදි නම් (3) මත ද  
 (d) සහ (a) පමණක් නිවැරදි නම් (4) මත ද

වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි නම් (5) මත ද

පිළිතුරු පත්‍රයෙහි දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි ලකුණු කරන්න.


ඉහත උපදෙස් යම්පිණිබන්ධනය

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) සහ (b) පමණක් නිවැරදියි	(b) සහ (c) පමණක් නිවැරදියි	(c) සහ (d) පමණක් නිවැරදියි	(d) සහ (a) පමණක් නිවැරදියි	වෙනත් ප්‍රතිචාර සංඛ්‍යාවක් හෝ සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදි ය

31. 3d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය සහ ඒවායේ සංයෝග පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?


- (a) 3d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය අතුරෙන්, Sc ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස නොසැලකේ.  
 (b) පරමාණුවල (Sc සිට Cu දක්වා) අරයන් වමේ සිට දකුණට අඩු වේ.  
 (c)  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$  වල පාට නිල් වන අතර  $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  අවර්ණ වේ.  
 (d)  $\text{K}_2\text{NiCl}_4$  වල IUPAC නම වන්නේ dipotassium tetrachloronickelate(II).

32. පහත දැක්වෙන අණුව සඳහා කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?



- (a) P, Q, R සහ S වශයෙන් ලේබල් කර ඇති පරමාණු සරල රේඛාවක පිහිටයි.  
 (b) Q, R, S සහ T වශයෙන් ලේබල් කර ඇති පරමාණු සරල රේඛාවක පිහිටයි.  
 (c) R, S, T, U සහ V වශයෙන් ලේබල් කර ඇති පරමාණු එකම තලයේ පිහිටයි.  
 (d) R, S, T සහ U වශයෙන් ලේබල් කර ඇති පරමාණු සරල රේඛාවක පිහිටයි.


33. 500 K දී  $\text{N}_2(\text{g})$  මවුල 0.01 ක්,  $\text{H}_2(\text{g})$  මවුල 0.10 ක් සහ  $\text{NH}_3(\text{g})$  මවුල 0.40 ක්,  $1.0 \text{ dm}^3$  දෘඪ-සංඛ්‍යාත භාජනයක් තුළට ඇතුළු කර පහත සමතුලිතතාවය එළඹීමට ඉඩ හරින ලදී.



ආරම්භයේ සිට සමතුලිතතාවය දක්වා මෙම පද්ධතියේ වෙනස්වීම් පිළිබඳ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?  $Q_C$  යනු ප්‍රතික්‍රියා ලබ්ධිය වේ.

- (a) ආරම්භයේදී  $Q_C > K_C$ ;  $\text{NH}_3(\text{g})$  මගින්  $\text{N}_2(\text{g})$  හා  $\text{H}_2(\text{g})$  සෑදීම ආරම්භ වී පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹේ.  
 (b) ආරම්භයේදී  $Q_C < K_C$ ;  $\text{NH}_3(\text{g})$  මගින්  $\text{N}_2(\text{g})$  හා  $\text{H}_2(\text{g})$  සෑදීම ආරම්භ වී පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹේ.  
 (c) ආරම්භයේදී  $Q_C < K_C$ ;  $\text{N}_2(\text{g})$  හා  $\text{H}_2(\text{g})$  ප්‍රතික්‍රියා කර  $\text{NH}_3(\text{g})$  සෑදී පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹේ.  
 (d) ආරම්භයේදී  $Q_C > K_C$ ;  $\text{N}_2(\text{g})$  හා  $\text{H}_2(\text{g})$  ප්‍රතික්‍රියා කර  $\text{NH}_3(\text{g})$  සෑදී පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹේ.

34. P සංයෝගය සහ HCl අතර ඇල්කයිල් හේලයිඩයක් සෑදෙන ප්‍රතික්‍රියාව පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?



- (a) ප්‍රධාන ඵලය වන්නේ 2-chloro-2-methylbutane ය.
- (b) මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී අතරමැදියක් ලෙස ඒවිතියික කාබොකැටායනයක් සෑදේ.
- (c) ප්‍රතික්‍රියාවේ එක් පියවරකදී, HCl බන්ධනය බිඳී ක්ලෝරීන් මුක්ත බණ්ඩකයක් ( $\text{Cl}^\cdot$ ) ලබා දේ.
- (d) ප්‍රතික්‍රියාවේ එක් පියවරකදී, කාබොකැටායනයක් සමග නියුක්ලියෝෆයිලයක් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
35. දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී රේඛනායක සංවෘත බඳුනක් තුළ ද්‍රව දෙකක් මිශ්‍ර කිරීමෙන් සාදන ලද ද්‍රවයෙහි ද්‍රාවණයක් රවුල් නියමයෙන් සෑහී අපගමනයක් දක්වයි. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ මෙම පද්ධතිය සඳහා නිවැරදි වේ ද?
- (a) මිශ්‍රණයෙහි මුළු වාෂ්ප පීඩනය එම මිශ්‍රණය පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරුණේ නම් බලාපොරොත්තු විය හැකි මුළු වාෂ්ප පීඩනයට වඩා අඩු ය.
- (b) මිශ්‍රණය සෑදෙන විට තාපය පිට වේ.
- (c) මිශ්‍රණයෙහි වාෂ්ප කලාපයෙහි ඇති අණු සංඛ්‍යාව එම මිශ්‍රණය පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරුණේ නම් බලාපොරොත්තු විය හැකි අණු සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි ය.
- (d) මිශ්‍රණය සෑදෙන විට තාපය අවශෝෂණය වේ.
36. CFC, HCFC සහ HFC සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?
- (a) CFC සහ HCFC යන සංයෝග කාණ්ඩ දෙකටම ඉහළ වායුගෝලයේදී (ස්තර ගෝලය) ක්ලෝරීන් මුක්ත බණ්ඩක නිපදවීමේ හැකියාව ඇත.
- (b) HFC සහ HCFC යන සංයෝග කාණ්ඩ දෙකටම ඉහළ වායුගෝලයේදී (ස්තර ගෝලය) ක්ලෝරීන් මුක්ත බණ්ඩක නිපදවීමේ හැකියාව ඇත.
- (c) CFC, HCFC සහ HFC යන සංයෝග කාණ්ඩ තුනම ප්‍රබල හරිතාගාර වායූන් වේ.
- (d) CFC, HCFC සහ HFC යන සංයෝග කාණ්ඩ තුනම ඕසෝන් වියන ක්ෂයවීමට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ.
37. හැලජන, උච්ච වායු සහ ඒවායේ සංයෝග පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?
- (a) හයිපොක්ලෝරස් අයනය ආම්ලික ද්‍රාවණවල වේගයෙන් ද්විධාකරණය වේ.
- (b) Xe, F<sub>2</sub> වායුව සමග සංයෝග ශ්‍රේණියක් සාදන අතර, ඒවා අතුරෙන් XeF<sub>4</sub> වලට තලීය සමචතුරස්‍රාකාර ජ්‍යාමිතියක් ඇත.
- (c) හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ අතුරෙන් මවුලයක් සඳහා වැඩිම බන්ධන විඝටන ශක්තිය ඇත්තේ HF වලට ය.
- (d) ලන්ඩන් බලවල ප්‍රබලතාව වැඩි වීම හේතු කොටගෙන හැලජනවල තාපාංක කාණ්ඩයේ පහළට වැඩි වේ.
38. කාමර උෂ්ණත්වයේදී ක්‍රියාත්මක වන විට ඩැනියෙල් කෝෂය පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද? ( $E_{\text{cell}}^\circ = +1.10 \text{ V}$ )
- (a) ශුද්ධ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රවාහය Zn සිට Cu දක්වා සිදු වේ.
- (b)  $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$  සමතුලිතතාවය දකුණට නැඹුරු වේ.
- (c) ලවණ සේතුවක් තිබීම නිසා ද්‍රව-සන්ධි විභවයක් ඇති වේ.
- (d)  $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$  සමතුලිතතාවය දකුණට නැඹුරු වේ.
39. නියත උෂ්ණත්වයකදී පරිපූර්ණ හා තාත්ත්වික වායූන් සඳහා පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?
- (a) ඉතා ඉහළ පීඩනවලදී තාත්ත්වික වායුවක පරිමාව පරිපූර්ණ වායුවක පරිමාවට වඩා වැඩි වේ.
- (b) ඉහළ පීඩනවලදී තාත්ත්වික වායු පරිපූර්ණ වායු ලෙස හැසිරීමට නැඹුරු වේ.
- (c) ඉතා ඉහළ පීඩනවලදී තාත්ත්වික වායුවක පරිමාව පරිපූර්ණ වායුවක පරිමාවට වඩා අඩු වේ.
- (d) අඩු පීඩනවලදී තාත්ත්වික වායු පරිපූර්ණ වායුලෙස හැසිරීමට නැඹුරු වේ.
40. සමහර කාර්මික ක්‍රියාවලි හා සම්බන්ධව පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?
- (a) සෝල්වේ ක්‍රියාවලිය මගින් Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> නිෂ්පාදනය හා සම්බන්ධ පළමු පියවර දෙක තාප අවශෝෂක වේ.
- (b) මුයින්වල Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup> හා SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> අයන පැවතීම, පටල කෝෂ ක්‍රමය යොදා ගැනීමෙන් NaOH නිෂ්පාදනයට බාධා පමුණුවයි.
- (c) ඔස්වල්ඩ් ක්‍රමය මගින් නයිට්‍රික් අම්ල නිෂ්පාදනය හා සම්බන්ධ පළමු පියවර උත්ප්‍රේරකයක් හමුවේ වාතයේ ඇති O<sub>2</sub> මගින් NH<sub>3</sub> වායුව ඔක්සිකරණය කර NO<sub>2</sub> වායුව ලබාදීම වේ.
- (d) හේබර්-බොෂ් ක්‍රමය යොදා NH<sub>3</sub> වායුව නිෂ්පාදනයේදී ඉහළ උෂ්ණත්ව හා අඩු පීඩන තත්ත්ව යොදාගනී.

- අංක 41 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ප්‍රකාශ දෙන බැගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ප්‍රකාශ යුගලයට හොඳින්ම ගැළපෙනුයේ පහත වගුවෙහි දැක්වෙන පරිදි (1), (2), (3), (4) සහ (5) යන ප්‍රතිචාරවලින් කවර ප්‍රතිචාරය දැයි තෝරා පිළිතුරු පත්‍රයෙහි උචිත ලෙස ලකුණු කරන්න.

ප්‍රතිචාරය	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
(1)	සත්‍ය වේ.	සත්‍ය වන අතර, පළමුවැනි ප්‍රකාශය නිවැරදිව පහදා දෙයි.
(2)	සත්‍ය වේ.	සත්‍ය වන නමුත් පළමුවැනි ප්‍රකාශය නිවැරදිව පහදා නොදෙයි.
(3)	සත්‍ය වේ.	අසත්‍ය වේ.
(4)	අසත්‍ය වේ.	සත්‍ය වේ.
(5)	අසත්‍ය වේ.	අසත්‍ය වේ.

	පළමුවැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
41.	Cr සහ Mn හි ඔක්සයිඩ අනුරේන්, CrO සහ MnO ආම්ලික වන අතර, CrO <sub>3</sub> සහ Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> භාස්මික වේ.	Cr සහ Mn වල ඔක්සයිඩවල ආම්ලික/භාස්මික ස්වභාවය, ලෝහයේ ඔක්සිකරණ අංකය මත රඳා පවතී.
42.	HA(aq) දුබල අම්ලයක් එහි සෝඩියම් ලවණය NaA(aq) සමග මිශ්‍ර කිරීමෙන් ආම්ලික ස්ථාවරත්වක ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කළ හැකි ය.	OH <sup>-</sup> (aq) හෝ H <sup>+</sup> (aq) අයන ස්ථාවරත්වක ද්‍රාවණයකට එකතු කළවිට, එකතු කරන ලද OH <sup>-</sup> (aq) හෝ H <sup>+</sup> (aq) අයන ප්‍රමාණ පිළිවෙළින්; OH <sup>-</sup> (aq) + HA(aq) → A <sup>-</sup> (aq) + H <sub>2</sub> O(l) හා H <sup>+</sup> (aq) + A <sup>-</sup> (aq) → HA(aq) ප්‍රතික්‍රියා මගින් ඉවත් වේ.
43.	හුමාල ආසවනය මගින් 100 °C වලට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකදී ශාකවලින් සහගත තෙල් නිස්සාරණය කළ හැකිය.	සහගත තෙල් සහ ජලය මිශ්‍රණය නටන උෂ්ණත්වයේදී, පද්ධතියෙහි මුළු වාෂ්ප පීඩනය බාහිර වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩු ය.
44.	දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී හා පීඩනයකදී වෙනස් පරිපූර්ණ වායුන් දෙකක මවුලික පරිමාවන් එකිනෙකින් වෙනස් වේ.	0 °C උෂ්ණත්වයේදී හා 1 atm පීඩනයේදී පරිපූර්ණ වායුවක මවුලික පරිමාව 22.4 dm <sup>3</sup> mol <sup>-1</sup> වේ.
45.	C=C බන්ධනයක් සහිත සියලුම සංයෝග පාරත්‍රිමාන සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි.	එකිනෙකෙහි දර්පණ ප්‍රතිබිම්බ නොවන ඕනෑම සමාවයවික දෙකක් පාරත්‍රිමාන සමාවයවික වේ.
46.	බෙන්සීන්හි හයිඩ්‍රජනීකරණය ඇල්කීනවල හයිඩ්‍රජනීකරණයට වඩා අපහසු ය.	බෙන්සීන්වලට හයිඩ්‍රජන් ආකලනය වීම ඇරෝමැටික ස්ථායීතාවය නැති වීමට හේතු වේ.
47.	සල්ෆියුරික් අම්ල නිෂ්පාදනයේදී SO <sub>3</sub> වායුව සහ ජලය අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ.	SO <sub>3</sub> වායුව සාන්ද්‍ර H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> සමග ප්‍රතික්‍රියා කළවිට ඕලියම් ලබා දේ.
48.	ඇමෝනියා සහ ඇල්කයිල් හේලයිඩයක් අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවෙන්, ප්‍රාථමික, ද්විතීයික සහ තෘතීයික ඇමීනවලට නියුක්ලියෝෆයිල ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කළ හැක.	ප්‍රාථමික, ද්විතීයික සහ තෘතීයික ඇමීනවලට නියුක්ලියෝෆයිල ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කළ හැක.
49.	P + Q → R යනු P ප්‍රතික්‍රියකයට සාපේක්ෂව පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවක් වේ නම් P හි සාන්ද්‍රණයට එරෙහි ශීඝ්‍රතාවය ප්‍රස්තාරය මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන සරල රේඛාවක් ලබාදෙයි.	පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවක ආරම්භක ශීඝ්‍රතාවය ප්‍රතික්‍රියකය/ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණයෙන් ස්වායත්ත වේ.
50.	අධික වාහන තදබදය සහිත නගරයක, හොඳින් ඉර පායා ඇති දිනයක, ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ප්‍රබලව දැකිය හැක.	ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව මුළුමනින්ම ඇතිවන්නේ රථවාහන, අපවාහ පද්ධති මගින් පිටකරන සියුම් අංශු සහ ජල බිඳිති මගින් සූර්ය කිරණ ප්‍රතිරණ කිරීම හේතුවෙනි.



### ආවර්තිතා වගුව

	1																	2						
1	H																	He						
	3	4																	5	6	7	8	9	10
2	Li	Be																	B	C	N	O	F	Ne
	11	12																	13	14	15	16	17	18
3	Na	Mg																	Al	Si	P	S	Cl	Ar
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe						
	55	56	La-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86						
6	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn						
	87	88	Ac-	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118						
7	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og						

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr



## නව නිර්දේශය/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020  
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020  
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

රසායන විද්‍යාව II  
 இரசாயனவியல் II  
 Chemistry II

02 S II


පැය තුනයි  
 மூன்று மணித்தியாலம்  
 Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි  
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்  
 Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදා ගන්න.

- \* ආවර්තිතා වගුවක් 15 වැනි පිටුවෙහි සපයා ඇත.
- \* ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- \* සාර්වත්‍ර වායු නියතය,  $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- \* ඇවගාඩ්රෝ නියතය,  $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේදී ඇල්කයිල් කාණ්ඩ සංක්ෂිප්ත ආකාරයකින් නිරූපණය කළ හැකි ය.

විභාග අංකය : .....



□ A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා (පිටු 02 - 08)

- \* සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.
- \* ඔබේ පිළිතුරු එක් එක් ප්‍රශ්නයට ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බවද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බවද සලකන්න.

□ B කොටස සහ C කොටස - රචනා (පිටු 09 - 14)

- \* එක් එක් කොටසින් ප්‍රශ්න දෙක බැගින් තෝරා ගනිමින් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි භාවිත කරන්න.
- \* සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A, B සහ C කොටස් තුනට පිළිතුරු, A කොටස මුලින් තිබෙන පරිදි එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- \* ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B සහ C කොටස් පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු ලැබූයේ
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
එකතුව		

එකතුව	
ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

සංකේත අංක	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
පරීක්ෂා කළේ :	
අධීක්ෂණය කළේ :	

## A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රශ්න හතරවන මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 100 කි.)

මෙම  
කිරීටයේ  
සිසුවන්  
නො ලියන්න



1. (a) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට තිත් ඉරි මත පිළිතුරු සපයන්න.

- (i)  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  සහ  $\text{F}^-$  යන අයන තුන අතුරෙන්, **කුඩාම** අයනික අරය ඇත්තේ කුමකට ද? .....
- (ii) C, N සහ O යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන්, **වැඩිම** දෙවන අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ කුමකට ද? .....
- (iii)  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HOCl}$  සහ  $\text{OF}_2$  යන සංයෝග තුන අතුරෙන්, **වඩාත්ම** විද්‍යුත් සෘණ ඔක්සිජන් පරමාණුව ඇත්තේ කුමක ද? .....
- (iv) Be, C සහ N යන මූලද්‍රව්‍ය තුන අතුරෙන්, වායුමය අවස්ථාවේදී පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එකතු කළ විට  $[\text{Y}(\text{g}) + \text{e} \rightarrow \text{Y}^-(\text{g}); \text{Y} = \text{Be}, \text{C}, \text{N}]$  ශක්තිය පිටකරනුයේ කුමක් ද? .....
- (v)  $\text{NaF}$ ,  $\text{KF}$  සහ  $\text{KBr}$  යන අයනික සංයෝග තුන අතුරෙන්, ජලයේ **වැඩිම** ද්‍රාව්‍යතාව ඇත්තේ කුමකට ද? .....
- (vi)  $\text{HCHO}$ ,  $\text{CH}_3\text{F}$  සහ  $\text{H}_2\text{O}_2$  යන සංයෝග තුන අතුරෙන්, **ප්‍රබලම** අන්තර්-අණුක බල ඇත්තේ කුමකට ද? .....

(ලකුණු 24 යි)

(b) (i)  $\text{N}_2\text{O}_3^{2-}$  අයනය සඳහා **වඩාත්ම** පිළිගත හැකි ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.(ii) මෙම අයනය සඳහා තවත් ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) **තුනක්** අඳින්න. ඉහත (i) හි අඳින ලද වඩාත්ම පිළිගත හැකි ව්‍යුහය සමග සංසන්දනය කිරීමේදී ඔබ විසින් අඳින ලද ව්‍යුහවල සාපේක්ෂ ස්ථායීතාවයන් සඳහන් කිරීමට එම ව්‍යුහ යටින් '**අඩු ස්ථායී**' හෝ '**අස්ථායී**' වශයෙන් ලියා දක්වන්න.

(iii) පහත සඳහන් ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය සහ එහි ලේබල් කරන ලද සැකිල්ල පදනම් කරගෙන දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



	N <sup>1</sup>	N <sup>2</sup>	O <sup>3</sup>	C <sup>4</sup>
පරමාණුව වටා VSEPR යුගල්				
පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය				
පරමාණුව වටා හැඩය				
පරමාණුවේ මුහුම්කරණය				

- කොටස් (iv) සිට (vii), ඉහත (iii) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවීස් තිත්-ඉරි ව්‍යුහය මත පදනම් වේ. පරමාණු ලේඛල් කිරීම (iii) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.

(iv) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර  $\sigma$  බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක/මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I. $\text{Cl}-\text{N}^1$	$\text{Cl}$ .....	$\text{N}^1$ .....
II. $\text{N}^1-\text{O}$	$\text{N}^1$ .....	$\text{O}$ .....
III. $\text{N}^1-\text{N}^2$	$\text{N}^1$ .....	$\text{N}^2$ .....
IV. $\text{N}^2-\text{O}^3$	$\text{N}^2$ .....	$\text{O}^3$ .....
V. $\text{O}^3-\text{C}^4$	$\text{O}^3$ .....	$\text{C}^4$ .....
VI. $\text{C}^4-\text{N}$	$\text{C}^4$ .....	$\text{N}$ .....

(v) පහත දැක්වෙන පරමාණු දෙක අතර  $\pi$  බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න.

I. $\text{N}^1-\text{N}^2$	$\text{N}^1$ .....	$\text{N}^2$ .....
II. $\text{C}^4-\text{N}$	$\text{C}^4$ .....	$\text{N}$ .....
	$\text{C}^4$ .....	$\text{N}$ .....

(vi)  $\text{N}^1, \text{N}^2, \text{O}^3$  සහ  $\text{C}^4$  පරමාණු වටා ආසන්න බන්ධන කෝණ සඳහන් කරන්න.

$\text{N}^1$  .....,  $\text{N}^2$  .....,  $\text{O}^3$  .....,  $\text{C}^4$  .....

(vii)  $\text{N}^1, \text{N}^2, \text{O}^3$  සහ  $\text{C}^4$  පරමාණු විද්‍යුත් සෘණතාව වැඩිවන පිළිවෙලට සකසන්න.

..... < ..... < ..... < .....

(ලකුණු 56 යි)

(c) පහත සඳහන් තොරතුරු සලකන්න.

I. A සහ B පරමාණු සංයෝජනය වී  $\sigma$  බන්ධනයක් සහිත විෂමජාතීය ද්විපරමාණුක AB අණුව සාදයි.  
මෙය A - B ලෙස නිරූපණය කරනු ලැබේ.

II. A වල විද්‍යුත් සෘණතාවය B වල එම අගයට වඩා අඩු ය ( $X_A < X_B$ ).  
 $X$  = පරමාණුවේ විද්‍යුත් සෘණතාවය

III. පහත දැක්වෙන සමීකරණයෙන් AB අණුවේ A සහ B පරමාණු අතර අන්තර්-න්‍යාෂ්ටික දුර ( $d_{A-B}$ ) ලබා දේ.

$$d_{A-B} = r_A + r_B - c(X_B - X_A)$$

$r$  = පරමාණුක අරය;  $c = 9 \text{ pm}$

සැ.යු.:  $d$  සහ  $r$  පිකෝමීටරවලින් (pm) මනිනු ලැබේ. ( $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$ )

ඉහත සඳහන් තොරතුරු පදනම් කරගෙන පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i) A සහ B අතර  $\sigma$  බන්ධන වර්ගය හඳුනාගැනීමට යොදාගන්නා නම කුමක් ද?

.....

(ii) AB අණුවෙහි භාගික ආරෝපණ ( $\delta^+$  සහ  $\delta^-$ ) ස්ථානගත වී ඇත්තේ කෙසේදැයි පෙන්වුම් කරන්න.

.....

(iii) AB අණුවේ ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය ( $\mu$ ) ගණනය කිරීමට භාවිත කරන සමීකරණය ලියා එහි දිශාව පෙන්වුම් කරන්න.

- (iv) පහත දැක්වෙන දත්ත උපයෝගී කරගනිමින් HF අණුවේ H-F බන්ධනයේ අයනික ස්වභාවයේ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

$$H_2 \text{ වල අන්තර්-න්යාමික දුර } (d_{H-H}) = 74 \text{ pm} \quad F \text{ වල විද්‍යුත් සෘණතාවය} = 4.0$$

$$F_2 \text{ වල අන්තර්-න්යාමික දුර } (d_{F-F}) = 144 \text{ pm} \quad HF \text{ වල ද්විමූල ඝූර්ණය} = 6.0 \times 10^{-30} \text{ C m}$$

$$H \text{ වල විද්‍යුත් සෘණතාවය} = 2.1 \quad \text{ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

(ලකුණු 20 යි)

2. (a) A, B, C සහ D යනු p-ගොනුවට අයත් මූලද්‍රව්‍යවල ක්ලෝරයිඩ වේ. මෙම මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක ක්‍රමාංක 20 ට අඩු ය. A සීමිත ජලය ප්‍රමාණයක් සහ B, C සහ D වැඩිපුර ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ලබාදෙන එලවල ( $P_1 - P_9$ ) විස්තර පහත දී ඇත.

සංයෝගය	එලවල විස්තර
A	$P_1$ ජාල සහසංයුජ ව්‍යුහයක් ඇති සංයෝගයක්
	$P_2$ ප්‍රබල ඒකභාස්මික අම්ලයක්
B	$P_3$ රතු ලිට්මස් නිල් ගන්වන වායුවක්
	$P_4$ විරූපන ලක්ෂණ සහිත සංයෝගයක්
C	$P_5$ ත්‍රිභාස්මික අම්ලයක්
	$P_6$ ප්‍රබල ඒකභාස්මික අම්ලයක්
D	$P_7$ ආම්ලික $KMnO_4$ ද්‍රාවණයක් අවර්ණ කරන වායුවක්
	$P_8$ කලිල ඝනයක්
	$P_9$ ප්‍රබල ඒකභාස්මික අම්ලයක්

- (i) A, B, C සහ D හඳුනාගන්න (රසායනික සූත්‍ර දෙන්න).

A: ..... B: ..... C: ..... D: .....

- (ii)  $P_1$  සිට  $P_9$  එල ලබාදෙමින් ජලය සමග A, B, C සහ D හි ප්‍රතික්‍රියාවලට තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

(iii) පහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්න.

I.  $P_1$  සමග  $NaOH(aq)$

.....

II.  $P_3$  සමග  $Mg$

.....

III.  $P_7$  සමග ආම්ලික  $K_2Cr_2O_7$

.....

(ලකුණු 50 යි)

(b)  $Al_2(SO_4)_3$ ,  $H_2SO_4$ ,  $Na_2S_2O_3$ ,  $BaCl_2$ ,  $Pb(Ac)_2$  සහ  $KOH$  වල ජලීය ද්‍රාවණ අඩංගු **P, Q, R, S, T** සහ **U** (පිළිවෙළින් නොවේ) ලෙස ලේබල් කර ඇති බෝතල්, ශිෂ්‍යයෙකුට ලබා දෙන ලදී. ඒවා හඳුනාගැනීම සඳහා වරකට ද්‍රාවණ දෙක බැගින් මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලැබුණු සමහර ප්‍රයෝජනවත් නිරීක්ෂණ පහත දක්වා ඇත.  
(Ac - ඇසිටේට් අයනය)

	මිශ්‍ර කළ ද්‍රාවණ	නිරීක්ෂණ
I	<b>T + R</b>	පැහැදිලි අවර්ණ ද්‍රාවණයක්
II	<b>P + R</b>	සුදු අවක්ෂේපයක්
III	<b>T + S</b>	සුදු ජෙලටිනීය අවක්ෂේපයක්
IV	<b>U + R</b>	සුදු අවක්ෂේපයක්
V	<b>P + Q</b>	සුදු අවක්ෂේපයක්, රත් කළ විට කළුපැහැ ගනී
VI	<b>P + U</b>	සුදු අවක්ෂේපයක්, රත් කළ විට ද්‍රවණය වේ

(i) **P** සිට **U** හඳුනාගන්න.

**P:** .....

**Q:** .....

**R:** .....

**S:** .....

**T:** .....

**U:** .....

(ii) ඉහත **I** සිට **VI** දක්වා ඇති එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න.

**I:** .....

**II:** .....

**III:** .....

**IV:** .....

**V:** සුදු අවක්ෂේපය සෑදීම: .....

රත් කළ විට කළුපැහැ ගැනීම: .....

**VI:** .....

(ඔ.ශු.: අවක්ෂේප ↓ යනුවෙන් දක්වන්න.)

(ලකුණු 50 යි)

3. (a) ජලයේ අල්ප වශයෙන් දියවන  $AB_2(s)$  නම් ලවණයෙහි සංතෘප්ත ජලීය ද්‍රාවණයක්,  $25^\circ C$  දී ආසන්න ජලය  $1.0 \text{ dm}^3$  තුළ  $AB_2(s)$  වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මන්ථනය කිරීමෙන් සාදන ලදී. මෙම සංතෘප්ත ජලීය ද්‍රාවණයේ පවතින  $A^{2+}(aq)$  අයන ප්‍රමාණය  $2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$  බව සොයා ගන්නා ලදී.

(i)  $25^\circ C$  දී ඉහත පද්ධතියේ  $AB_2(s)$  හි ද්‍රාව්‍යතාව හා සම්බන්ධ සමතුලිතය ලියා දක්වන්න.

.....

(ii)  $25^\circ C$  දී ඉහත (i) හි ලියන ලද සමතුලිතතාවයේ සමතුලිතතා නියතය සඳහා ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න.

.....

.....

(iii) 25 °C දී ඉහත (ii) හි සඳහන් කළ සමතුලිතතා නියතයේ අගය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(iv)  $AB_2$  හි වෙනත් සංකෘප්ත ජලීය ද්‍රාවණයක්, 25 °C දී ආසුනු ජලය 2.0 dm<sup>3</sup> තුළ  $AB_2(s)$  වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මත්ථනය කිරීමෙන් සාදා ගන්නා ලදී. මෙම පද්ධතිය සඳහා සමතුලිතතා නියතයේ අගය හේතු දක්වමින් පුරෝකථනය කරන්න.

.....

.....

(v) 25 °C හි පවතින  $AB_2$  හි ජලීය සංකෘප්ත ද්‍රාවණයකට  $NaB(s)$  නැමැති ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදකයක ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් එකතු කරන ලදී.  $A^{2+}(aq)$  වල සාන්ද්‍රණය වැඩිවේ ද, අඩුවේ ද යන වග හේතු දක්වමින් පුරෝකථනය කරන්න.


.....

.....

.....

(ලකුණු 60 යි)

(b) ජලීය ද්‍රාවණයකදී ප්‍රොපනොයික් අම්ලය ( $C_2H_5COOH$ ) පහත දැක්වෙන ආකාරයට අයනීකරණය වේ.



25 °C දී  $K_a$  (ප්‍රොපනොයික් අම්ලය) =  $1.0 \times 10^{-5}$  වේ.

(i) 25 °C දී ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතය සඳහා ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න.

.....

.....

(ii) 25 °C දී  $C_2H_5COOH$  වලින් 0.74 cm<sup>3</sup> ආසුනු ජලයේ ද්‍රවණය කිරීමෙන්  $C_2H_5COOH$  හි 100.0 cm<sup>3</sup> ක ජලීය ද්‍රාවණයක් සාදාගන්නා ලදී. 25 °C දී මෙම ද්‍රාවණයේ pH අගය ගණනය කරන්න.

(C = 12; O = 16; H = 1;  $C_2H_5COOH$  වල ඝනත්වය 1.0 g cm<sup>-3</sup> ලෙස සලකන්න.)

(ලකුණු 40 යි.)


100




4. (a) A, B, C සහ D යනු අණුක සූත්‍රය  $C_6H_{10}$  සහිත ව්‍යුහ සමාවයවික වේ. මේවායින් එකක්වත් ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාවය නොපෙන්වයි. A, B, C සහ D යන සමාවයවික හතරම,  $HgSO_4$ /තනුක  $H_2SO_4$  සමග පිරියම් කළ විට ලබාදෙන එල 2,4-ඩයිනයිට්‍රෝෆොරොනිල්හයිඩ්‍රජීන් (2,4-DNP) සමග ප්‍රතික්‍රියා කර වර්ණවත් අවස්ථා ලබා දෙයි.

ඇමෝනියම්  $AgNO_3$  සමග A පමණක් අවස්ථාපයක් ලබා දෙයි. A සඳහා එක් ස්ථාන සමාවයවිකයක් පමණක් ඇති අතර, එය B වේ. B යනු C හි දාම සමාවයවිකයක් වේ. C,  $HgSO_4$ /තනුක  $H_2SO_4$  සමග ප්‍රතික්‍රියා කර E සහ F එල දෙක ලබා දෙයි. D,  $HgSO_4$ /තනුක  $H_2SO_4$  සමග ප්‍රතික්‍රියා කර, එක් එලයක් පමණක් ලබාදෙන අතර, එය E වේ.


- (i) A, B, C, D, E සහ F වල ව්‍යුහයන් පහත දී ඇති කොටු තුළ අඳින්න.




A




B




C



D




E



F


- (ii)  $H_2$ /Pd-BaSO<sub>4</sub> / ක්විනොලීන් සමග A, B, C සහ D සංයෝග වෙන වෙනම ප්‍රතික්‍රියා කළ විට, කුමන සංයෝගය පාරත්‍රිමාන සමාවයවිකතාවය නොපෙන්වන එලයක් ලබාදෙන්නේ ද?

- (iii) A වැඩිපුර HBr සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ලබාදෙන G එලයේ ව්‍යුහය පහත දී ඇති කොටුව තුළ අඳින්න.





G

- (iv) E පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියාවලදී ලබාදෙන X සහ Y එලවල ව්‍යුහ අදාළ කොටු තුළ අඳින්න.



X












Y

X සහ Y එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනාගැනීමට පරීක්ෂාවක් නම් කරන්න.

(ලකුණු 60 යි.)

- (b) (i) දී ඇති කොටු තුළ **K, L** සහ **M** සංයෝගවල ව්‍යුහ ඇඳීමෙන් සහ **P, Q** සහ **R** ප්‍රතිකාරක/උත්ප්‍රේරක දෙමින් පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රම තුන සම්පූර්ණ කරන්න.



(ලකුණු 30 යි)

- (ii) ප්‍රතික්‍රියා **I – VI** අතුරෙන් තෝරාගනිමින් පහත දක්වා ඇති එක් එක් ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය සඳහා එක් (01) නිදසුනක් බැගින් දෙන්න.

නියුක්ලියෝෆිලික ආකලනය .....

නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශය .....

(ලකුණු 10 යි)

\* \*

100

## නව නිර්දේශය/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
 Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

NEW

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2020  
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2020  
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020


රසායන විද්‍යාව II  
 இரசாயனவியல் II  
 Chemistry II

02 S II

\* සාර්වත්‍ර වායු නියතය  $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 \* ඇවගාඩ්රෝ නියතය  $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

## B කොටස - රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

5. (a)  $XY_2Z_2(g)$  නමැති සංයෝගය  $300 \text{ K}$  ට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වවලට රත්කළ විට පහත පරිදි විශෝජනය වේ.

$XY_2Z_2(g)$  හි  $7.5 \text{ g}$  ක සාම්පලයක් රේචනය කරන ලද  $1.00 \text{ dm}^3$  දෘඪ-සංචාන බඳුනක් තුළ තබා උෂ්ණත්වය  $480 \text{ K}$  දක්වා වැඩිකරන ලදී.

$XY_2Z_2(g)$  හි මවුලික ස්කන්ධය  $150 \text{ g mol}^{-1}$  වේ.  $480 \text{ K}$  හිදී  $RT$  හි ආසන්න අගය ලෙස  $4000 \text{ J mol}^{-1}$  යොදාගන්න. සියලුම වායුන් පරිපූර්ණ වායු ලෙස හැසිරෙන බව උපකල්පනය කරන්න.

(i) විශෝජනය වීමට පෙර භාජනය තුළ ඇති  $XY_2Z_2(g)$  මවුල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.

(ii) ඉහත පද්ධතිය  $480 \text{ K}$  දී සමතුලිතතාවයට එළඹී විට භාජනය තුළ ඇති මුළු මවුල ප්‍රමාණය  $7.5 \times 10^{-2} \text{ mol}$  බව සොයාගන්නා ලදී.  $480 \text{ K}$  දී සමතුලිතතා මිශ්‍රණය තුළ ඇති  $XY_2Z_2(g)$ ,  $XY_2(g)$  සහ  $Z_2(g)$  හි මවුල සංඛ්‍යා ගණනය කරන්න.

(iii)  $480 \text{ K}$  දී මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය  $K_c$  ගණනය කරන්න.

(iv)  $480 \text{ K}$  දී සමතුලිතතාවය සඳහා  $K_p$  ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 75 යි)

(b) ඉහත (a) හි විස්තර කළ ප්‍රතික්‍රියාව වන  $XY_2Z_2(g) \rightarrow XY_2(g) + Z_2(g)$  සඳහා  $480 \text{ K}$  හිදී,  $XY_2Z_2(g)$ ,  $XY_2(g)$  සහ  $Z_2(g)$  හි ගිබ්ස් ශක්තීන් ( $G$ ) පිළිවෙළින්  $-60 \text{ kJ mol}^{-1}$ ,  $-76 \text{ kJ mol}^{-1}$  සහ  $-30 \text{ kJ mol}^{-1}$  වේ.

(i)  $480 \text{ K}$  දී ප්‍රතික්‍රියාවෙහි  $\Delta G$  ( $\text{kJ mol}^{-1}$  වලින්) ගණනය කරන්න.

(ii) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවෙහි  $480 \text{ K}$  දී  $\Delta S$  හි විශාලත්වය  $150 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$  වේ.  $\Delta S$  සඳහා නිවැරදි ලකුණ (+ හෝ -) භාවිත කරමින්  $480 \text{ K}$  දී ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා  $\Delta H$  ගණනය කරන්න.

(iii) ඉහත (ii) හි ලබාගත්  $\Delta H$  හි ලකුණ (+ හෝ -) අනුව මෙම ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක ද තාපාවශෝෂක ද යන වග පැහැදිලි කරන්න.

(iv)  $480 \text{ K}$  දී  $XY_2(g)$  හා  $Z_2(g)$  මගින්  $XY_2Z_2(g)$  සෑදීමේදී එන්තැල්පි වෙනස අපෝහනය කරන්න.

(v)  $XY_2Z_2(g)$  හි  $X-Z$  බන්ධනයෙහි බන්ධන එන්තැල්පිය  $+250 \text{ kJ mol}^{-1}$  වේ නම්  $Z-Z$  බන්ධනයෙහි බන්ධන

එන්තැල්පිය ගණනය කරන්න. ( $XY_2Z_2(g)$  හි ව්‍යුහය  $Z-\overset{\text{Y}}{\underset{\text{Y}}{\text{X}}}-Z$  බව සලකන්න.)

(vi) වායුමය  $XY_2Z_2$  වෙනුවට ද්‍රව  $XY_2Z_2$  භාවිත කළේනම්, එවිට  $XY_2Z_2(l) \rightarrow XY_2(g) + Z_2(g)$  ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ලැබෙන  $\Delta H$  හි අගය ඉහත (ii) හි ලබාගත්  $\Delta H$  හි අගයට සමාන ද, නැතහොත් වඩා විශාල ද හෝ කුඩා ද යන වග හේතු දක්වමින් පහදන්න.

(ලකුණු 75 යි)

6. (a) දී ඇති  $T$  උෂ්ණත්වයේදී සංවෘත බඳුනක් තුළ සිදුවන පහත දැක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.





- (i) ප්‍රතික්‍රියාවේ දැක්වා ඇති එක් එක් සංයෝගයට අදාළව ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව සඳහා ප්‍රකාශන තුනක් ලියන්න.
- (ii) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව,  $T$  උෂ්ණත්වයේදී,  $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$  හි  $0.10 \text{ mol dm}^{-3}$  ආරම්භක සාන්ද්‍රණයක් සහිතව සිදු කරන ලදී. 400 s කාලයකට පසුව ආරම්භක ප්‍රමාණයෙන් 40% ක් විශෝජනය වී ඇති බව සොයාගන්නා ලදී.
- මෙම කාල පරාසයේදී  $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$  විශෝජනය වීමේ සාමාන්‍ය ශීඝ්‍රතාව (average rate of decomposition) ගණනය කරන්න.
  - $\text{NO}_2(\text{g})$  සහ  $\text{O}_2(\text{g})$  සෑදෙන සාමාන්‍ය ශීඝ්‍රතාවයන් (average rates of formation) ගණනය කරන්න.
- (iii) වෙනත් පරීක්ෂණයකදී, මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 300 K දී ආරම්භක ශීඝ්‍රතා මනින ලද අතර, එහි ප්‍රතිඵල පහත දැක්වා ඇත.

$[\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})] / \text{mol dm}^{-3}$	0.01	0.02	0.03
ආරම්භක ශීඝ්‍රතාව / $\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$	$6.930 \times 10^{-5}$	$1.386 \times 10^{-4}$	$2.079 \times 10^{-4}$

300 K දී ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ශීඝ්‍රතා ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

- (iv) වෙනත් පරීක්ෂණයක් 300 K දී  $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$  හි  $0.64 \text{ mol dm}^{-3}$  ආරම්භක සාන්ද්‍රණයක් සහිතව සිදු කරන ලදී. 500 s කාලයකට පසුව ඉතිරි වී ඇති  $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$  සාන්ද්‍රණය  $2.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$  බව සොයාගන්නා ලදී.
- 300 K දී ප්‍රතික්‍රියාවේ අර්ධ-ජීව කාලය ( $t_{1/2}$ ) ගණනය කරන්න.
  - 300 K දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතා-නියතය ගණනය කරන්න.
- (v) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව පහත සඳහන් මූලික පියවර සහිත යන්ත්‍රණයක් හරහා සිදුවේ.



ඉහත යන්ත්‍රණය ප්‍රතික්‍රියාවෙහි වේග නියමයට අනුකූල වන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 80 යි)

(b)  $T$  උෂ්ණත්වයේදී A සහ B නමැති ද්‍රව දෙකක් රේඛනීය කළ සංවෘත බඳුනක් තුළ මිශ්‍ර කිරීමෙන් පරිපූර්ණ ද්‍රවයෙහි ද්‍රව මිශ්‍රණයක් සාදන ලදී.  $T$  උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතතාවයට එළඹී පසු වාෂ්ප කලාපයෙහි A සහ B හි ආංශික වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින්  $P_A$  සහ  $P_B$  වේ.  $T$  උෂ්ණත්වයේදී A සහ B හි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින්  $P_A^\circ$  සහ  $P_B^\circ$  වේ. ද්‍රාවණය තුළ A සහ B හි මවුලභාග පිළිවෙළින්  $X_A$  සහ  $X_B$  වේ.

(i)  $P_A = P_A^\circ X_A$  බව පෙන්වන්න.

(සමතුලිත අවස්ථාවේදී වාෂ්පීකරණයේ හා සනීභවනයේ ශීඝ්‍රතාවයන් සමාන බව සලකන්න.)

(ii) 300 K දී ඉහත පද්ධතියේ මුළු පීඩනය  $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$  වේ. 300 K හිදී සංශුද්ධ A සහ B හි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින්  $7.0 \times 10^4 \text{ Pa}$  හා  $3.0 \times 10^4 \text{ Pa}$  වේ.

I. සමතුලිත මිශ්‍රණයෙහි ද්‍රව කලාපයේ ඇති A හි මවුලභාගය ගණනය කරන්න.

II. සමතුලිත මිශ්‍රණයෙහිදී A හි වාෂ්ප පීඩනය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 70 යි)

7. (a) (i) විද්‍යුත් විච්ඡේද හා ගැල්වානී කෝෂවල ගුණ සංසන්දනය කිරීම සඳහා පහත වගුව පිටපත් කර දී ඇති පද යොදා සම්පූර්ණ කරන්න.

පද: ඇනෝඩය, කැතෝඩය, ධන, සෘණ, ස්වයංසිද්ධ, ස්වයංසිද්ධ නොවන

	විද්‍යුත් විච්ඡේද කෝෂය	ගැල්වානී කෝෂය
A. ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වන්නේ		
B. ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වන්නේ		
C. $E_{\text{cell}}^{\circ}$ හි ලකුණ		
D. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලා යන්නේ	..... සිට ..... දක්වා	..... සිට ..... දක්වා
E. කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ස්වයංසිද්ධතාවය		

- (ii) පහත දැක්වෙන පරිදි 300 K දී Zn(s) ඇනෝඩයක්, භාස්මික ජලීය විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් හා වාතයේ ඇති  $\text{O}_2(\text{g})$  වායුව ලබාගැනීමට උපකාරී වන සවිවර Pt කැතෝඩයක් භාවිතයෙන් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් ගොඩනගන ලදී. කෝෂය ක්‍රියාත්මක වනවිට ZnO(s) සෑදේ.

$$E_{\text{ZnO(s)}|\text{Zn(s)}|\text{OH}^-(\text{aq})}^{\circ} = -1.31 \text{ V} \text{ සහ } E_{\text{O}_2(\text{g})|\text{OH}^-(\text{aq})}^{\circ} = +0.34 \text{ V}$$

$$\text{Zn} = 65 \text{ g mol}^{-1}, \text{O} = 16 \text{ g mol}^{-1} \text{ සහ}$$

$$1 F = 96,500 \text{ C බව දී ඇත.}$$

I. ඇනෝඩය හා කැතෝඩය මත සිදුවන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වන්න.

II. සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ලියා දක්වන්න.

III. 300 K දී කෝෂයේ විභවය  $E_{\text{cell}}^{\circ}$  ගණනය කරන්න.

IV. ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර  $\text{OH}^-(\text{aq})$  හි ගමන් මගෙහි දිශාව සඳහන් කරන්න.


V. 300 K දී කෝෂය 800 s කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වනවිටදී  $\text{O}_2(\text{g})$  2 mol වැය වේ.

A. කෝෂය හරහා ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.


B. සෑදෙන ZnO(s) හි ස්කන්ධය ගණනය කරන්න.

C. කෝෂය තුළින් ගමන් කරන ධාරාව ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 75 යි)




- (b)  $\text{M}(\text{NO}_3)_n$  ලවණය ආසුනු ජලයේ ද්‍රවණය කළවිට **P** නම් වර්ණවත් සංකීර්ණ අයනය සෑදේ. **M**, 3d ගොනුවට අයත් ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයකි. **P** පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය වේ.



**T** සහ **U** මූලද්‍රව්‍ය හතරක් බැගින් අඩංගු සංගත සංයෝග වේ. **P**, **R** සහ **S** සංකීර්ණ අයන වේ.

- (i) **M** ලෝහය හඳුනාගන්න. **P** සංකීර්ණ අයනයේ **M** වල ඔක්සිකරණ අවස්ථාව දෙන්න.
- (ii)  $\text{M}(\text{NO}_3)_n$  හි  $n$  වල අගය දෙන්න.
- (iii) **P** සංකීර්ණ අයනයේ **M** වල සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලියන්න.
- (iv) **P**, **Q**, **R**, **S**, **T** සහ **U** වල රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.
- (v) **P**, **R**, **S**, **T** සහ **U** වල IUPAC නම් ලියන්න.
- (vi) **P** වල වර්ණය කුමක් ද?
- (vii) පහත I හා II හිදී ඔබ බලාපොරොත්තු වන නිරීක්ෂණ මොනවා ද?
  - I. කාමර උෂ්ණත්වයේදී **P** අඩංගු ආම්ලික ද්‍රාවණයකට  $\text{H}_2\text{S}$  වායුව යැවූ විට
  - II. I න් ලැබෙන මිශ්‍රණයේ ද්‍රවණය වී ඇති  $\text{H}_2\text{S}$  ඉවත් කිරීමෙන් පසු තනුක  $\text{HNO}_3$  සමග රත්කළ විට
- (viii) ජලීය ද්‍රාවණයක පවතින  $\text{M}^{n+}$  වල සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කිරීමට ක්‍රමවේදයක් පහත දැක්වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කරගනිමින්, තුළිත රසායනික සම්කරණ ආධාරයෙන් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.



(ලකුණු 75 යි)


[ප්‍රාදර්ශනවලට පිටුපස බලන්න.]

## C කොටස - රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

8. (a) (i) එකම කාබනික ආරම්භක සංයෝගය ලෙස  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$  භාවිත කරමින් **G** සංයෝගය සංශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමයක් පහත දී ඇත.

**A, B, C, D, E** සහ **F** සංයෝගවල ව්‍යුහ ඇඳීමෙන් සහ පියවර 1 - 7 සඳහා සුදුසු ප්‍රතිකාරක ලැයිස්තුවේ දී ඇති ඒවායින් පමණක් තෝරාගෙන ලිවීමෙන්, මෙම ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සම්පූර්ණ කරන්න.



ප්‍රතිකාරක ලැයිස්තුව


HBr, PBr<sub>3</sub>, පිරිවිනියම්ක්ලෝරොක්‍රෝමේට් (PCC),

Mg / විශලී ඊතර්, KCN, සාන්ද්‍ර  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , තනුක  $\text{H}_2\text{SO}_4$

(ලකුණු 52 යි)

- (ii) පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා දාමය සලකන්න.


**G, H** සහ **K** සංයෝගවල ව්‍යුහ අඳින්න. **X, Y** සහ **Z** ප්‍රතිකාරක දෙන්න.



**K**,  $\text{NaNO}_2$  / තනුක  $\text{HCl}$  සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට බෙන්සිල් ඇල්කොහොල් ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ ) ලබා දෙන බව සලකන්න.


(ලකුණු 24 යි)

- (b) (i) පහත දැක්වෙන පරිවර්තනය තුනකට නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් සිදු කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න.



(ලකුණු 20 යි)

- (ii) පහත ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.



මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන **P** සහ **Q** රසායනික ද්‍රව්‍යයන් හඳුනාගන්න.

මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ යන්ත්‍රණය ලියන්න.

(ලකුණු 20 යි)

- (c) (i) බෙන්සිල්වලට වඩා ඊතෝල් ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලදී ප්‍රතික්‍රියාශීලී වන්නේ මන්දැයි ඒවායේ සම්ප්‍රයුක්ත දෙමුහුම් සලකමින් පැහැදිලි කරන්න.

- (ii) සුදුසු ප්‍රතික්‍රියාවක් අනුසාරයෙන් ඊතෝල් සහ බෙන්සින් අතර ඉහත (i) හි දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාවයේ වෙනස විදහා දක්වන්න.

- (iii) ඔබ ඉහත (ii) හි විස්තර කරන ලද ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලයේ/ඵලයන්හි ව්‍යුහය/ව්‍යුහ අඳින්න. (ලකුණු 34 යි)

- ඉඟිය:**  
E යනු ආවර්තිතා වගුවේ මුල් ආවර්ත දෙකට අයත් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් අඩංගු සංයෝගයකි.

**ලේඛන:**  
 ◊ A ලෝහයකි  
 ▢ B ලා කොළ  
 ○ C අවර්ණ, ගන්ධයක් රහිත  
 ▽ D කැත්ත කොළ  
 ▴ L කළු  
 ▽ M ලා කහ/කිරි සුදු  
 ▢ ප්‍රබල ඒකභාස්මික අම්ලය  
 ○ K අවර්ණ, දුර්ගන්ධ  
 ▢ J කහ-දුඹුරු  
 ▽ Q සුදු  
 ○ P නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකයෙන් තෙත් කරන ලද පෙරහන් කඩදාසිය දුඹුරු පැහැයට හරවයි.  
 ▢ O ස්වල්ප ලෙස ආම්ලික  
 ▢ N තද රතු  
 ▽ F රතට හුරු දුඹුරු  
 ▢ H  
 ▴ I තද නිල්  
 ◊ G රතට හුරු දුඹුරු  
 ▢ E අවර්ණ

**රසායනික ප්‍රතික්‍රියා:**  
 A + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → B + C  
 B + NaOH → D  
 D + L + M + ප්‍රබල ඒකභාස්මික අම්ලය → K  
 K + NH<sub>4</sub>OH → J  
 J + AgNO<sub>3</sub> → Q  
 Q + NH<sub>4</sub>OH → P  
 J + NaOH → O + N  
 O + NaOH → P  
 J + NH<sub>4</sub>OH → F  
 F + HNO<sub>3</sub> → I + H  
 F → G (රත් කිරීම)

- ## શ્રી યાત્રિકી વેબ

(ලකුණු 75 යි)

10. (a) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් ( $\text{TiO}_2$ ) වල ගුණ සහ එහි නිෂ්පාදනය “ක්ලෝරයිඩ් ක්‍රියාවලිය” මගින් සිදු කිරීම මත පදනම් වේ.

- (i) මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිත වන අමුද්‍රව්‍ය නම් කරන්න.
- (ii) නිසි අවස්ථාවන්හි තුලින් රසායනික සමීකරණ භාවිත කරමින්  $\text{TiO}_2$  නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
- (iii)  $\text{TiO}_2$  වල ගුණ තුනක් සඳහන් කර, එක් එක් ගුණයට අදාළ භාවිතයක් බැගින් දෙන්න.
- (iv) ශ්‍රී ලංකාවේ  $\text{TiO}_2$  නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ඔබ සලකා බලන්නේ නම්, සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා තුනක් සඳහන් කරන්න.
- (v) ඉහත (ii) හි විස්තර කළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගෝලීය උණුසුම සඳහා දායකවන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න. (ලකුණු 50 යි)

(b) හරිතාගාර ආවරණයෙහි වෙනස්වීම හේතුකොටගෙන වර්තමානයේ පෘථිවිගෝලයේ උණුසුම් වීම කාර්මික විප්ලවයට පෙර පැවැති තත්ත්වයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත.

- (i) හරිතාගාර ආවරණය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (ii) පෘථිවිගෝලය උණුසුම් වීම නිසා සිදුවන ප්‍රධාන පාරිසරික ගැටලුව හඳුනාගන්න.
- (iii) ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට දායක වන ප්‍රධාන ස්වාභාවික වායුන් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) ඔබ (iii) හි සඳහන් කළ වායුන් දෙක පරිසරයට මුදාහැරීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් දායක වන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් කළ වායුවලට අමතරව ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට සෘජුවම දායක වන කෘත්‍රිම වාෂ්පශීලී සංයෝග කාණ්ඩ දෙකක් නම් කර, එක් කාණ්ඩයකින් එක් සංයෝගය බැගින් තෝරාගෙන ඒවායේ ව්‍යුහ අඳින්න.
- (vi) ඉහත (v) හි සඳහන් කළ සංයෝග කාණ්ඩ දෙක අතුරෙන් ඉහළ වායුගෝලයේ ඕසෝන් වියෝජනය උත්ප්‍රේරණයට දායක වන එක් සංයෝග කාණ්ඩයක් හඳුනාගන්න.
- (vii) කොවිඩ්-19 අධිවසංගතය හේතුවෙන් කාර්මික කටයුතු අඩාල වීම නිසා බොහෝ රටවල ගෝලීය පාරිසරික ප්‍රශ්න තාවකාලිකව සමනය වී ඇත. ඔබ ඉගෙන ගත් ප්‍රධාන ගෝලීය පාරිසරික ප්‍රශ්න දෙකක් අනුසාරයෙන් මෙම ප්‍රකාශය සනාථ කරන්න. (ලකුණු 50 යි)

(c) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න දී ඇති බහුඅවයවක මත පදනම් වේ.

පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (PVC), පොලිඑතිලීන් (PE), පොලිස්ටයිරීන් (PS), බේක්ලයිට්, නයිලෝන් 6.6, පොලිඑතිලීන් ටෙරිජිනැල්ට් (PET), ගටා පර්වා (Gutta percha)

- (i) ඉහත සඳහන් බහුඅවයවක හතරක පුනරාවර්තී ඒකක අඳින්න.
- (ii) ඉහත සඳහන් බහුඅවයවක හත (7)
  - I. ස්වාභාවික හෝ කෘත්‍රිම බහුඅවයවක
  - II. ආකලන හෝ සංඝනන බහුඅවයවක
 ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න.
- (iii) බේක්ලයිට් සෑදීමේදී භාවිත වන ඒක අවයවක දෙක නම් කරන්න.
- (iv) බහුඅවයවක ඒවායේ තාපජ ගුණ අනුව වර්ග දෙකකට බෙදිය හැක. එම වර්ග දෙක සඳහන් කරන්න. PVC සහ බේක්ලයිට් මින් කුමන වර්ගයන්ට අයත්දැයි ලියන්න.
- (v) ඉහත ලැයිස්තුවෙහි බහුඅවයවක තුනක් සඳහා භාවිත එක බැගින් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 50 යි)

\* \* \*



### ආවර්තික වගුව

	1																	2
1	H																	He
	3	4											5	6	7	8	9	10
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
	11	12											13	14	15	16	17	18
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
	55	56	La-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
6	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
	87	88	Ac-	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
7	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
<b>La</b>	<b>Ce</b>	<b>Pr</b>	<b>Nd</b>	<b>Pm</b>	<b>Sm</b>	<b>Eu</b>	<b>Gd</b>	<b>Tb</b>	<b>Dy</b>	<b>Ho</b>	<b>Er</b>	<b>Tm</b>	<b>Yb</b>	<b>Lu</b>
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
<b>Ac</b>	<b>Th</b>	<b>Pa</b>	<b>U</b>	<b>Np</b>	<b>Pu</b>	<b>Am</b>	<b>Cm</b>	<b>Bk</b>	<b>Cf</b>	<b>Es</b>	<b>Fm</b>	<b>Md</b>	<b>No</b>	<b>Lr</b>



**WWW.PastPapers.WIKI**

Sri Lanka Biggest past papers Bank