

Studio di funzione – Studio qualitativo

QUANDO FARLO:

Quando è complesso calcolare $f(x) > 0$

COME FARLO:

1) si fanno:

- lo studio del dominio
 - lo studio delle intersezioni con l'asse y, ovvero $f(0)$
 - lo studio degli asintoti
 - lo studio degli intervalli di monotonia, ovvero $f'(x) > 0$
- 2) Si inseriscono, al posto delle intersezioni con l'asse delle x, dei valori placeholder α
- 3) Si stimano i valori α

Quindi, si saltano:

- lo studio della positività
- lo studio delle intersezioni con l'asse x, ovvero $f(x) = 0$
- lo studio delle simmetrie

Circa lo studio delle simmetrie:

Nel 99% delle tracce del prof Pisani ci sono funzioni né pari né dispari.

Inoltre, se anche la funzione fosse simmetrica, è possibile tracciarla lo stesso senza saperlo.

Lo studio delle simmetrie serve solo a velocizzare (ci si limita a studiare metà grafico se la funzione è simmetrica).

Esempio 1 (traccia del 13/06/2017, versione b):

$$\frac{x^5 - 20x^2 + 20}{x^2 - x - 2} \geq 0$$

PERCHÉ FARE LO STUDIO QUALITATIVO:

Qui serve lo studio qualitativo perché c'è una funzione di 5° grado, di cui è difficile calcolare le x.

1) Studio del numeratore (studio qualitativo)

$$N: x^5 - 20x^2 + 20 \geq 0$$

Non posso risolvere questa disequazione, di 5° grado, scomponendo (con Ruffini o altro), sarebbe troppo complesso.

Faccio uno studio qualitativo della funzione $f(x) = x^5 - 20x^2 + 20$

1.1) Studio del Dominio:

$$D = \mathbb{R}$$

1.2) Studio della positività, $f(x) > 0$:

lo salto

1.3.1) Studio delle intersezioni con l'asse delle x, $f(x) = 0$:

lo salto

1.3.2) Studio delle intersezioni con l'asse delle y, $f(0)$:

$$f(0) = (0)^5 - 20 \cdot (0)^2 + 20$$

Abbiamo quindi il punto A (0, 20).

1.4) Studio delle Simmetrie:

lo salto (la funzione non è né pari né dispari)

1.5.1) Studio degli Asintoti verticali:

Non ci sono asintoti verticali (non ci sono punti di discontinuità, e gli estremi sono $\pm\infty$).

1.5.2) Studio degli Asintoti orizzontali:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 - 20x^2 + 20) = [\dots] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^5 - 20x^2 + 20) = [\dots] = -\infty$$

Questo ci dice che verso sx la funzione decresce a $-\infty$, mentre verso dx cresce a $+\infty$.

1.5.3) Studio degli Asintoti obliqui:

$$m_{dx} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 - 20x^2 + 20) \cdot \frac{1}{x} = [\dots] = +\infty$$

$$m_{sx} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^5 - 20x^2 + 20) \cdot \frac{1}{x} = [\dots] = +\infty$$

1.6.1) Studio degli intervalli di monotonia, $f'(x)$:

$$5x^4 - 40x > 0$$

$$5x(x^3 - 8) > 0$$

$$5x(x-2)(x^2 + 2x + 4) > 0$$

$$N_{F_1}: 5x > 0 \rightarrow x > 0$$

$$N_{F_2}: x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$$

$$N_{F_3}: x^2 + 2x + 4 > 0 \rightarrow \forall x \in \mathbb{R}$$


$$N: x < 0 \vee x > 2$$

1.6.2) Studio dei punti di massimo/minimo:

$f(0)$ l'ho già calcolato prima.

$$f(2) = [\dots] = -28$$

1.7) Grafico della $f(x)$ al numeratore:



Quindi:

$$N \geq 0 \rightarrow \alpha_1 \leq x \leq \alpha_2 \vee x \geq \alpha_3$$

NB: Non conosco le intersezioni con l'asse delle x , per cui ho usato dei valori placeholder $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

2) Studio del denominatore

$$D: x^2 - x - 2 > 0 \rightarrow [\dots] \rightarrow x < -1 \vee x > 2$$

3) Studio dei valori della disequazione

Non conosco i valori di $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, quindi non so come fare il grafico comparativo di numeratore e denominatore.
Ad esempio, non so se $\alpha_1 < -1$ oppure $\alpha_1 > -1$.

Per α_1 :

Guardando il grafico:

- So che $f(\alpha_1) = 0$.
- So che, per $x < \alpha_1$, $f(x) < 0$
- So che, per $\alpha_1 < x < 0$, $f(x) > 0$

Se $f(-1) < 0$, allora $-1 < \alpha_1$

Se $f(-1) > 0$, allora $-1 > \alpha_1$

$$f(-1) = (-1)^5 - 20(-1)^2 + 20 = -1 - 20 + 20 = -1$$


Quindi $-1 < \alpha_1$

Per α_2 :

Guardando il grafico, so che $0 < x < \alpha_2$

Per α_3 :

Guardando il grafico, so che $0 < x < \alpha_3$



Esempio 2 (traccia del 13/06/2017, versione b):

$$\text{Studiare } f(x) = \frac{x^3 + x^2}{x^2 + 1} - 3 \arctan(x)$$

PERCHÉ FARE LO STUDIO QUALITATIVO:

Qui serve lo studio qualitativo perché ci sono 2 funzioni (una polinomiale, una goniometrica) difficili da calcolare insieme.

Motivo 1:

Il prof Pisani ritiene sia "poco preciso" fare lo studio comparativo delle due funzioni, ovvero:

$$\frac{x^3 + x^2}{x^2 + 1} = 3 \arctan(x)$$

Motivo 2:

I calcoli diventano complicatissimi se portassi la funzione goniometrica nella frazione, ovvero:

$$\frac{x^3 + x^2 - 3 \arctan(x) \cdot (x^2 + 1)}{x^2 + 1}$$

1) Studio del Dominio: $[...] \rightarrow D = \mathbb{R}$

2) Studio della Positività, $f(x) > 0$: lo salto

3.1) Studio delle intersezioni con l'asse delle y, $f(x) = 0$: lo salto

3.2) Studio delle intersezioni con l'asse delle x, $f(0)$: $[...] \rightarrow f(0) = 0$

4) Studio delle simmetrie: lo salto (la funzione non è né pari né dispari)

5) Studio degli asintoti:

Non ci sono asintoti verticali. Non ci sono asintoti orizzontali.

Ci sono 2 asintoti obliqui.

$$m_{sx} = 1, \quad q_{sx} = 1 + \frac{3}{2}\pi, \quad y_{sx} = x + 1 + \frac{3}{2}\pi$$
$$m_{dx} = 1, \quad q_{dx} = 1 - \frac{3}{2}\pi, \quad y_{dx} = x + 1 - \frac{3}{2}\pi$$

6) Studio intervalli Monotonia:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 2x)(x^2 + 1) - (x^3 + x^2)(2x)}{(x^2 + 1)^2} - \frac{3}{1 + x^2} = [...] = \frac{x^4 + 2x - 3}{1 + x^2}$$

\Rightarrow Scompongo $x^4 + 2x - 3$ con Ruffini $\Rightarrow [...] \Rightarrow (x - 1)(x^3 + x^2 + x + 3) \Rightarrow$

$$f'(x) = \frac{(x - 1)(x^3 + x^2 + x + 3)}{1 + x^2} > 0$$

$$N_1 > 0 \Rightarrow x > 1$$

$$N_2 > 0 \Rightarrow \text{Faccio lo studio qualitativo} \Rightarrow [...] \Rightarrow x > \alpha$$

$$D > 0 \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}$$

[...]