

١٤ (١٩٢٠) مبنی بر این است که x و x^2 در جبر حلقه های پهنه ها در $\mathbb{R}$ است. البته برای $\mathbb{R}$ و $\mathbb{C}$ این به سادگی می توان گفت که $\mathbb{R}$ و $\mathbb{C}$ حلقه های پهنه ها هستند.

$$\nabla(-X_A) + X \circ (\nabla + X_A - \nabla - X_A - X_A) = (X \circ (\nabla - X_A)) - \nabla(-X_A) - X_A$$

[illegible]

$$\begin{array}{r} X\lambda \\ \hline \psi - X \end{array} \quad \begin{array}{r} X\circ 1 - X\lambda + \\ \hline \psi 1 - X\lambda - X\lambda \end{array}$$

$$X_A = \frac{X}{X_A}$$
 یعنی: نسبتی که حاصل تقسیم غلظت جرمی از این اجزا بر غلظت جرمی از این اجزا باشد.

د کڅوځو کړنيزو ځواکونو د ځانگړتيا څرگندول

[illegible]

مثال: $x^2 - x - 1$ و $x^2 - x - 1$ جذب یز

$$\left. \begin{array}{l} v > \lambda \\ \delta \lambda = \lambda + v \times \lambda \end{array} \right\}$$

۱۰۰ : یس | کہ؟ یہ کہہ رہے ہیں

[illegible]

$$\begin{array}{r} 2 \\ 22 \\ \hline 44 \end{array}$$

: لے مکنہ جیو، اراک اراک لے مکنہ جیو

۱) مذهب به معنی دین است

$$\frac{Z_1 X}{Z_1 Y_1 + Z_1 - Y_1 X_1} \quad (c)$$

$$\frac{-\gamma^1 a^1 b^1 c}{\gamma^1 a^1 b^1 c} \quad \text{الف)}$$

۱۰. متهم و مجرم و بازمانده قتل

$$\frac{\boxed{} + \boxed{}}{x-7} \mid 2x^2 - 5x - 1 \quad \text{ب)}$$

تقسیم مستقیم را به انجام دهید:

$$\frac{\boxed{x}}{x-7} \mid \frac{2x^2 - 5x - 1}{x^2 \pm 7x} \quad \text{الف)}$$

مثال ۳۰:

را حل و به هر دو راهی جواب دهید. توجه کنید که در این مسئله دو راهی داریم و از هر دو راهی به یک نتیجه می‌رسیم.

تمرین

است. بسازید و به هر دو راهی جواب دهید. توجه کنید که در این مسئله دو راهی داریم و از هر دو راهی به یک نتیجه می‌رسیم.

$$\frac{\cancel{2x^2} \pm \cancel{14x} + \cancel{7}}{\cancel{2x^2} - \cancel{14x} + 7} \mid \frac{2x^2 - 14x + 7}{x^2 \pm 7x} \quad \text{ب)}$$

مثال ۳۰:

به هر دو راهی جواب دهید. توجه کنید که در این مسئله دو راهی داریم و از هر دو راهی به یک نتیجه می‌رسیم.

به هر دو راهی جواب دهید. توجه کنید که در این مسئله دو راهی داریم و از هر دو راهی به یک نتیجه می‌رسیم.

به هر دو راهی جواب دهید. توجه کنید که در این مسئله دو راهی داریم و از هر دو راهی به یک نتیجه می‌رسیم.

به هر دو راهی جواب دهید. توجه کنید که در این مسئله دو راهی داریم و از هر دو راهی به یک نتیجه می‌رسیم.

$$\frac{2x^2 - 14x + 7}{x^2 \pm 7x} \mid \frac{2x^2 - 14x + 7}{x^2 \pm 7x} \quad \text{ب)}$$

$$x^3 + x^2 - 3x - 3 \text{ و } x^3 - 3x - 3 \text{ و } x^3 + x^2$$

۵- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم عبارت زیر به دست آورید.

۴- اگر چند جمله‌ای $ax^2 + a + 10x^2 - 10x^2 + 4x^2 + 3x^2 + 3$ بر $4x^2 + 3x^2 + 3$ بخش پذیر باشد، a را به دست آورید.

۳- حجم یک جعبه به شکلی مستطیل برابر با $48x^3 + 14x^2 + 15x + 3$ است. اگر ارتفاع این جعبه x و طول آن $4x + 4$ باشد، عرض آن را به دست آورید.

۲- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم زیر را مشخص کنید و درستی عمل تقسیم را با نوشتن روابط

تقسیم نشان دهید.

$$-3x^4 + 4x^3 + x^2 + 5 \mid 1 - x^3$$

۱- خارج قسمت و باقیمانده تقسیم زیر را مشخص کنید و درستی عمل تقسیم را با نوشتن روابط

$$8x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 1x + 3 \mid x^2 + 3$$

$$(4 - 3y - 9)(3y^2 - 10y - 4) \div (3y - 4)$$

$$(x^3 - 1)(x^2 - 1) \div (x - 1)$$

$$(b) \frac{8a^2y^3 - a^2y^2 + 15xy^2}{-5y^2}$$

$$(a) \frac{-x^3y^2z^3 - 15x^2y^2z^3}{15x^2y^2z^3}$$

۱- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

تمرین

$$(b) -x^3 - 1x^2 + 8x \mid x^2 + 6$$

$$(a) 5x^3 - 19x^2 + 15x - 4 \mid 2 - x$$

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

سلاسل

درجه ۳- $4x^2 - 3$ کمتر است.

و درجه چند جمله‌ای باقیمانده از

$$= 10x^4 - 3x^2 + 8x - 19$$

$$=$$

$$(5x^2 + \square)(4x^2 - 3) + \text{---}$$

را بنویسید:

$$\begin{array}{r} \hline 10x^4 - 3x^2 + 8x - 19 \\ \hline 4x^2 - 3 \\ \hline \square + 10x^2 \\ \hline \end{array}$$

۲- کنید. راه حل را بنویسید و باقیمانده تقسیم را بنویسید.

فصل با حجم های استوانه، مخروط و منشور آشنا می شوید.
 ستون هایی به شکل منشور و مخروطی که گاهی در کنار جاده ها و در کنار رودخانه ها قرار دارند، به شکل منشور و مخروطی هستند. این منشورها و مخروطها در کنار جاده ها و رودخانه ها قرار دارند. این منشورها و مخروطها در کنار جاده ها و رودخانه ها قرار دارند. این منشورها و مخروطها در کنار جاده ها و رودخانه ها قرار دارند.

