

Resumo do [Boletim InfoGripe](#) -- Semana Epidemiológica (SE) 14 2025

Análises com base nos dados inseridos no SIVEP-Gripe até o dia 05/04/2025.

Semana epidemiológica 14: 30/03/2025 a 05/04/2025

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no SIVEP-Gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza-se data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do SIVEP-Gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro. Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizados em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

Índice

Casos de SRAG no país.....	1
Evolução dos casos e óbitos por faixa etária.....	2
Estimativa de casos recentes de SRAG por faixa etária.....	2
Casos por faixa etária e resultado laboratorial.....	3
Incidência e mortalidade.....	4
Nível de atividade e tendência dos novos casos de SRAG até a semana atual.....	8
Estados e Distrito Federal.....	10
Capitais e região de saúde central do Distrito Federal.....	14
Oportunidade de digitação desde a internação.....	15
Óbitos por SRAG no país.....	18

Pontos de destaque nesta atualização:

- No agregado nacional, observa-se um sinal de aumento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) e de curto prazo (últimas 3 semanas). Tal cenário é atribuído principalmente ao crescimento de SRAG nas crianças pequenas de até dois anos, associado ao VSR, em muitos estados do país.
- Na presente atualização, observa-se que 13 das 27 unidades federativas apresentam nível de incidência de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 14: Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.
- A manutenção do aumento de SRAG entre crianças de até dois anos está associada ao VSR, com níveis de incidência de moderado a muito alto em estados do Norte (AC e AP), Centro-Oeste (DF, MS e GO), Nordeste (MA), Sudeste (ES, MG e SP) e agora também na região Sul (PR). Além disso, é provável que o VSR também esteja impulsionando o crescimento de SRAG nas crianças pequenas no PA e MT.
- Outros estados do Sul, como RS e SC, também apresentam aumento de SRAG por VSR entre crianças, mas com níveis de incidência ainda baixos. No entanto, é provável que, nas próximas semanas, esse crescimento também atinja níveis moderados a altos de incidência.
- A manutenção do crescimento de SRAG nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos em alguns estados (DF, MG, RR e SE) é atribuída principalmente ao rinovírus.
- No MS, também é possível observar um início de aumento de casos de SRAG entre jovens, adultos e idosos, provavelmente associado ao vírus da Influenza A.
- Na presente atualização, observa-se que 13 das 27 capitais apresentam nível de incidência de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas), com tendência de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 14: Aracaju (SE), Belem (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Macapa (AP), Rio Branco (AC), Rio De Janeiro (RJ), Sao Luis (MA) e Vitoria (ES).
- Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 10,3% de Influenza A, 1,6% de Influenza B, 50,4% de vírus sincicial respiratório, 31,4% de Rinovírus, e 9,2% de SARS-CoV-2 (COVID-19). Já a prevalência entre os óbitos positivos foi de 11% de Influenza A, 1,2% de Influenza B, 6,7% de vírus sincicial respiratório, 19,5% de Rinovírus, e 57,9% de SARS-CoV-2 (COVID-19).

Situação nacional

A nível nacional, o cenário atual sugere que a situação de cada indicador se encontra nos seguintes níveis:

- Casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente de presença de febre:

- Sinal de aumento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) e de curto prazo (últimas 3 semanas).

- Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados **31.796 casos** de SRAG, sendo **12.527 (39,4%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **14.113 (44,4%)** negativos, e ao menos **3.060 (9,6%)** aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado.

- Dentre os casos positivos do ano corrente, observou-se **7% de Influenza A**, **2% de Influenza B**, **29,6% de vírus sincicial respiratório**, **29,6% de Rinovírus**, e **29,6% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de **10,3% de Influenza A**, **1,6% de Influenza B**, **50,4% de vírus sincicial respiratório**, **31,4% de Rinovírus**, e **9,2% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Incidência semanal de SRAG no Brasil em 2025:




Figura 1: Incidência semanal de SRAG notificada no Brasil, estimativa de casos recentes e tendência de curto (últimas 3 semanas) e longo prazo (últimas 6 semanas). Dados sujeitos a alteração.

A partir de método similar ao utilizado para estimar o total de novos casos semanais de SRAG, levando em conta a oportunidade de digitação no Brasil e em cada unidade da federação, também é possível estimar o número de novos casos por faixa etária. A figura abaixo apresenta tal estimativa para todo o país. No anexo I do [boletim completo](#) são apresentadas as estimativas para cada UF, que também podem ser obtidas no repositório público do InfoGripe, na [pasta de imagens das UFs](#).





Figura 2: Casos semanais de SRAG notificados no Brasil e estimativas de casos recentes, por faixas etárias de interesse. Dados sujeitos a alteração.

Em nível nacional, os casos de SRAG seguem em crescimento na faixa etária de até 4 anos, com sinal de retomada de crescimento nas crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Já nas faixas etárias a partir dos 15 anos, mantém-se o padrão de estabilidade, com exceção para idosos a partir de 65 anos que seguem em queda.

Incidência por faixa etária e resultado laboratorial

Novos casos de SRAG semanais por faixa etária. Dados até a semana 14 de 2025.
Para semanas recentes os dados são parciais (área cinza).



Os dados laboratoriais por faixa etária indicam que o aumento de casos de SRAG entre crianças de até dois anos está associado ao VSR. Já entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, o principal agente identificado é o rinovírus. Nas crianças de 2 a 4 anos, também se observa um número importante de SRAG por VSR. Entre adultos e idosos, os casos de SRAG por Influenza A começam a apresentar sinais de aumento.

Os gráficos de cada UF podem ser acessados no repositório público do InfoGripe, na [pasta de imagens das UFs](#).

Incidência e mortalidade nas últimas 8 semanas.




Figura 4: Média das incidências e mortalidade semanais de SRAG notificadas no Brasil nas últimas oito semanas. Dados sujeitos a alteração.

A incidência e mortalidade semanal média¹, nas últimas 8 semanas epidemiológicas, mantêm o cenário típico de maior impacto nos extremos das faixas etárias analisadas. Enquanto a incidência de SRAG apresenta impacto mais elevado nas crianças até 2 anos, em termos de mortalidade temos o inverso, com a população a partir de 65 anos sendo a mais impactada.

Em relação aos casos de SRAG por SARS-CoV-2, a incidência tem apresentado maior impacto em crianças pequenas e idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre os idosos a partir de 65 anos.

Em relação aos demais vírus com circulação relevante no país, o impacto nos casos de SRAG tem se concentrado nas crianças pequenas e associados principalmente ao VSR.

Por se tratar de um cenário que inclui as 4 últimas semanas epidemiológicas, a incidência e mortalidade apresentadas estão sujeitas a alterações.

¹ Novos casos em cada faixa etária divididos pela população correspondente e número de semanas no período.

Brasil

Novos casos de SRAG nas últimas 8 semanas (SE 7 a 14), por vírus identificado. Dados inseridos no SIVEP-Gripe até a semana 14 2025, sujeito a alterações.




Figura 5: Média da incidência semanal de SRAG notificadas no Brasil nas últimas oito semanas, por vírus e faixa etária de interesses. Dados sujeitos a alteração.

Brasil

Novos óbitos de SRAG nas últimas 8 semanas (SE 7 a 14), por vírus identificado. Dados inseridos no SIVEP-Gripe até a semana 14 2025, sujeito a alterações.




Figura 6: Média da mortalidade semanal de SRAG notificadas no Brasil nas últimas oito semanas, por vírus e faixa etária de interesses. Dados sujeitos a alteração.

Novos casos de SRAG semanais na população em geral. Dados até a semana 14 2025.
Para semanas recentes os dados são parciais (área cinza).




Figura 7: Casos de SRAG notificados por UF e para os vírus de interesse

Novos casos de SRAG semanais em crianças < 2 anos. Dados até a semana 14 de 2025.
Para semanas recentes os dados são parciais (área cinza).




Figura 8: Casos de SRAG notificados em crianças de até 2 anos de idade por UF e para os vírus de interesse

Nível de atividade e Tendência dos novos casos de SRAG até a semana atual

O indicador de nível de atividade atual aponta o nível de atividade da SRAG nas últimas duas semanas em comparação com o histórico de incidência da SRAG após a implementação da vacinação contra a Covid-19 no país. Os limiares de **Baixo Risco** e **Segurança** indicam que a incidência de SRAG ocorre em níveis relativamente baixos e seguros para a região. O limiar de **Alerta** sinaliza uma atividade acima do nível moderado, mas ainda abaixo do considerado alto. Já os limiares de **Risco** e **Alto Risco** apontam que os casos estão em patamares elevados e muito elevados, respectivamente. Vale destacar que esse indicador reflete o nível de atividade atual e não se trata de uma projeção para as próximas duas semanas.

O indicador de tendência atual dos casos de SRAG é uma estimativa obtida através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante as últimas 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento para a semana atual. Assim como o indicador de atividade de SRAG, reforçamos que o indicador de tendência se refere à semana atual, não se tratando de uma projeção para as próximas 6 semanas. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo **queda** ou **crescimento**. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos os sentidos, temos indicação de **estabilização ou oscilação** sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com os indicadores relativos aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade. A metodologia empregada no indicador de nível de atividade está descrita em [nota técnica - limiares](#) e a do indicador de tendência está descrita em [nota técnica - tendência](#)




Figura 9 : Nível de atividade (últimas duas semanas) e tendência atual (últimas 6 semanas) dos casos de SRAG para as UFs (painel superior) e capitais (painel inferior), com base nas estimativas de casos recentes.

Estados e Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas Unidades Federativas, com base no **município de notificação**.




Figura 10: Nível de atividade (últimas duas semanas) e tendência atual dos casos de SRAG (últimas 6 semanas) para as UFs, com base nas estimativas de casos recentes.

Conclusões:

Na presente atualização, observa-se que 13 das 27 unidades federativas apresentam nível de incidência de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 14: Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

A manutenção do aumento de SRAG em muitos estados das regiões Norte (AC, AP), Centro-Oeste (GO, MS e DF), Nordeste (MA) e o início de crescimento na região Sudeste (ES e MG), com níveis de incidência de moderado a muito alto, ocorre principalmente nas crianças pequenas (<2 anos), e é atribuído essencialmente ao VSR. Apenas nos estados do PA e no MT, ainda não é possível identificar o vírus responsável por esse aumento, mas, devido à faixa etária afetada e ao cenário epidemiológico do país, é provável que o VSR também esteja impulsionando esse crescimento.

No DF, MG, RR e SE, o rinovírus também tem contribuído para o aumento de casos entre crianças e adolescentes de 2 até 14 anos. Já no RN, ainda não é possível identificar o vírus responsável pelo crescimento de SRAG nessa faixa etária, mas é provável que também esteja sendo impulsionado pelo rinovírus.

No MS, também é possível observar um início de aumento de casos de SRAG entre jovens, adultos e idosos, provavelmente associado ao vírus da Influenza A.

Os estados do Amazonas e Tocantins também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta ou risco, porém com sinal de estabilização ou queda na tendência de longo prazo. Em TO, os casos de SRAG nas crianças pequenas se mantêm estáveis em níveis moderados de incidência.

Apesar de alguns estados das regiões Sul e Sudeste, como Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, não apresentarem incidência de SRAG geral em nível de risco, a incidência de SRAG nas crianças pequenas de até dois anos segue crescendo nesses estados, alcançando níveis de incidência de moderado a alto, o que requer atenção. Outros estados do Sul, como RS e SC, também

apresentam aumento de SRAG por VSR entre crianças, mas com níveis de incidência ainda baixos. No entanto, é provável que, nas próximas semanas, esse crescimento também atinja níveis moderados a altos de incidência.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise dos gráficos cada UF apresentados no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#) e na [pasta de imagens das UFs](#) do repositório público do InfoGripe.




Figura 11: Incidência semanal de SRAG notificada nas UFs, estimativas de casos recentes e limiares de atividade. Dados sujeitos a alteração.

Incidência estimada, notificada e limiares em < 2 anos




Figura 12: Casos semanais de SRAG notificados em crianças até 2 anos de idade nas UFs, estimativas de casos recentes e limiares de atividade. Dados sujeitos a alteração.

Incidência estimada, notificada e limiares em 65+ anos




Figura 13 : Casos semanais de SRAG notificados em idosos a partir de 65 anos de idade nas UF's, estimativas de casos recentes e limiares de atividade. Dados sujeitos a alteração.

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.




Figura 14: Nível de atividade (últimas 2 semanas) e tendência atual dos casos de SRAG (últimas 6 semanas, esquerda) para as capitais, com base nas estimativas de casos recentes.

Conclusões:

Na presente atualização, observa-se que 13 das 27 capitais apresentam nível de incidência de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas), com tendência de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 14: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Macapá (AP), Rio Branco (AC), Rio De Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Vitória (ES).

Além disso, 3 capitais também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém com sinal de estabilização ou oscilação na tendência de longo prazo: Cuiabá (MT), Palmas (TO) e Porto Velho (RO).

Em Florianópolis, Goiânia e Rio Branco o crescimento de SRAG se concentra nas crianças pequenas de até dois anos. Em Belém, Macapá, Rio de Janeiro, São Luís e Vitória o crescimento ocorre principalmente nas crianças de até 4 anos. Já em Aracaju o crescimento de SRAG se concentra nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, e em Boa Vista nas crianças e adolescentes de 5 a 14 anos.

Em Campo Grande, o crescimento de SRAG ocorre em praticamente todas as faixas etárias.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do boletim semanal do InfoGripe.

Oportunidade de digitação desde a internação

A figura a seguir apresenta informações a respeito do tempo, em semanas epidemiológicas, entre a data de internação e a data de digitação dos casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe, com base na semana de internação. Apresentamos os quantis 80, 90, e 95, que indicam o tempo mínimo necessário para serem digitados 80%, 90%, e 95% das internações ocorridas em cada semana epidemiológica. Isto é, quanto tempo é necessário aguardar para que tenhamos uma quantidade significativa dos casos ocorridos já inseridos no sistema, e como isso varia ao longo do tempo. Naturalmente, para semanas recentes sempre estaremos limitados às semanas já transcorridas. Por exemplo, se estamos na semana 10, o tempo máximo de atraso de digitação para internações ocorridas na semana 6 até o momento é de 4 semanas. Portanto, se os quantis associados aos casos da semana 6 estiverem em 3-4 semanas, isso sugere que ainda podemos ter um volume importante de casos entrando nas próximas semanas. Para auxiliar nesta avaliação, incluímos nos gráficos a linha horizontal que indica esse limite superior. Em uma situação ideal, teríamos essas curvas se estabilizando rapidamente na própria semana de ocorrência ou após apenas uma semana. Se as curvas mantêm ascensão à medida que olhamos para semanas cada vez mais antigas, isso é um indício que ainda há um passivo de informação a ser inserida mesmo para semanas distantes.


É sabido que há diversos fatores associados a eventuais demoras na digitação, podendo decorrer desde a necessidade de envio das fichas de notificação preenchidas em unidades de saúde à centrais de digitação (por ex., às secretarias municipais ou de estado de saúde), até à quantidade de agentes dedicados a essa tarefa específica, seja nas unidades de saúde com autorização de digitação, seja nas centrais; passando pela carga de demais atividades sob responsabilidade desses mesmos profissionais, principalmente em momentos de grande volume de casos simultâneos.

Quanto menor for a oportunidade de digitação, mais ágil é a inserção das ocorrências no SIVEP-Gripe e, conseqüentemente, mais representativo da situação atual é o dado das semanas recentes, e menor o impacto de usar dados por data de digitação ao invés da data de internação ou de primeiros sintomas para análise de situação. Por outro lado, quanto maior esse tempo, mais incompleta é a informação das semanas recentes e mais distante da realidade é a curva de casos por data de digitação, por conter pouca informação das semanas recentes e muitos casos de semanas mais distantes, nos dando um retrato do passado, não do momento atual. Nessas situações, os modelos de nowcast que levam em conta esse perfil do atraso para estimar os casos recentes se tornam imprescindíveis para avaliação adequada da situação atual. Por fim, vale destacar que, para esses modelos, a manutenção de um perfil de oportunidade relativamente constante auxilia na precisão do modelo. Locais com grandes variações acabam por diminuir a precisão dos mesmos.

As figuras a seguir apresentam a oportunidade de digitação a partir da data de notificação para os casos agregados por (1) estado da notificação, e (2) capital da notificação.

Dados digitados até a semana epidemiológica 2025 14

Oportunidade de digitação em relação à internação



Oportunidade de digitação em relação à internação

Dados notificados na capital, digitados até a semana epidemiológica 2025 14



Situação nacional

- **Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**, independentemente de presença de febre:
 - Referente aos óbitos de SRAG em 2025, já foram registrados **2.152 óbitos** de SRAG, sendo **964 (44,8%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **971 (45,1%) negativos**, e ao menos **54 (2,5%)** aguardando resultado laboratorial.
 - Dentre os óbitos positivos do ano corrente, observou-se **7,4% de Influenza A**, **2,5% de Influenza B**, **2,9% de vírus sincicial respiratório**, **9,6% de Rinovírus**, e **74,9% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os óbitos positivos foi de **11% de Influenza A**, **1,2% de Influenza B**, **6,7% de vírus sincicial respiratório**, **19,5% de Rinovírus**, e **57,9% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Os dados de óbitos sofrem alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**