



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 5

Kunci Lembar Latihan P5

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$\frac{A\pi}{6}$ dan $(45B)^\circ$. Contoh: $\frac{7\pi}{6}$ dan 90° .
1.2	Sisi miring $\sqrt{A^2 + B^2}$. $\sin \theta = \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}$, $\cos \theta = \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}$, $\tan \theta = \frac{A}{B}$. Contoh: $\frac{7}{\sqrt{53}}$, $\frac{2}{\sqrt{53}}$, $\frac{7}{2}$.
1.3	$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4}$.

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$h = 10A \tan 30^\circ = \frac{10A}{\sqrt{3}} \approx 5,77A$ m. Contoh: sekitar 40,4 m.
2.2	Bergantung pada sisa pembagian A oleh 4: sisa 1 memberi 1, sisa 2 memberi 0, sisa 3 memberi -1, sisa 0 memberi 0. Untuk $A = 7$: -1.
2.3	Amplitudo A , periode $\frac{2\pi}{B}$, range $[1 - A, 1 + A]$. Contoh: 7, π , $[-6, 8]$.
2.4	$\cos^2 t = 1 - \frac{A^2}{(A+1)^2} = \frac{2A+1}{(A+1)^2}$; kuadran II negatif: $\cos t = -\frac{\sqrt{2A+1}}{A+1}$. Contoh: $-\frac{\sqrt{15}}{8}$.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Kiri $\sin \pi = 0$, kanan 2. Sinus tidak bisa dibagikan ke perkalian dengan konstanta di dalamnya. Rumus yang benar $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
3.2	Pengali di dalam memampatkan grafik. Periode $\frac{2\pi}{A}$. Untuk $A = 1$ kebetulan sama.
3.3	Kalkulator di mode derajat, sehingga dihitung $\sin 0,5236^\circ$. Di mode radian hasilnya 0,5.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	Bagi $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ dengan $\cos^2 t$. Model: $h(t) = (A + 12) - (A + 10) \cos\left(\frac{2\pi t}{2B+4}\right)$; titik terendah 2 meter.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal: kalkulator di mode yang salah, periode yang dikalikan alih-alih dibagi, dan tanda kuadran yang terlupa saat memakai identitas Pythagoras.