

अंगूर के रोग

1. डाउनी फफूंदी: प्लाज्मोपरा विटिकोला



लक्षण

- पत्तियों की ऊपरी सतह पर अनियमित, पीले, पारदर्शी खेल। तदनुसार निचली सतह पर, पत्तियों पर सफेद, पाउडर वृद्धि।
- समय से पहले झड़। निविदा शूटिंग का बौना। भूरी, तने पर धंसे हुए घाव।
- जामुन पर कवक का सफेद विकास जो चमड़े और सूखने वाला हो जाता है।

मैनेजमेंट

- स्प्रे बोर्डो मिश्रण 1% या मेटालक्सिल + मैनकोजेब 0.4%

2. पाउडर फफूंदी: अनसिनुला नेकेटर



लक्षण

- पाउडर वृद्धि ज्यादातर पत्तियों की ऊपरी सतह पर।
- फूलों के संक्रमण के परिणामस्वरूप फूलों और खराब फल सेट को बहा दिया जाता है।
- पाउडर विकास पुराने जामुन पर दिखाई देता है और संक्रमण के परिणामस्वरूप जामुन की त्वचा की खुर होती है।

मैनेजमेंट

- स्प्रे अकार्बनिक सल्फर 0.25% या चिनोमेथियोनेट 0.1% या डिनोकैप 0.05%।

3. बर्ड आई स्पॉट/एंथ्रेक्नोस: ग्लोओस्पोरियम एम्पिलोफेगम**लक्षण**

- रोग बेरी पर गहरे लाल धब्बे के रूप में पहले दिखाई देता है। बाद में, ये धब्बे गोलाकार, धंसे हुए, राख-ग्रे होते हैं और देर के चरणों में ये धब्बे एक काले मार्जिन से घिरे होते हैं जो इसे "पक्षी की आंखों की सड़ांध" उपस्थिति देता है।
- कवक शूटिंग, टेंड्रल, डंठल, पत्ती की नसों और फलों के तने पर भी हमला करता है।
- ये धब्बे एकजुट हो सकते हैं और तने को करवट सकते हैं, जिससे युक्तियों की मृत्यु हो सकती है।

मैनेजमेंट

- संक्रमित टहनियों को हटाना। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% या Mancozeb 0.25%।