

## अंगूर की कीट

### प्रमुख कीट

1	दाखलता स्टेम गर्डलर	स्थेनियास ग्रिसेटर
2	अंगूर बेल पिस्सू बीटल	Scelodonta strigicollis
3	दाखलता थ्रिप्स	रिपिफोप्रोथ्रिप्स कूएंटेस
4	दाखलता मीली बग	मैकोनेलिकोकस हिर्सुकस

### मामूली कीट

1	लीफ रोलर	सिपेरा लुनालिस
2	स्किंगिड	हिप्पोशन सेलेरियो
3	लीफ खान	फिलोसनिसिटिस टोपरचा
4	पंख पतंग	ऑक्सीटिलस रेगुलस
5	फल चूसने वाला पतंग	ओथरेस स्पीप। अचिया जनता

### 1. दाखलता स्टेम गर्डलर: *Sthenias ग्रिसेटर*

**मेजबान रेंज:** गुलाब झाड़ियों, शहतूत, बगीचे झाड़ियों, लताएं, क्रॉटन, आम, बादाम, जैक-फल, बोगेनविलिया और भारतीय राख-पेड़।

#### नुकसान के लक्षण

- ग्रब छाल और सुरंगों में सूखी लकड़ी में बोर होता है जिसके परिणामस्वरूप शाखाओं का मुरझाना और फिर पूरी बेल होती है।
- वे छाल को फैशन (गर्डलिंग) जैसे गोलाकार रिंग में काटते हैं जो कट के ऊपर के क्षेत्र के सूखने की ओर जाता है।

#### मैनेजमेंट

- छंटाई ने गिरडलिंग पॉइंट के नीचे शाखाओं पर हमला किया और बीटल को नष्ट कर दिया।
- मोनोक्रोटोफॉस 36 एसएल के साथ बेलें स्प्रे करें 1.0 एल या कार्बोरिल 50 डब्ल्यूपी 1.0 किलो 500 में - 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर।



## 2. अंगूर बेल पिस्सू बीटल: *Scelodonta strigicollis*

### नुकसान के लक्षण

- वयस्क निविदा पत्तियों पर छोटे छेद बनाता है जबकि ग्रब्स जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।

### मैनेजमेंट

- कांट-छांट के बाद ढीली छाल निकालें।
- वयस्क बीटल ले लीजिए और मार डालो।
- स्प्रे कार्बोरिल 50 डब्ल्यूपी 1.0 किलो या क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी 1.0 एल में 500 - 1000 एल पानी /

## 3. दाखलता थ्रिप्स: *रिपिफोरोट्रिप्स कूएंटास*

**मेजबान रेंज:** अनार, गुलाब, जामुन, बादाम, अमरूद, अंगूर, आम, कैलोट्रोपिस खरपतवार।

### नुकसान के लक्षण

- दोनों नस्लों और वयस्कों के काले मल के साथ पत्तियों पर चांदी सफेद पैच के कारण पत्तियों पंगु।
- गंभीर संक्रमण के परिणामस्वरूप पीला और मुरझा जाता है।

### मैनेजमेंट

- बाग से घास निकालें और पीड़ित पत्तियों की छंटाई करें।
- मिट्टी को समय-समय पर रेक करें।
- स्प्रे मैलाथियान 50 ईसी 1.0 एल में 500 - 1000 एल प्रति हेक्टेयर फूल और फिर से फल सेट से पहले।

## 4. दाखलता मीली बग: *मैकोनेलिकोकस हिर्सुस*

**मेजबान रेंज:** दाखलता, हिबिस्कस, शहतूत, अमरूद, कस्टर्ड सेब, भिंडी, इमली और ग्लारिसिडिया।

### नुकसान के लक्षण

- दोनों नस्लों और वयस्कों रस चूसना है कि crinkling और पत्तियों के पीले और जामुन के सड़ में परिणाम है।

### मैनेजमेंट

- लताओं को डिछालें और जनसंख्या को कम करने के लिए 1 मिलीलीटर /
- स्प्रे डाइक्लोरवास 1.0 एल या क्लोरपाइरिफॉस 1.25 एल या बुप्रोफेजिन 25 एससी 1.0-1.5 एल यामेथोमिल 40 एसपी 1.500 के साथ 25 किलो -1000 एल पानी/
- रिलीज ऑस्ट्रेलियाई महिला पक्षी बीटल *क्रियोलियामस मोंटरूज़ियरी* @ 2500 - 3750 प्रति हेक्टेयर