

अनार की बीमारी

1. सेर्कोस्पोरा फ्रूट स्पॉट: सेर्कोस्पोरा एसपी।



लक्षण

- प्रभावित फलों ने छोटे अनियमित काले धब्बे दिखाए, जो बाद में बड़े स्थानों में मिलते थे।

मैनेजमेंट

- रोगग्रस्त फलों को एकत्र कर नष्ट करना चाहिए। मंकोजेब 0.25% के साथ 15 दिन के अंतराल पर दो से तीन स्प्रे करें।

2. लीफ स्पॉट या तुषार: कोलेटोट्रिकम ग्लोस्पोरियोइड्स; छद्म सेकॉसपोरा पुनिका; *Curvularia* लुनेटा और सेर्कोस्पोरा पुनिका)



लक्षण

- पत्तियों पर छोटे, अनियमित और पानी से भरे धब्बे। प्रभावित पत्तियां गिर ती हैं।

मैनेजमेंट

- मैनकोजेब 0.25% छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर बीमारी का अच्छा नियंत्रण देता है।

3. अल्टरनेरिया फ्रूट स्पॉट: अल्टरनेरिया वैकल्पिक



लक्षण

- फलों पर छोटे लाल भूरे रंग के गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं।
- एरिल प्रभावित हो जाते हैं जो पीला हो जाते हैं और खपत के लिए अयोग्य हो जाते हैं।

मैनेजमेंट

- सभी प्रभावित फलों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। मैनकोजेब 0.25% छिड़काव। प्रभावी ढंग से रोग को नियंत्रित करता है।

4. फल सड़ांध (एस्परगिलस भ्रूण)






लक्षण

- रोग कैलिव्स के अंत से शुरू होता है और धीरे-धीरे पूरे फल काले धब्बे दिखाता है।
- फल आगे एक बेईमानी से गंध उत्सर्जित सड़ जाता है।

मैनेजमेंट

- बाविस्टिन (0.5 फीसदी), डायथेन एम-45 (0.25%) के छिड़काव से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। या डायथेन जेड-78 (0.25%) फूलों की शुरुआत से 10-15 दिनों के अंतराल पर।



LEARNIZY