

पपीते की बीमारी

1. पाउडर फफूंदी - ओडियम कैरिकी



लक्षण

- माइसेलिया की वृद्धि पत्ती, फूलों के डंठल और फल की ऊपरी सतह पर दिखाई देती है जो पत्तियों के पीले और झड़ने का कारण बनती है।

मैनेजमेंट

- स्प्रे वेटेबल सल्फर 0.25% या डिनोकैप 0.05% या चिनोमेथियोनेट 0.1% या ट्रिडिमोर्फ 0.1%।

2. पपीता रिंग स्पॉट - पपीता रिंग स्पॉट वायरस



लक्षण

- नस समाशोधन, पक और क्लोरोफिल पत्ती ऊतकों में लॉबिंग
- पत्तियां नीचे और अंदर की ओर रोल करती हैं, मोड़ेक मोटलिंग, गहरे हरे फफोले, पत्तियों की विकृति जिसके परिणामस्वरूप जूता स्ट्रिंग सिस्टम और पौधों का स्टंटिंग होता है।
- फलों पर परिपत्र गाढ़ा छल्ले का उत्पादन कर रहे हैं। यदि पहले कोई फल गठन प्रभावित नहीं है।

मैनेजमेंट

- प्रभावित पौधों को तुरंत लक्षणों को देख रहे हैं।
- खेत के चारों ओर कुकुरबिट्स न उठाएं।

3. लीफ कर्ल - पपीता पत्ती कर्ल वायरस



लक्षण

- पत्तियों की कर्लिंग, क्रिकलिंग और विरूपण, पत्ती लैमिना की कमी, पत्तियों के किनारों को अंदर और नीचे की ओर लुढ़कना, नसों का मोटा होना।
- पौधे अवरुद्ध हो गए। प्रभावित पौधे फूल और फल पैदा नहीं करते हैं।

मैनेजमेंट

- प्रभावित पौधों को उखाड़ फेंकें। पपीते के पास टमाटर, तंबाकू उगाने से बचें।
- वेक्टर को नियंत्रित करने के लिए प्रणालीगत कीटनाशकों के साथ छिड़काव।

4. एंथ्रेक्नोज़ - कोलेटोट्रिचम ग्लोओस्पोरियोइड्स



लक्षण

- यदि कामुक धब्बों पर पत्ती और स्टेम को प्रभावित करते हैं तो उत्पादित किए जाते हैं। फल पर शुरू में त्वचा की भूरे रंग की सतही मलिनकिरण विकसित होती है जो परिपत्र और थोड़ा धंसा हुआ होता है।
- आर्द्र स्थिति के तहत सामन गुलाबी बीजाणु जारी किए जाते हैं। फल ममी और विकृत।

मैनेजमेंट

- कार्बेन्डैजीम 0.1% के साथ स्प्रे करें (या) क्लोरोथालोनिल 0.2% या Mancozeb 0.2%।

LEARNIZY