

1과목 : 해양학개론

1. 중위도 해역의 해양에서 음속의 연직분포 중 최소의 음속을 보이는 곳은?

- ① 수심 20m 이전의 표층
- ② 수심 20 ~ 200m 의 계절약층
- ③ 수심 1000m 이상의 심해 등온층
- ④ 수심 1000 m 부근의 소파층(Sofar layer)

2. 해빈 퇴적물의 입자크기와 해빈의 평균 경사도의 관계로 가장 적합한 것은?

- ① 입자크기가 클수록 경사각이 작다.
- ② 입자크기가 클수록 경사각이 크다.
- ③ 입자크기와 경사각에는 비례 관계가 없다.
- ④ 입자크기와 경사각은 입자의 크기에 따라서 불규칙하다.

3. 퇴적물의 평균입도가 동일할 경우, 퇴적물의 분급과 공극률의 관계 중 맞는 것은?

- ① 분급이 좋을수록 공극률이 작다.
- ② 분급이 좋을수록 공극률이 크다.
- ③ 분급과 공극률 간에는 관계가 없다.
- ④ 평균입도는 분급 및 공극률에 영향을 미치지 않는다.

4. 해수중 침강입자를 모으는 기구로서 가장 적합한 것은?

- ① Sediment trap
- ② Millipore filter
- ③ 무오염 채수기
- ④ Van Dorn 채수기

5. 다음 장소 중 조력발전소 건설에 따라 최대전력의 생산이 가능한 장소는?

- ① 광양만
- ② 마산만
- ③ 영일만
- ④ 가로림만

6. 해저의 지반암에서 채취할 수 있는 에너지 자원으로 가장 가능성이 높은 것은?

- ① 석유
- ② 암염
- ③ 석회암
- ④ 망간단괴

7. Kelvin파에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 진행속도는 수심에 관계된다.
- ② 조석파가 전파될 때 나타난다.
- ③ 지구자전의 영향으로 나타난다.
- ④ 북반구에서 해면변화는 파의 진행방향에서 왼쪽이 제일 크다.

8. 하천수에 많은 양의 용존 유기물과 Fe가 존재할 경우, 이 하천수가 하구를 지나면서 나타나는 용존 유기물과 Fe의 변화는?

- ① 용존 유기물질의 감소 및 Fe의 감소
- ② 용존 유기물질의 감소 및 Fe의 증가
- ③ 용존 유기물질의 증가 및 Fe의 증가
- ④ 용존 유기물질의 불변 및 Fe의 감소

9. 해수의 염분 증가에 가장 큰 영향을 미치는 과정은?

- ① 강우
- ② 증발
- ③ 해수의 결빙
- ④ 해빙의 융해

10. 해양에서 탄산염 퇴적물이 가장 많이 퇴적되어 있는 곳은?

- ① 해구
- ② 대양저 산맥
- ③ 후열도 분지
- ④ 북태평양 수렴대

11. 용승(Upwelling) 해역에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 저층의 물이 표층으로 올라온다.
- ② 주변해역보다 표면 수온이 낮다.
- ③ 영양염이 풍부하여 생물활동이 왕성하다.
- ④ 해안선이 남북방향으로 놓인 곳에서는 용승이 있으나 동서방향으로 놓인 곳에서는 없다.

12. 계절풍에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 계절에 따라 바람의 방향이 바뀐다.
- ② 위도에 따른 태양복사 에너지의 차이 때문에 생긴다.
- ③ 아시아 대륙의 남쪽 및 남동 해상에서 현저하게 나타난다.
- ④ 지구표면상의 대륙과 해양의 분포와 밀접하게 관련되어 있다.

13. 해양에 존재하는 영양염류의 농도분포에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 영양염류 농도는 유광층에서 가장 낮다.
- ② 영양염류 농도는 표층에 비해 수심이 깊은 곳에서 낮다.
- ③ 영양염류의 극대층은 수온약층 바로 아래수층에서 나타난다.
- ④ 용승류가 발생하는 곳은 표층수의 영양염 농도가 주변해역보다 높다.

14. 역학적 해류계산(dynamic current computation)에서 얻어지는 해류는?

- ① 조류
- ② 관성류
- ③ 지형류
- ④ 취송류

15. 북위 45°N 부근 중위도에서 100 km 떨어진 두 지점 A와 B에 수직인 방향으로 1m/s 유속의 지형류(geostrophic current)가 흐를 때 A점과 B점의 해면의 높이 차는? (단, Coriolis Parameter(f)는 $f=10^{-4}s^{-1}$, 중력가속도는 $10m/s^2$ 이다.)

- ① 0.5m
- ② 1m
- ③ 1.5m
- ④ 2m

16. 판구조론에서 말하는 판(plate)의 평균두께로 가장 적합한 것은?

- ① 10 ~ 50 km
- ② 100 ~ 150 km
- ③ 400 ~ 500 km
- ④ 800 ~ 1000 km

17. 내부파에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진폭이 표면파보다 작다.
- ② 해표면에는 slick을 자주 형성시킨다.
- ③ 주기는 수분에서 수시간의 것까지 있다.
- ④ 밀도가 불연속적인 경계면에서 나타난다.

18. 대양저산맥(mid-oceanic ridge)은 어원 그대로 대양의 중심부에 위치한다. 다음 중 중심부에 대양저산맥이 위치하지 않는 바다는?

- ① 대서양
- ② 인도양

- ③ 태평양 ④ 모두 중심부에 위치하지 않음

19. 대기에서 해양으로 이동하는 기체의 확산계수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분자확산계수는 온도에 비례한다.
 ② 분자확산계수는 기체 분자량과 비례한다.
 ③ 와동확산계수가 분자확산계수보다 크다.
 ④ 기체의 교환속도는 확산계수에 비례한다.

20. 해양에서 대기로 발산되는 열 중 가장 큰 것은?

- ① 반사열 ② 복사열
 ③ 전도열 ④ 증발잠열

2과목 : 해양생태학

21. 심해생물의 직접적인 먹이가 되지 못하는 것은?

- ① 박테리아 ② 회유성 어족
 ③ 저층에 침전된 유기물 ④ 살아있는 식물 플랑크톤

22. 향온동물인 것은?

- ① 연체류 ② 돌고래류
 ③ 열대어류 ④ 바다거북류

23. 식물플랑크톤의 생물량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심층부보다 상층부에 많다.
 ② 외양보다 연안 수역에 많다.
 ③ 한류수역보다 난류수역에 많다.
 ④ 저위도보다 고위도 해역에 많다.

24. 소하성 회유어종이 아닌 것은?

- ① 연어 ② 은어
 ③ 뱀장어 ④ 철갑상어

25. 플랑크톤과 유기쇄설물 등 미세한 먹이를 주로 먹는 어류는 새파가 길고 백택하게 나는데, 다음 어류 중 이러한 특징을 갖는 것은?

- ① 갈치 ② 감성돔
 ③ 실고기 ④ 정어리

26. 산호초에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산호초가 형성되는 곳은 수온이 높고 수심이 얕아야 한다.
 ② 서식환경은 물이 깨끗하고 염분이 높아야 한다.
 ③ 산호초가 형성되기 위해서는 담수의 유입이 많아야 한다.
 ④ 산호는 해파리와 같은 자포동물에 속하며 식물성 플랑크톤의 조류와 공생한다.

27. 일반적으로 강의 하구역에서 우점하는 해조류는?

- ① 갈조류 ② 녹조류
 ③ 홍조류 ④ 황색편모류

28. 해양의 1차 생산력을 지배하는 생물은?

- ① 어류 플랑크톤 ② 저서생물
 ③ 동물 ④ 식물 플랑크톤

29. 해양생물의 독성실험에 사용되는 용어의 뜻으로 옳은 것은?

- ① 48hEC₅₀은 48시간 노출 시 실험생물의 50%가 사망하는 중간치사시간이다.
 ② 48hLD₅₀은 48시간 노출 시 실험생물의 50%가 사망하는데 필요한 유효시간이다.
 ③ 96hLC₅₀은 96시간 노출 시 실험생물의 50%가 사망하는 독성물질 농도이다.
 ④ 96hLT₅₀은 96시간 노출 시 실험생물의 50%가 사망하는 중간유효농도이다.

30. 조간대 생물분포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조간대 생물분포는 해저 환경에 관계없이 고루 분포한다.
 ② 평균 저조면 부근과 평균 고조면 부근의 저서생물 분포가 다르다.
 ③ 조간대의 지반이 암석인 경우와 흙인 경우의 저서생물 분포가 다르다.
 ④ 흙으로 된 조간대 중 모래인 경우와 빨린 경우의 저서생물의 '분포가 다르다.

31. 해양 저서동물과 그 분류로 옳지 않은 것은?

- ① 성게 극피동물 ② 따개비 연체동물
 ③ 갯지렁이 다모류 ④ 바다가재 절지동물

32. 갯벌 조간대에 서식하는 저서생물들의 환경에 대한 적응으로 옳지 않은 것은?

- ① 부유하는 다량의 실트 성분은 현탁물 식자의 섭식율을 증가시킨다.
 ② 퇴적물 식자는 유기물 함량이 높은 이질 퇴적물에서 최대를 나타낸다.
 ③ 간석지 이매패류는 패각 내에 고염분수를 가두어 둠으로써 단기적 저염분에 견딘다.
 ④ 잠입성 이매패류는 퇴적물 속 깊은 장소에 서식하므로 대기 온도의 직접 영향을 피한다.

33. 갯벌생태계의 먹이연쇄에서 높은 영양단계에 속하는 포식자가 아닌 것은?

- ① 서해비단고등, 민칭이 등
 ② 가자미나 납치 등의 저어류
 ③ 도요새와 물떼새들로 구성되는 철새들
 ④ 꽃게나 민꽃게 및 그 밖의 대형 새우류

34. 기초생산력을 직접적으로 좌우하는 요인이 아닌 것은?

- ① 광선 ② 산소
 ③ 온도 ④ 영양염류

35. 열수공 지역의 특징이 아닌 것은?

- ① 수온이 높다.
 ② 공생박테리아가 많다.
 ③ 먹이연쇄가 발달되어 있다.
 ④ 생물들이 대형화되어 있다.

36. 분류학적으로 다른 규조류는?

- ① 나비쿨라(Navicula)
 ② 니치치아(Nitzschia)

- ③ 리조솔레니아(*Rhizosolenia*)
 ❶ 코시노디스커스(*Coscinodiscus*)

37. 다음 중 해양생태에서 높은 탁도의 가장 중요한 의미는?

- ① 여과식자에게 매우 좋다.
 ② 동물들의 숨을 막히게 한다.
 ❸ 태양광선의 투과를 감소시킨다.
 ④ 포식자로부터 저서동물을 보호하기가 쉽다.

38. 플랑크톤 생활을 거치는 다음 생물 중 생활사가 다른 것은?

- ❶ 피낭류(*Tunicata*) ② 요각류(*Copepoda*)
 ③ 익족류(*Pteropoda*) ④ 화살발레류(*Chaetognatha*)

39. 우리나라 남해안 굴 양식장에 밀식과 연작으로 인해 나타나는 노화현상이 아닌 것은?

- ① 저층 빈산소 상태 유발
 ② 영양염이 유리되어 적조 발생
 ③ 유화수소의 발생으로 생산력 저하
 ❶ 유기물 공급으로 저서동물의 생산량 증가

40. 간극동물의 일반적인 적응 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 몸의 크기가 작다.
 ❷ 주로 암반에 부착해 살아간다.
 ③ 부착기와 평형기가 발달되어 있다.
 ④ 몸이 길쭉하게 연장되면서 굴뚝꾸불해진다.

3과목 : 해양계측학

41. 취송류이론에 의한 상부마찰심도에서의 유속은 표면유속의 몇 분의 1인가?

- ① 약 1/7 ② 약 1/15
 ❸ 약 1/23 ④ 약 1/57

42. 해수 내 부유물질의 측정방법이 아닌 것은?

- ① 여과법 ❷ 회석법
 ③ 광산란법 ④ 원심분리법


43. 어느 선박에서 음향 측심기로 음파를 발신하여 수신할 때까지의 시간이 10초일 때 수심은? (단, 해수 중의 음파속도는 약 1500 m/sec이며, 수면에서 송수파기까지의 길이는 3m 임)

- ① 7497 m ❷ 7503 m
 ③ 14997 m ④ 15003 m

44. 시추한 해저 퇴적물의 구조 관찰에 가장 적합한 기기는?

- ① 편광 현미경 ❷ soft X-ray 장치
 ③ 감마선 감쇄장치 ④ 주자 전자현미경

45. ADCP는 그림과 같이 음향판에 수직한 방향의 속도성분(u_r)을 측정하여 수평유속(u_H)으로 환산한다. 이를 위해서 필요한 식은?



- ① $u_H = u_r \cos \alpha$ ② $u_H = u_r \sin \alpha$
 ❸ $u_H = u_r \sec \alpha$ ④ $u_H = u_r \csc \alpha$

46. 조석자료의 분석에서 비조석성분이 특별히 큰 peak 값을 보이는 경우에 그 원인은?

- ① 단주기 성분의 중첩이 있다.
 ② peak 부근에 주기성이 있다.
 ❸ 잘못된 자료일 가능성이 크다.
 ④ 조석 주기 이상의 장주기 성분에 의한 영향이다.

47. 대조(spring tide)와 다음 대조와의 시간간격은?

- ① 약 1/2일 ② 약 1일
 ③ 약 7일 ❶ 약 15일

48. 염분계(salinometer)는 해수의 어떤 특성을 사용하여 염분을 측정하는가?

- ❶ 전기전도도 ② 빛의 투과도
 ③ 음파의 속도 ④ 해수의 색깔

49. 연안용승을 관측하기 위한 시·공간 해상도로 가장 알맞은 것은?

- ① 10km, 30일 ② 100 km, 30 ~ 60일
 ③ 10 ~ 100 km, 100일 ❶ 10 ~ 100 km, 1일 ~ 1주

50. 조석 관측 시 필요한 TBM(Tidal Bench Mark)이란?

- ❶ 육상의 고정점 표식 ② 평균해면의 표식
 ③ 표척의 0점 ④ 조위계의 0점 표식

51. 퇴적물 분석 중 Pipette 이나 Sedigraph 는 어디에 사용되는 것인가?

- ① 조립질 시료의 입도분석 ❷ 세립질 시료의 입도분석
 ③ 조립질 시료의 중량 측정 ④ 세립질 시료의 중량 측정

52. 해저지층탐사 자료 해석 시 주의해야 할 것으로 해저면의 반복되는 현상은?

- ❶ 다중반사 ② 불연속면
 ③ 수중반사 ④ 수중잔향

53. 한국과 일본 사이의 동해상에서 발생할 수 있는 지진해일(tsunami)에 대비하기 위해 지진해일 감시용 압력계가 부착된 해양부이를 설치하려고 한다. 대피시간 확보와 해양부이 관리를 위한 접근 용이성 등을 고려하여 지진해일이 동해 연안에 도착하기 5분 전에 지진해일을 감지 할 수 있도록 해양부이 위치를 결정한다면 동해 연안에서 해양부이까지의

최단 거리는? (단, 동해의 수심은 전 해역에서 2000m이며, 해양부이를 통과한 지진해일은 연안에 수직방향으로 진행한다고 가정하며 마찰력의 효과는 무시한다.)

- ① 약 28 km ② 약 42 km
③ 약 56 km ④ 약 70 km

54. 변환기(transducer)를 사용하여 연안지역의 고해상도 퇴적층 단면도 자료를 획득하는 지층탐사 장비는?

- ① Air Gun
② Side scan sonar
③ Multi beam echo sounder
④ 3.5kHz subbottom profiler

55. GOCI-1 위성에 해당되는 사항이 아닌 것은?

- ① GOCI 위성은 한반도를 중심으로 관측한다.
② GOCI 위성은 1시간 간격으로 하루 8번 관측한다.
③ GOCI 위성은 야간의 어선들 불빛을 관측하여 어업활동을 알 수 있게 한다.
④ GOCI 위성은 *Cochlodinium polykrikoides* 적조를 관측하는 알고리즘을 운용한다.

56. 아래 그림과 같은 관측 결과를 우리나라의 황해에서 얻었다. 이러한 결과를 얻을 수 있는 계절은? (단, D는 수심이고, T는 수온이며, 특별한 경우는 제외한다.)

- ① 봄 ② 여름
③ 가을 ④ 겨울

57. 수심 H에서 온도 T, 압력 P, 염분도 S인 상태의 해수밀도를 수압이 0인 해수면 상태로 환원시켜 표시한 밀도는?

- ① 단열밀도 ② 현장밀도
③ 포텐셜밀도 ④ 시그마-티(σ_t)

58. 자유낙하 시추기(free fall corer)가 아닌 것은?

- ① Box Corer ② Gravity Corer
③ Boomerang Corer ④ Hydraulic Piston Corer

59. 해류측정에서 역학적 계산방법을 쓸 때 유의사항은?

- ① 평형상태면 된다.
② 지구의 중력만 고려한다.
③ 비가속적이고 마찰이 없다.
④ 코리올리효과는 무시하나 바람의 영향은 고려한다.

60. CTD 관측 방법에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 장비 설명서에서 제시한 최적 하강속도를 준수한다.
② 장비를 해수면으로 투하한 후 바로 내리기 시작한다.
③ 세밀한 연직구조를 관측하기 위해서 하강속도를 감소시킬 수 있다.
④ 큰 파도에 선박의 운동이 심할 때에는 하강속도를 증가하는 것이 좋다.

4과목 : 해수의 수질분석

61. 해양환경공정시험기준상 해양퇴적물의 강열감량(ignition loss)분석에 사용되는 기기가 아닌 것은?

- ① 전기로 ② 전자저울
③ 동결건조기 ④ 분광광도계

62. 해양환경공정시험기준상 분석 자료의 통계처리와 표현방법에 대한 일반적인 내용으로 틀린 것은?

- ① 일조분율을 표시할 때는 $\mu\text{g/L}$, $\mu\text{g/kg}$ 또는 ppb의 기호를 쓴다.
② 백만분율을 표시할 때는 mg/L, mg/kg, mL/kL 및 ppm의 기호를 쓴다.
③ 표준편차는 복수시료 측정 시 평균값을 중심으로 한 분산정도를 나타낸다.
④ 유효숫자는 불확실할 수도 있는 마지막 자릿수의 숫자와 확실한 그 이상 자릿수의 숫자를 포함한다.


63. 해양환경공정시험기준상 해수중의 무기수은농도를 측정하는 방법의 설명으로 틀린 것은?

- ① 수은의 흡수파장은 253.7 nm 이다.
② 해수중의 수은은 냉증기-원자흡광광도계로 측정한다.
③ 수은을 원자상태의 증기로 환원하는 데에는 히드록실아민(hydroxylamine)을 사용한다.
④ 해수중의 수은농도는 매우 미량이기 때문에 HEPA 여과시설 및 수평기류가 가능한 청정시설 환경에서 실험해야 한다.

64. 해양환경공정시험기준에서 상온은 몇 $^{\circ}\text{C}$ 를 말하는가?

- ① 0°C ② $0 \sim 15^{\circ}\text{C}$
③ $1 \sim 35^{\circ}\text{C}$ ④ $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$

65. 해양환경공정시험기준상 황화수소가 산성용액에서 염산디메틸페닐렌디아민과 촉매로 쓰이는 염화제이철의 혼합용액과 반응한 후 생성되는 반응물의 흡광도를 분광광도계로 측정하고자 할 때 파장은?



- ① 370 nm ② 470 nm
③ 570 nm ④ 670 nm

66. 해수시료의 pH 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적조가 발생하면 pH가 감소한다.
② pH는 해수중의 수소이온 농도 변화에 따라 달라진다.
③ 해수의 총용존무기탄소 농도는 pH에 크게 영향을 준다.
④ pH는 해수의 온도와 압력의 변화에 따라 측정값이 달라진다.

67. 해양환경공정시험기준상 해수 시료중의 규산염은 일차적으로 몰리브덴산과 반응하여 몰리브덴산 착화합물을 형성시켜 측정하는데, 이 때 시료 중에 포함되어 있는 몰리브덴산과 반응하여 몰리브덴산 착화합물을 만드는 다른 성분은?

- ① 바륨 ② 인산염

- ① 책임협약 ② 국제기금협약
 ㉓ 추가기금협약 ④ 선박연료유협약

84. MARPOL 73/78(선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약) 상 기름(oil)의 정의로 가장 알맞은 것은? (단, 부속서 II의 규정에 따른 석유화학물질은 제외한다.)

- ① 원유만을 의미한다.
 ② 원유와 슬러지만을 의미한다.
 ③ 선박 연료유와 윤활유만을 의미한다.
 ㉓ 원유, 연료유, 슬러지, 폐유 및 정제유를 포함한 모든 형태의 석유를 의미한다.

85. MARPOL 73/78(선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약) 상 선박 항행 중의 폐기물 처분에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 특별해역 외의 지역에서 유리는 육지로부터 12해리 이상 떨어져 처분한다.
 ② 특별해역 외의 지역에서 음식찌꺼기는 육지로부터 12해리 이상 떨어져 처분한다.
 ㉓ 특별해역 외의 지역에서 합성로우프는 육지로부터 25해리 이상 떨어져 처분한다.
 ④ 특별해역 외의 지역에서 부유성 던니지(dunnage)는 육지로부터 25해리 이상 떨어져 처분한다.

86. 해양환경관리법상 선박에너지효율설계지수에 관한 설명이다. 다음 ()안에 알맞은 내용은?

국제항해에 사용되는 총톤수 () 이상의 선박 중 해양수산부령으로 정하는 선박을 건조하거나 개조를 하려는 경우에는 그 선박의 소유자는 해양수산부장관이 정하며 고시하는 최소 출력 이상의 추진기관을 설치하고 선박에너지효율설계지수를 계산하여야 한다.

- ㉓ 400톤 ② 500톤
 ③ 700톤 ④ 1000톤

87. MARPOL 73/78(선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약) 상 해양학·생태학·해상교통의 특수성 등의 이유로 폐기물에 의한 해양오염 방지를 위하여 특별한 강제조치의 채택이 요구되는 특별해역에 포함되지 않는 곳은?

- ① 북해 ② 발틱해
 ㉓ 베링해 ④ 카리브해

88. 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법상 해양생물의 보호에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시·도지사는 해양동물의 구조·치료를 위하여 관련기관을 해양동물 전문구조·치료기관으로 지정할 수 있다.
 ㉓ 어떠한 경우에도 해양보호생물의 멸종 또는 감소를 촉진하거나 학대를 유발할 수 있는 광고를 하여서는 아니 된다.
 ③ 국가 또는 지방자치단체는 회유성해양동물 및 해양포유동물의 보전·관리를 위하여 전시관 및 교육·홍보관을 설치할 수 있다.
 ④ 해양수산부장관은 유해해양생물로 인한 수산업 등의 피해상황, 유해해양생물의 종류 및 개체 수 등을 종합적으로 고려하여 유해해양생물을 관리하되, 해양생태계의 교란이 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

89. 유류오염손해배상보장법상 연간 몇 톤을 초과하는 분당유를 수령할 경우에 해양수산부장관에게 보고하여야 하는가?

- ① 5만톤 ② 10만톤
 ㉓ 15만톤 ④ 20만톤

90. 해양환경관리법의 적용 대상이 아닌 배출물질은?

- ① 선저폐수 ㉓ 방사성물질
 ③ 유해액체물질 ④ 포장유해물질

91. 해양환경관리법상 배출기준을 초과하는 오염물질이 배출된 경우 신고의무자가 아닌 자는?

- ㉓ 기름이 배출된 선박의 선주
 ② 기름이 배출된 해양시설의 관리자
 ③ 기름이 해면에 퍼져있는 것을 발견한 자
 ④ 선박종사자가 아닌 자로 원인행위를 한 자

92. 해양환경관리법상 선박에 설치되는 해양오염방지설비에 대하여 수검하는 검사의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 정기검사 ② 중간검사
 ㉓ 제조검사 ④ 임시검사

93. 1990년유류오염대비·대응및협력에관한국제 협약(ORPC)에서 요구하고 있는 오염사고 대응을 위한 국가방제체제에 포함된 요건이 아닌 것은?

- ① 유류오염 대응에 관한 책임당국 지정
 ㉓ 일정규모 이상의 국가방제능력 확보 의무
 ③ 유류오염 대비·대응을 위한 국가긴급계획 수립
 ④ 방제조치 원조제공을 결정하는 자국 대표권한을 갖는 당국지정

94. 해양환경관리법상 선수 탱크와 충돌 격벽보다 앞쪽 탱크에 기름을 적재하는 것이 금지된 선박의 톤수 기준은?

- ① 총톤수 200톤 이상의 선박
 ② 총톤수 300톤 이상의 선박
 ㉓ 총톤수 400톤 이상의 선박
 ④ 총톤수 500톤 이상의 선박

95. 유류오염손해배상보장법상 보장계약을 체결하여야 할 선박은 몇 톤 이상의 산적 유류를 화물로 운송하는 선박인가?

- ① 100톤 ㉓ 200톤
 ③ 500톤 ④ 1000톤

96. 해양환경관리법상 환경보전해역에 대한 사항이 아닌 것은?

- ㉓ 오염물질의 총량규제를 할 수 있다.
 ② 대통령령이 정하는 시설의 설치를 제한할 수 있다.
 ③ 해양오염에 직접 영향을 미치는 경우 육지를 포함한다.
 ④ 생태계의 보전이 양호한 곳으로서 지속적인 보전이 필요한 해역이다.

97. 해양환경관리법상 해양시설의 소유자가 해양시설을 최초로 신고할 경우 첨부해야 할 서류에 해당하지 않는 것은?

- ㉓ 해양시설 신고 증명서
 ② 해양시설오염비상계획서
 ③ 해양시설해양오염방지관리인의 임명확인서
 ④ 해양시설의 설치명세서와 그 도면 및 위치도

98. 해양환경관리법령상 해양시설에서 발생하는 오염물질로서 수거·처리하여야 하는 물질 중 기름의 유분 성분 기준은?

- ① 10만분의 5 초과 ② 10만분의 15 초과
③ 100만분의 5 초과 ④ 100만분의 15 초과

99. 유류오염손해배상보장법의 제정 목적으로 틀린 것은?

- ① 유류오염사고로 인한 피해자를 보호하기 위함이다.
② 유류오염사고로 인한 손해배상을 보장하는 제도를 확립하기 위함이다.
③ 유류오염사고의 발생 시 선박소유자의 책임을 명확하게 하기 위함이다.
④ 유류오염사고로 인한 국가 및 화주의 손해배상책임을 명확하게 하기 위함이다.

100. 유류오염손해배상보장법상 유조선에 의한 유류오염피해자가 유조선의 선박소유자 또는 보험자 등으로부터 배상을 받지 못한 유류오염손해 금액에 관하여 보상을 청구할 수 있는 대상은?

- ① 국제기금 ② 피해자 소속국
③ 선박소유자 소속국 ④ 가해선 선장 소속국

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	①	④	①	④	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	③	②	②	①	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	④	③	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	②	③	④	③	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	②	③	③	④	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	④	③	④	④	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	④	④	①	②	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	③	④	④	②	①	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	③	④	③	①	③	②	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	③	②	①	①	④	④	①