

1과목 : 식물병리학

1. 사과나무 화상병의 전파는 주로 어떤 방법으로 이루어지는가?

- ① 농기구 ② 흙 및 관개수
③ 종자 ④ 곤충

2. 바이러스의 혈청학적 진단법과 거리가 먼 것은?

- ① 슬라이드법(Slide Method)
② 한천젤확산법(Agar Gel Diffusion Test)
③ PCR(Polymerase Chain Reaction)
④ 효소결합항체법(ELISA)

3. 감수체(Suscept)란 어떤 뜻인가?

- ① 병든 식물 ② 병들기 쉬운 상태의 식물
③ 기주식물 ④ 저항성 식물

4. 토마토 시들음병의 발생을 증가시키는데 상호작용하는 병원균과 선충으로 옳은 것은?

- ① *Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici* - *Meloidogyne sp.*
② *Verticillium albo-atrum* - *Pratylenchus sp.*
③ *Pythium debaryanum* - *Pratylenchus sp.*
④ *Rhizoctonia solani* - *Pratylenchus sp.*

5. 다음 병원균 중 알칼리 토양에서 잘 번식하는 것은?

- ① 배추 무사마귀병원 ② 감자 더듬이병원
③ 귀리 깜부기병원 ④ 벼 도열병원

6. 봉소의 결핍에 기인하여 발생하는 사과병은?

- ① 부란병 ② 점무늬낙엽병
③ 축과병 ④ 탄저병

7. 태풍과 침수가 일어날 때 많이 발생하는 병은?

- ① 벼 오갈병 ② 벼 흰잎마름병
③ 벼 줄무늬잎마름병 ④ 벼 잎집무늬마름병

8. 뿌리혹병(근두암종병)을 일으키는 병원균은?

- ① 세균 ② 진균
③ 바이러스 ④ 파이토플라스마

9. 다음은 어느 병의 방제법인가?

- 종자소독을 철저히 한다.
- 질소비료의 과용을 피한다.
- 찬 물을 직접 논에 넣지 않는다.
- Edifenphos, Probenazole 등으로 방제한다.

- ① 벼 흰잎마름병 ② 벼 도열병
③ 벼 오갈병 ④ 벼 키다리병

10. 큐어링에 의한 작물의 저장은 어느 병원균의 발생을 억제하기 위한 것인가?

- ① 고구마 위축병 ② 고구마 무름병
③ 고구마 더듬이병 ④ 고구마 흰빛썩음병

11. 식물병원균이 이종기생을 하는 경우 생활환(Life Cycle)을 완성하기 위하여 기주식물을 바꾸어 생활하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 기주교대 ② 기생
③ 감염 ④ 발병

12. 고추에 발생하는 병으로 장마철이나 집중호우시 재배포장의 물빠짐이 불량한 경우 큰 피해를 초래하는 병은?

- ① 고추 역병 ② 고추 흰가루병
③ 고추 잘록병 ④ 고추 검은무늬병

13. 균류의 유성포자는 성질이 다른 2개의 핵의 융합과 분열에 의하여 만들어지며 유전적 변이의 원인이 되는데, 다음 중 유성포자에 속하지 않는 것은?

- ① 난포자 ② 유주자
③ 접합포자 ④ 자낭포자

14. 잣나무에 발생하는 병으로 병든 가지 또는 줄기의 수피는 노란색 내지 갈색으로 변하며 거칠어지고 수지(Resin)가 흐르며, 송이풀류와 까치밥나무를 중간기주로 갖는 병은?

- ① 잣나무 털녹병 ② 잣나무 잎떨림병
③ 잣나무 수지동고병 ④ 잣나무 흑병

15. 균핵(菌核)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세균이 주로 형성한다.
② 부적당한 환경하에서 쉽게 죽는다.
③ 군사조직으로 이루어져 있다.
④ 기주로부터 쉽게 분리되지 않는다.

16. 수목병의 원인을 생물적·비생물적을 구분할 때 생물적 원인에 의한 병원이 아닌 것은?

- ① 흰가루병 ② 불마름병
③ 양분의 불균형 ④ 겨우살이

17. 소나무 흑병의 하포자와 동포자는 어디서 월동하는가?

- ① 줄참나무 ② 향나무
③ 참취 ④ 야생까치밥나무

18. 다음 중 스파이로플라스마에 대한 특징으로 틀린 것은?

- ① 단위막으로 둘러싸여 있다.
② 진정한 세포벽을 가지고 있지 않다.
③ 아직까지 인공배지에서 배양이 불가능하다.
④ 식물 꽃이나 식물표면 등에 착생하거나 내부에 부생하여 생활한다.

19. 곰팡이의 기관을 영양체와 번식체로 구분할 때 영양체가 아닌 것은?

- ① 군사 ② 균핵
③ 자좌 ④ 자낭포자

20. 다음 식물병원균 중 순환물기생하는 균은?

- ① 벼 도열병원 ② 벼 키다리병원
③ 밀 흰가루병원 ④ 벼 깨씨무늬병원

2과목 : 농림해충학

21. 건축물의 목재(예:기둥, 문틀 등), 목가공품의 표면만 남기고 내부를 불규칙하게 식해한 후 표면에 구멍을 뚫고 성충이 고운 가루를 배출하며 탈출하는 해충이 있다. 다음 중 어떤 해충인가?

- ① 흰점박이바구미 ② 가루나무좀
③ 노랑무늬솔바구미 ④ 노랑애나무좀

22. 외국에서 새로운 해충이 우리나라에 침입해서 문제가 된 경우가 많다. 다음 중 침입해충으로만 구성된 것은?

- ① 버물바구미, 소나무재선충, 밤나무혹벌, 미국흰불나방
② 미국흰불나방, 버즘나무방패벌레, 독나방, 밤나무혹벌
③ 밤나무혹벌, 소나무좀, 미국흰불나방, 버물바구미
④ 버물바구미, 밤나무혹벌, 버즘나무방패벌레, 독나방

23. 솔잎혹파리를 비롯한 흑파리과(科) 곤충의 형태적 특징으로 맞는 것은?

- ① 정상적인 날개가 2쌍이다.
② 앞날개만 있고 뒷날개는 퇴화되었다.
③ 앞날개가 뒷날개보다 크며 가는 털로 덮여 있다.
④ 앞날개는 각질화되어 있으며 날개맥이 없다.

24. 곤충목의 분류에서 개미가 속하는 목(目)은?

- ① 벌목 ② 노린재목
③ 흰개미목 ④ 흰개미붙이목

25. 벼를 가해하는 해충 중 집중분포성이 가장 큰 것은?

- ① 벼멸구 ② 흰등멸구
③ 애멸구 ④ 끝동매미충

26. 수정된 알세포에서 부화하기까지 발육을 무엇이라고 하는가?

- ① 배자발생 ② 후배자발육
③ 유충생장 ④ 성충우화

27. 곤충이 생존하기 불리한 환경이 되면 대사와 발육이 느리게 진행되고 환경이 좋아지면 즉각 정상상태를 회복하는 현상은?

- ① 분산 ② 휴지
③ 휴면 ④ 일장

28. 소나무류에 피해를 주는 솔잎혹파리의 천적이 아닌 것은?

- ① 솔잎혹파리먹좀벌 ② 검정무늬납작매시벌
③ 흑파리반뿔먹좀벌 ④ 흑파리살이먹좀벌

29. 날개가 있는 것은 날개맥이 없는 가늘고 긴 날개를 가지고 있으며 그 가장자리에 긴 털이 규칙적으로 나 있으며, 좌우 대칭이 아닌 입틀을 가지고 있는 곤충군은?

- ① 총채벌레목 ② 나비목
③ 노린재목 ④ 매미목

30. 다음 중 알라타체에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 곤충의 소화기관으로 배설작용에 관여한다.
② 변태조절 호르몬을 분비한다.
③ 뒷가슴에 있는 내분비샘이다.
④ 작용은 명백하지 않다.

31. 사과응애에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 성충으로 나무껍질 밑에서 월동한다.
② 부화 직후의 유충은 다리가 3쌍이다.
③ 대발생했을 때에는 실을 토하며 바람에 날려 이동하는 것을 볼 수 있다.
④ 가해를 받으면 사과 잎에 백색 점이 생기며, 심하면 변색되고 말라 죽는다.

32. 다음 해충의 방제수단으로 이용되는 내충성품종에 대해 고려해야 할 조건들 중 부적당한 것은?

- ① 해충의 생활에 유해할 것
② 해충의 산란 및 먹이로서 적당하지 않을 것
③ 해충이 가해할 때 견디어 내는 능력이 클 것
④ 작물의 성숙기와 해충의 발생시기가 일치할 것

33. 다음 곤충 개체 간의 통신수단에 사용되는 물질들 중 관계가 없는 것은?

- ① Pheromone ② Allomone
③ Hormone ④ Kairromone

34. 애벌레가 3회 탈피한 후 4회 탈피 전까지를 몇령충이라고 하는가?

- ① 1령충 ② 2령충
③ 3령충 ④ 4령충

35. 내충성이 강한 품종을 선택하는 것은 다음 중 어느 방제법에 속하는가?

- ① 물리적 방제법 ② 화학적 방제법
③ 생물적 방제법 ④ 재배학적 방제법

36. 국내에서는 1988년에 처음 발견된 외래 해충으로 벼 재배시 성충은 벼잎을 유충은 벼뿌리를 가해하여 피해를 주는 해충은?

- ① 벼멸구 ② 애멸구
③ 끝동매미충 ④ 버물바구미

37. 다음 중 거세미나방의 월동 형태는?

- ① 알 ② 유충
③ 번데기 ④ 성충

38. 곤충의 호흡계와 소화계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 음식물이 주로 소화되는 곳은 중장이다
② 호흡계는 기문, 기관, 모세기관으로 구성된다.
③ 기관의 내부는 나선사로 되어 있어 찌그러짐을 방지한다.
④ 중장과 후장의 내벽은 표피로 덮여 있어서 탈피할 때마다 새로운 표피로 대체된다.

39. 탈피과정에서 다시 흡수되어 재활용되는 체벽의 부분은?

- ① 내원표피 ② 외원표피
③ 상표피 ④ 기저막

40. 다음 해충 중 성충의 피해가 문제되는 것은?

- ① 소나무좀 ② 뽕나무하늘소
③ 밤나무순혹벌 ④ 솔나방

3과목 : 농약학

41. 다음 중 유제의 성질이 아닌 것은?

- ① 농약 원제가 용제에 녹는다.
- ② 농약 원제가 물에 녹는다.
- ③ 농약 원제가 지용성이다.
- ④ 계면활성제가 첨가된다.

42. 다음 농약 중 합성피레스로이드계 살충제는?

- ① 아바멕틴 유제
- ② 벤셀탑 수화제
- ③ 카탐하이드로클로라이드 수용제
- ④ 델타메트린 유제

43. 가지과 작물(고추, 토마토)의 선택성 제초제는?

- ① 나프로파마이드 유제
- ② 시마진 수화제
- ③ 리뉴론 수화제
- ④ 메타벤즈티아주론 수화제

44. 다음 중 농약의 주성분에 의한 분류로 주로 제초제나 생장조절제로 이용되고 있는 농약은?

- ① 유기비소계
- ② 피레스로이드계
- ③ 유황계
- ④ 페녹시계


45. 유제용 기계유가 갖추어야 할 물리적인 성질은?

- ① 습윤성(濕潤性)
- ② 부착성(附着性)
- ③ 설폰가(Sulfon價)
- ④ O/W 형

46. 농약 보조제로 사용되는 계면활성제의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유화력(乳化力)이나 분산력(分散力)이 커야 한다.
- ② 농약의 주제를 변질시켜서는 안된다.
- ③ 연수(軟水)에만 쓰일수 있어야 한다.
- ④ 주제 및 기타 보조제와 친화성(親化性)을 지녀야 한다.

47. 다음 구조식을 가진 제초제는 어느 계에 속하는가?



- ① 페녹시초산계 제초제
- ② 카바메이트계 제초제
- ③ 요소계 제초제
- ④ 트리아진계 제초제

48. 농약의 제형에서 입제와 세립제의 가장 큰 차이점은?

- ① 유효성분
- ② 입자크기
- ③ 사용방법
- ④ 제조방법

49. Mancozeb에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유기유황계 살균제이다.
- ② 고독성 농약이다.
- ③ 알칼리 약제와 혼용이 가능하다.
- ④ 수도용 약제이다.

50. 살비제 농약의 구비조건으로 적당하지 않은 것은?

- ① 응애류는 발생기간이 짧으므로 잔효성이 짧을 것
- ② 응애류에 대한 적용범위가 넓을 것

- ③ 저항성 응애류에 대해서 효과가 좋을 것
- ④ 응애류에만 선택적 효과가 있을 것

51. 파라티온(Parathion)은 어느 효소 작용을 억제하는가?

- ① 아밀라아제
- ② 셀룰라아제
- ③ 콜린에스테라제
- ④ 모노아미노옥시다제

52. 곤충 생장조절제로 개발되었으며 소나무의 솔껍질깍지벌레의 방제에 효과적인 약제는?

- ① Buprofezin
- ② Pencycuron
- ③ Thiophanate-methyl
- ④ Cymoxanil

53. 다음 [보기]에서 설명하는 살균제는?

- 백색 바늘모양의 결정이다.
- 도열병 방제용으로 주로 사용된다.
- 단백질합성저해작용을 하는 약제이다.

- ① 가스가마이신(Kasugamycin)
- ② 메틸브로마이드(Methyl Bromide)
- ③ 티람(Thiram)
- ④ 클로로타로닐(Chlorothalonil)

54. DEP제(디프테릭스)가 분해하여 1차로 변하는 형태는?

- ① Parathion
- ② DDVP
- ③ Trithion
- ④ Dimethoate

55. 농약 혼용의 장점이 아닌 것은?

- ① 방제 비용이 절감된다.
- ② 서로 다른 병해충을 동시에 방제가 가능하다.
- ③ 혼용가능 농약은 혼합 후 바로 사용하지 않아도 좋다.
- ④ 같은 약제 연용에 의한 내성의 억제효과가 있다.

56. 다음 제초제 중 잡초와 작물 모두를 살멸시키는 비선택성 식물전멸약은?

- ① 디캄바(Dicamba)
- ② 프레티(Pretilachlor)
- ③ 근사미(Glyphosate)
- ④ 펜디(Pendimethalin)

57. 쥐가 먹었을 때 위산에 의하여 독극의 가스가 발생하여 살서력을 발휘하는 무기계통의 살서제는?

- ① 와르파린
- ② 무리탄
- ③ 인화아연
- ④ 토모린

58. 침투성 살균제의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 대개 직접살균제이다.
- ② 특정 병원균에 대해서 살균력이 높고 나타나는 특성을 나타낸다.
- ③ 발병 후 발생한 균사체에 대하여도 살균력을 나타낸다.
- ④ 계속적으로 사용하더라도 병원균에 의한 저항성 유발정도가 낮다.

59. 세빈 25% 유제(비중: 1.0) 100mL를 희석하여 0.05%의 살포액을 만들고자 한다. 이 때 소요되는 물의 양은 몇 L인가?

- ① 39.9
- ② 49.9
- ③ 59.9
- ④ 69.9

60. 다음 약제 중 응애의 알, 어린 벌레, 성충에 대해서 고루 살충효과가 큰 약제는?

- ① 디코폴(Dicofol) ② 이피엔(EPN)
③ 테라라디(Tedion) ④ 다이아지논(Diazinon)

4과목 : 잡초방제학

61. 다음 중 제초제 그라목손(파라코액제)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 토양에 떨어지면 곧바로 토양에 흡착되므로 살포 직후 작물을 파종할 수 있다.
② 식물의 광합성작용을 방해하여 잡초를 죽인다.
③ 잡초의 생육기에 처리하는 비선택성 제초제이다.
④ 앞에 살포하면 뿌리에 빨리 이행하므로 다년생 잡초의 방제에 효과가 높다.

62. 잡초 방제의 경제성 분석 중 다양한 잡초 발생밀도 하에서 농작물의 소득을 분석하는 방법은?

- ① 부분예산 분석법 ② 기계/동력예산 분석법
③ 한계점 분석법 ④ 보상력 분석법

63. King의 잡초발아 5단계설 중 다섯 번째 단계는?

- ① 이유기 ② 유아출현기
③ 세포분열 및 신장기 ④ 종근 및 유아신장기

64. 식물 간의 상호작용에는 여러 종류가 있다. 생리적으로 서로 공유하는 경우에는 기생과 공생이 있고, 생리적으로 서로 공유하지 않는 경우에는 경합, 편리작용, 편해작용, 원형작용 등이 있다. 다음 중 기생에 해당되는 것은?

- ① 콩밭 잡초 새삼
② 콩의 뿌리혹박테리아
③ 나무껍질에 붙어있는 지의류
④ 목초지에서 두과와 화본과 식물

65. 콩밭의 바랭이를 방제하는 데 적합하지 못한 것은?

- ① 멀칭재배를 한다.
② 이랑 및 포기 사이의 간격을 넓게 해 콩을 심는다.
③ 바랭이에 효과가 있는 제초제를 처리한다.
④ 밀도를 조밀하게 콩을 심어 재배한다.

66. 제초제를 연용하여도 저항성 잡초의 발현사례가 적은 이유가 아닌 것은?

- ① 제초제 약효 지속성이 짧음
② 잡초의 생식 및 번식빈도가 1년에 수회 반복
③ 토양에 많은 양의 감수성 잡초종자 함유
④ 감수성 잡초보다 저항성 잡초계통의 고정율이 낮음

67. 주로 종자에 의하여 번식되는 잡초는?

- ① 올미 ② 가래
③ 너도방동사니 ④ 피

68. 다음 중 화곡류(禾穀類)의 어느 시기에 2, 4-D를 처리할 때 피해가 가장 큰가?

- ① 발아기 ② 분얼기
③ 개화기 전후 ④ 수확기

69. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이는 방법은?

- ① 직파재배를 한다. ② 이랑·이식재배를 한다.
③ 무비재배를 한다. ④ 무경운재배를 한다.

70. 다음 중 우리나라 축산 사료용 옥수수 재배포장에 대량 발생되어 문제가 되고 있는 외래잡초는?

- ① 바랭이(Digitaria ciliaris)
② 쇠비름(Potulaca olaeracea)
③ 어저귀(Abutilon theophrasti)
④ 여뀌(Persicaria hydropiper)

71. 다년생의 영양번식기관이 아닌 것은?

- ① 덩이줄기 ② 뿌리줄기
③ 비늘줄기 ④ 절간

72. 종자 발아에 영향을 미치는 3대 환경요인이 아닌 것은?

- ① 광(光) ② 산소(酸素)
③ 온도(溫度) ④ 토양산도(pH)

73. 잡초의 생물학적 방제에 있어서 방제용으로 도입되는 생물(천적)이 구비하여야 할 조건 중 맞지 않는 것은?

- ① 대상 이외의 식물에 대하여도 서식을 하여 소멸하지 않아야 한다.
② 환경에 잘 적응하며, 잡초의 적응지역에 적응할 수 있어야 한다.
③ 비산 또는 분산하는 능력이 크고 숙주인 잡초에 잘 이동해야 한다.
④ 인공적으로 배양 또는 증식이 용이하며 생식력이 강해야 한다.

74. 효과적인 잡초 방제를 위해서는 재배작물은 물론 발생하는 잡초의 종류와 환경적인 조건을 파악하여야 한다. 다음 비농경지 잡초 방제시 비농경지가 구비하고 있는 특성 중 옳지 않은 것은?

- ① 경운 및 정지작업이 이루어지지 않기 때문에 발생하는 잡초의 종류가 단순하다.
② 잡초의 발생시기가 일정하지 않고 계속적으로 연장된다.
③ 지표면이 항상 잡초의 발아에 유리한 상태이다.
④ 후작의 염려가 없기 때문에 잔효기간이 긴 제초제를 처리하는 것이 바람직하다.

75. 잡초의 발아습성 중 발아기회성은 어떤 특성을 뜻하는가?

- ① 일장에 감응하여 발아하게 되는 특성
② 오랜 기간에 걸쳐 지속적으로 발아하게 되는 특성
③ 일정한 간격을 가지고 최고의 발아율을 나타내는 특성
④ 온도조건에 감응하여 발아하게 되는 특성

76. 잡초를 방제하지 않았을 경우 발생된 잡초가 작물에 직접 피해를 주는 가장 큰 요인은?

- ① 환경악화 ② 혼입부착
③ 병해충매개 ④ 경합

77. 예방적 방제수단에 해당하지 않는 것은?

- ① 작물종자의 정선 ② 중경제초
③ 비산종자의 관리 ④ 농기계의 청소

78. 밭에서 발생하는 초우점 화본과 잡초는?

- ① 나도겨풀 ② 바랭이
③ 메귀리 ④ 강아지풀

79. 잡초를 형태학적으로 분류할 때 관계없는 것은?

- ① 화본과 잡초 ② 초본류
③ 광엽 잡초 ④ 방동사니과 잡초

80. 잡초는 해롭기만 한 것이 아니라 유용성도 있다. 다음 중 잡초의 유용성으로 적당하지 않은 것은?

- ① 토양에 유기물을 공급해 준다.
② 병해충의 서식처가 된다.
③ 토양 유실을 방지해 준다.
④ 작물개량을 위한 유전자 자원으로 활용될 수 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	①	②	③	②	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	①	③	③	①	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	①	①	①	②	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	④	④	④	②	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	④	③	③	③	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	③	③	③	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	①	①	②	②	④	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	①	④	④	②	②	②	②