

1과목 : 식물병리학

1. 코흐(Koch)의 법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 병원체는 분리되어 배지에서 순수 배양되지 않을 수도 있다.
- ② 발병한 부위로부터 접종에 사용하였던 것과 동일한 병원체가 재분리되어야 한다.
- ③ 병환부에는 그 병을 일으키는 것으로 추정되는 병원체가 항상 존재하여야 한다.
- ④ 순수 배양한 병원체를 건전한 기주에 접종하였을 때 동일한 병이 발생하여야 한다.

2. 유성번식을 하지 않거나 매우 드물게 하는 것은?

- ① 접합균                      ② 자낭균
- ③ 담자균                      ④ 불완전균

3. 기주 특이적 독성 물질을 분비하는 병원균에 의하여 발생하는 병은?

- ① 벼 키다리병                      ② 담배 들불병
- ③ 벼 깨씨무늬병                      ④ 배나무 검은무늬병

4. 식물이 병에 걸리기 쉬운 성질은?

- ① 저항성                      ② 면역성
- ③ 감수성                      ④ 병회피

5. 식물병의 방제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점목재배를 하여 오이나 수박의 토양병을 해결할 수 있다.
- ② 순무 모자이크바이러스는 진딧물이 활동하는 시기를 피하여 재배한다.
- ③ 딸기 시들음병은 저온에서 잘 발생하므로 저온의 시기를 피하여 재배한다.
- ④ 재배시기를 앞당기거나 늦춤으로써 토양병이 활발하게 활동하는 시기를 피할 수 있다.

6. 순환물기생균에 의해 발생하는 병은?

- ① 감자 역병                      ② 밀 붉은녹병
- ③ 맥류 감부기병                      ④ 고구마 무름병

7. 벼 도열병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기전염성 식물병이다.
- ② 병원균은 *Fulvia fulva*이다.
- ③ 병원균에는 여러 가지 레이스가 존재한다.
- ④ 야간 온도가 높고 습한 조건에서 질소질 비료를 과용한 논에 잘 발병한다.

8. 현재 중간 기주가 발견되지 않아 이종기생하지 않는 것으로 분류되는 녹병은?

- ① 밀 줄기녹병                      ② 잣나무 털녹병
- ③ 보리 겉깜부기병                      ④ 사과나무 붉은별무늬병

9. 오동나무 빗자루병을 매개하는 해충은?

- ① 응애                      ② 꽃매미
- ③ 목화진딧물                      ④ 담배장님노린재

10. 소나무 흑병균의 중간기주가 아닌 것은?

- ① 졸참나무                      ② 떡갈나무
- ③ 굴피나무                      ④ 굴참나무

11. 파이토플라스마에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세포벽이 없는 작은 생물이지만 원형질은 있다.
- ② 세포의 기본적인 기능을 수행하는 원형질이 없다.
- ③ 일정한 형태는 없지만 세포벽과 세포막을 모두 가지고 있다.
- ④ 생장조건에 따라 형태가 변하며 두꺼운 세포벽을 갖고 있다.

12. 전신감염을 일으키는 병원체가 아닌 것은?

- ① 선충                      ② 세균
- ③ 바이러스                      ④ 파이토플라스마

13. 감자 더듬이병을 일으키는 병원균은?

- ① *Xylella*                      ② *Spiroplasma*
- ③ *Phytoplasma*                      ④ *Streptomyces*

14. 감염 기주에서 인돌아세트산의 분비량을 증가시키는 병원균이 아닌 것은?

- ① 감자 역병균                      ② 배추 무사마귀병균
- ③ 완두 검은무늬병균                      ④ 옥수수 감부기병균

15. 식물 병원 세균을 분리하여 그람염색하였더니 양성로 나타났다. 이 세균의 속명은?

- ① *Clavibacter*                      ② *Xanthomonas*
- ③ *Pseudomonas*                      ④ *Agrobacterium*

16. 수목병의 증상에 속하지 않는 것은?

- ① 소나무의 시들음                      ② 밤나무의 줄기마름
- ③ 호두나무의 뿌리혹                      ④ 아까시나무의 뿌리혹

17. 과수 근두암증병의 발병 부위는?

- ① 잎 앞면                      ② 열매 전체
- ③ 만개한 꽃                      ④ 줄기 일부

18. 살균제에 대한 저항성 유발을 최소화하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 농약살포 횟수를 최소화한다.
- ② 침투성살균제 위주로 사용한다.
- ③ 항저항성 물질이나 협력제를 첨가한다.
- ④ 상이한 유효성분을 가진 약제를 교대로 살포한다.

19. 식물방역법에는 수입 금지 식물, 금지 지역, 금지 병해충을 명시하고 있다. 금지 병해로만 바르게 나열된 것은?

- ① 배 화상병, 담배 노균병
- ② 감자 역병, 감자 갈썩병
- ③ 감자 암종병, 포도 노균병
- ④ 국화 흰녹병, 사과 빗자루병

20. 표징에 해당하는 것은?

- ① 씨방의 염화                      ② 잎의 흰가루
- ③ 잎의 황화현상                      ④ 식물체 전체의 위축

2과목 : 농림해충학

21. 유충이 과일 속으로 뚫고 들어가 과일 속을 가해하는 해충은?

- ① 사과혹진딧물                      ② 포도유리나방  
③ 배나무방패벌레                ④ 복숭아심식나방

22. 노린재와 같은 곤충은 포식자의 공격에 대항하여 방어물질을 분비하는데 이러한 물질을 무엇이라고 하는가?

- ① 페로몬                              ② 알로몬  
③ 시노몬                              ④ 카이로몬

23. 곤충 성장조절제의 일종인 디플로벤주론의 작용기작은?

- ① 산란 억제                          ② 키틴 합성 억제  
③ 소화효소 합성 억제            ④ 탈피호르몬 생산 억제

24. 배추좀나방에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 약충으로 월동한다.  
② 일본과 우리나라에만 분포한다.  
③ 배추 결구 속에 들어가 가해한다.  
④ 비래해충으로 우리나라에는 월동하지 않는다.

25. 유기인계 살충제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인축에 대해서는 독성이 약한 편이다.  
② 알칼리에 의해서 쉽게 가수분해 된다.  
③ 물에 불용성이나 유기용매에는 잘 녹는다.  
④ 주로 접촉독제 또는 침투성 살충제로 사용된다.

26. 곤충 분류학상 딱정벌레목에 속하지 않는 종은?

- ① 소나무좀                            ② 마름무늬매미충  
③ 오리나무잎벌레                ④ 느티나무버록바구미

27. 토양생태계에 있어서 토양 곤충의 가장 중요한 역할은?

- ① 생산자 역할                      ② 소비자 역할  
③ 분해자 역할                      ④ 오염자 역할

28. 솔껍질깍지벌레의 가해 형태 및 피해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가지에 기생하여 흡즙 가해한다.  
② 후약충이 가장 많이 피해를 준다.  
③ 피해가 심한 경우 임목이 고사한다.  
④ 수관 상부 가지의 잎부터 갈색으로 변한다.

29. 식물체에 약액을 흡수시켜 즙액을 빨아먹는 해충을 방제하는 것은?

- ① 훈증제                              ② 접촉제  
③ 소화중독제                      ④ 침투성 살충제

30. 완전변태류에 속하는 것은?

- ① 메뚜기목                            ② 노린재목  
③ 풀잠자리목                      ④ 총채벌레목

31. 곤충의 휴면작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휴면과 관련된 곤충의 행동은 PER 단백질에 의해서이다.  
② 광주기에 의한 휴면유도는 온도 및 습도의 영향을 받지

않는다.

- ③ 곤충은 광주기를 인식하여 겨울이 오기 전에 미리 휴면 유도가 된다.  
④ 불리한 조건에서 생존하기 위해 사용하는 많은 전략 중 하나이다.

32. 해충의 화학적 방제법 중 천적에 미치는 영향이 상대적으로 적은 방법은?

- ① 주입법                              ② 연무법  
③ 훈증법                              ④ 분무법

33. 개체군의 밀도 변동에 영향을 가장 적게 미치는 것은?

- ① 이동                                  ② 출생률  
③ 사망률                              ④ 기주선회성

34. 곤충이 생활하는 도중 좋지 않은 환경에 맞추어 대사율을 낮추는 것은?

- ① 이주                                  ② 휴면  
③ 휴지                                  ④ 탈피

35. 곤충의 소화기관에서 음식물이 중장으로 넘어가는 밸브 역할 또는 단단한 음식을 부수는 역할을 하는 조직은?

- ① 전위                                  ② 맹장  
③ 식도                                  ④ 모이주머니

36. 씹어먹는 입을 가진 해충은?

- ① 버벌구 성충                      ② 파밤나방 유충  
③ 목화진딧물 유충                ④ 온실가루이 성충

37. 우리나라에서 솔잎혹파리가 주로 가해하는 수종은?

- ① 곰솔                                  ② 잣나무  
③ 리기다소나무                    ④ 방크스소나무

38. 해충과 월동태의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 점박이응애 - 성충                ② 벼물바구미 - 성충  
③ 이화명나방 - 성충                ④ 복숭아혹진딧물 - 알

39. 거미강의 특징으로 옳은 것은?

- ① 번태를 한다.  
② 겹눈과 홑눈으로 되어 있다.  
③ 더듬이를 가지고 있어 이동이 빠르다.  
④ 몸의 구분은 머리·가슴과 배의 2부분으로 되어 있다.

40. 부화유충은잎을 가해하고 2~3령 이후에는 줄기 속을 먹어 들어가는 해충은?

- ① 조명나방                            ② 거세미나방  
③ 고자리파리                        ④ 배추버록잎벌레

3과목 : 재배학원론

41. 일시적인 무기성분의 결핍증상이 나타날 경우 신속하게 양분을 공급하기 위해 이용하는 방법은?

- ① 토양시비                            ② 관비  
③ 엽면시비                            ④ 추비

42. 다음 중 F2의 표현형분리에서 상위성이 있는 경우 억제유전

자의 분리비는?

- ① 9:7                      ② 15:1  
③ 3:13                     ④ 9:6:1

43. 다음 중 형질전환품종의 내충성 품종에 도입한 것은?

- ① Salmonella typhimurium의 aroA 유전자  
② bar 유전자  
③ Bacillus thuringiensis의 Bt 유전자  
④ TMV의 외피단백질합성유전자

44. 다음 중 ( )에 알맞은 내용은?

( )은 짧은 원줄기 상에 3~4개의 원가지를 발달시켜 수형이 술잔모양으로 되게 하는 정지법이다.

- ① 원추형                      ② 덕형  
③ 울타리형                  ④ 배상형

45. 종자의 생리적 퇴화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감자는 평지에서 재종하면 고랭지에 비하여 생육기간이 짧고 기온이 높으므로 충실한 씨감자가 생산되지 못한다.  
② 콩은 건조한 토양에서 생산된 것이 차지고 축축한 토양에서 생산된 것보다 충실한 경향이 있다.  
③ 벼 종자는 평야지보다 분지에서 생산된 것이 임실이 좋다.  
④ 종자는 재배적 조건이 불량하면 생리적으로 퇴화한다.

46. 다음 중 ( )에 알맞은 내용은?

Ookuma는 목화의 머린 식물로부터 미충의 형성을 촉진하며 낙엽을 촉진하는 물질로서 ( )을 순수 분리하였다.

- ① ABA                      ② 지베렐린  
③ 시토키닌                  ④ 에세폰

47. 다음 중 ( 가 ), ( 나 )에 알맞은 내용은?

- ( 가 )은 가지의 선단부를 휘어서 묶는 방법으로, 나무딸기에서 이용된다.  
- ( 나 )은 긴 가지를 파상으로 휘어서 하곡부마다 흠을 덮어 한 가지에서 여러 개를 취목하는 방법으로, 포도나무에서 이용된다.

- ① 가 : 성토포법, 나 : 파상취목법  
② 가 : 성토포법, 나 : 당목취법  
③ 가 : 선취법, 나 : 파상취목법  
④ 가 : 선취법, 나 : 고취법

48. <다음>에서 설명하는 내용은?

질산환원효소의 구성성분이며, 질소대사에 필요하고, 콩과작물 뿌리혹박테리아의 질소고정에도 필요하다. 콩과작물에 그 함량이 많으며, 결핍하면 모자이크병과 비슷한 증세가 나타난다.

- ① 칼륨                      ② 몰리브덴  
③ 마그네슘                  ④ 질소

49. <다음>에서 설명하는 내용은?

- 경사가 심한 곳에 초지를 조성할 때 사용한다.  
- 방목을 하며 잡초를 없애고 목초 종자를 파종한 다음, 다시 방목을 하며 답압시켜 목초의 발아를 보장하는 방법이다.

- ① 간지정지                  ② 씨레질  
③ 제경법                      ④ 경운깊이

50. 다음 중 ( )에 알맞은 내용은?

유전자원을 이용하여 많은 무량품종을 육성하였다. 그 결과 유전적으로 다양한 재래종들이 급속히 사라지게 되었으며, 이를 ( )이라고 한다.

- ① 유전적 취약성              ② 유전적 침식  
③ 생리적 취약성              ④ 지리적 침식

51. <다음>에서 설명하는 내용은?

저온에 의하여 작물의 조직 내에 결빙이 생겨서 받는 피해이다.

- ① 냉해                      ② 습해  
③ 동해                      ④ 수해

52. 재1감수분열 전기에 나타나는 단계순서로 옳은 것은?

- ① 세사기→대합기→태사기→이중기→이동기  
② 세사기→이중기→대합기→태사기→이동기  
③ 세사기→이중기→태사기→대합기→이동기  
④ 태사기→세사기→이중기→대합기→이동기

53. 다음 중 작물의 복토 깊이가 5~9cm인 것은?

- ① 호박                      ② 수수  
③ 생강                      ④ 시금치

54. 중요로 이용되는 영양기관을 분류할 때 지근에 해당하는 것은?

- ① 글라디올라스              ② 돼지감자  
③ 토란                      ④ 고사리

55. 다음 중 기원지가 중국에 해당하는 것으로만 짝지어진 작물은?

- ① 녹두, 목화                  ② 팥, 황마  
③ 참깨, 호프                  ④ 담배, 참깨

56. 다음 중 자식성 작물로만 이루어진 것은?

- ① 벼, 콩, 토마토              ② 벼, 옥수수, 호밀  
③ 옥수수, 콩, 메밀              ④ 보리, 호밀, 양파

57. 다음 여름작물 중 적산온도가 가장 낮은 것부터 높은 순으로 나열된 것은?(단, 가장 낮은 것을 왼쪽부터 나열한다.)

- ① 메밀 < 조 < 담배              ② 벼 < 조 < 담배

- ③ 버 < 메밀 < 담배                      ④ 담배 < 메밀 < 버

58. 다음 중 포장동화능력의 식으로 옳은 것은?

- ① 총엽면적 × (수광능력 + 평균동화능력)  
 ② 총엽면적 × 수광능력 ÷ 평균동화능력  
 ③ 총엽면적 × 수광능력 × 평균동화능력  
 ④ 총엽면적 ÷ 수광능력 × 평균동화능력

59. 다음과 같이 농경의 발상지를 추정한 사람은?

기후가 온화한 산간부 중 관개수를 쉽게 얻을 수 있는 곳이 농경에 용미하고 안정하므로 이곳을 최초의 농경 발상지로 추정하였다.

- ① De Candolle                      ② N.T. Vavilov  
 ③ P. Dettweiler                      ④ Aristoteles

60. 종자 품질 중 내적조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 유전성                      ② 수분함량  
 ③ 발아력                      ④ 병충해

4과목 : 농약학

61. 농약 잔류허용기준 설정 시 내용에 포함되지 않는 것은?

- ① 안전계수(1/100)  
 ② 농약의 유효성분  
 ③ 최대무작용량(NOEL)  
 ④ 국민평균체중/식품별 1일 섭취량

62. 유기비소제의 일반식이 R · As · X<sub>2</sub>로 표시될 때 R이 지방족일 경우 가장 살균력이 큰 것은?

- ① -CH<sub>3</sub>                      ② -C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>  
 ③ -C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>                      ④ -C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>

63. 농약제제화의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사용자에게 대한 편의성을 위하여  
 ② 최적의 약효발현과 최소의 약해 발생을 위하여  
 ③ 소량의 유효성분을 넓은 지역에 균일하게 살포하기 위하여  
 ④ 유통기간을 단축하여 유효성분의 안정성을 향상시키기 위하여





64. 다음 중 주로 원상태로 사용되는 농약제제 형태는?

- ① 액상수화제                      ② 미탁제  
 ③ 세립제                      ④ 분상선택제

65. 유기인계 살충제 농약이 아닌 것은?

- ① 디프(DEP)                      ② 펜치온(Fenthion)  
 ③ 메프(Fenitrothion)                      ④ 네오아소진(MAFA)

66. 살균제 지람(Ziram)의 구조식은?



67. Parathion제의 살충기작이 일어나는 주된 이유는?

- ① 침투성이 우수하기 때문이다.  
 ② 체내에서 분해가 빠르기 때문이다.  
 ③ Cytochrome oxidase를 저해하기 때문이다.  
 ④ Cholinesterase의 작용을 저해하기 때문이다.

68. 너도밤동사니, 물달개비 및 올챙이고랭이를 선택적으로 제거하는 제초제는?

- ① 벤치오입제(사단)                      ② 옥사존유제(론스타)  
 ③ 벤타존액제(벤타그란)                      ④ 설폰세이트(터치다온)

69. 안전농산물 생산을 위한 농약개발 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 종자분의제의 개발  
 ② 고효성, 저투입 농약의 개발  
 ③ 병해충 동시방제용 혼합제 개발  
 ④ Xylene이 주 용제로 사용되는 농약 개발

70. 다음 중 카바메이트계(carbamate)의 농약이 아닌 것은?

- ① 나크(carbaryl)                      ② 카보(carbofuran)  
 ③ 메소밀(methomyl)                      ④ 지오릭스(endosulfan)

71. 리바이젯드 유제 30%를 500배로 희석해서 10a당 8말을 살포하여 해충을 방제하고자 할 때 리바이젯드 유제 30%의 소요량은 몇 mL인가? (단, 1말은 18L로 한다.)

- ① 144                      ② 188  
 ③ 244                      ④ 288

72. 저장 곡류의 훈증제로 주로 사용되는 것은?

- ① DEP제                      ② Procymidone제

- ㉓ Methyl bromide제 ㉔ Alphonmethine제

73. 농약과 그 사용목적에 의한 분류로 틀린 것은?

- ① 나드 - 생장억제제  
② 실록세인 - 전착효과  
③ 지베렐린산 - 생장촉진  
④ 다이콧디브로마이드 - 작물건조

74. 발아전처리(pre-emrgence) 제초제에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 토양 및 경엽 처리가 가능한 약제이다.  
② 잡초 발아 전 시기에 처리하는 약제이다.  
③ 작물 발아 전 시기에 처리하는 약제이다.  
④ 작물의 생육기간 중에 살포하는 약제이다.

75. 농약의 안전사용수칙 등을 잘 지키지 않아 농약중독 사고가 발생할 수 있다. 농약사용자의 준수사항으로 틀린 것은?

- ① 바람을 등지고 살포한다.  
② 강우 전에 살포를 금한다.  
③ 인축의 기생충이나 가정의 해충구제에는 사용을 금한다.  
④ 사용액은 반드시 사용하기 24시간 이전에 만든다.

76. 미생물 농약의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 약효저조 ② 지효성  
③ 광범위 적용 ④ 환경 중 불안정

77. 이프로디온(Iprodion), 프로사미디온(Procymidione)은 다음 중 어디에 해당하는가?

- ① 살균제 ② 살충제  
③ 제초제 ④ 생장조절제

78. 급성 경구독성이 가장 강한 농약은?

- ① Zineb제 ② Parathion제  
③ DDVP제 ④ Diazinon제

79. 90% BPMC 원제 1kg을 2% 분제로 제조하는데 필요한 증량제의 양(kg)은?

- ① 44 ② 44.5  
③ 44.9 ④ 45

80. 식물 생장조절제 Indol-B에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 생장억제 작용을 한다.  
② 콩나물 생장 촉진제이다.  
③ 잔뿌리가 많아지고 원뿌리가 가늘어진다.  
④ 유효성분은 6-Benzyl adenine 단일 성분이다.

### 5과목 : 잡초방제학

81. 잡초방제에서 담수처리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무더운 날씨에는 효과가 줄어든다.  
② 온도 조절을 통해 잡초 발생을 줄이는 것이다.  
③ 발아에 필요한 산소흡수를 억제시켜 잡초발생을 줄인다.  
④ 다년생 잡초 방제에는 효과가 있으나 일년생잡초에는 효과가 없다.

82. 영아주 종자에서 나타나는 종피에 의한 휴면성의 원인으로 가장 적당한 것은?

- ① 미숙배 ② 낮은 수분 투과성  
③ 종피 내 질소결핍 ④ 종피 내 독성물질의 존재

83. 월년생 잡초에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2년생 잡초라고도 한다.  
② 쇠비름, 깨풀 등이 있다.  
③ 로제트(rosette) 형태로 월동한다.  
④ 주로 온대지역에서 볼 수 있는 잡초이다.

84. 다른 조건보다 주로 일장에 반응하여 휴면이 타파되어 잡초 종자가 발아하게 되는 특성은?

- ① 발아 기회성 ② 발아 계절성  
③ 발아 주기성 ④ 발아 연속성

85. 뿌리가 토양에 고정되어 있지 않고 물 위에 떠다니는 부유성 잡초에 해당하는 것은?

- ① 가래 ② 네가래  
③ 생이가래 ④ 가는가래

86. 작물과 잡초의 경합특성상 작물의 수량 감소가 가장 클 것으로 예상되는 조합은?

- ① C<sub>3</sub>잡초와 C<sub>3</sub>작물 ② C<sub>3</sub>잡초와 C<sub>4</sub>작물  
③ C<sub>4</sub>잡초와 C<sub>3</sub>작물 ④ C<sub>4</sub>잡초와 C<sub>4</sub>작물

87. 잡초의 피해를 경감시키기 위하여 대체로 작물 생육기간의 어느 시기 내에 방제하는 것이 가장 적합한가?

- ① 1/4 ~ 1/3 시기 ② 1/4 ~ 2/3 시기  
③ 1/2 ~ 2/3 시기 ④ 2/3 ~ 3/4 시기

88. 제초제를 400g/ha를 유효성분 기준으로 공판에 처리하려고 한다. 50m<sup>2</sup>의 면적인 콩 포장에 살포하기 위하여 B제초제 유제(25% 유효성분)는 얼마나 필요한가? (단, 비중은 1)

- ① 4mL ② 6mL  
③ 8mL ④ 10mL

89. 화본과 잡초에 해당하는 것은?

- ① 강피, 향부자 ② 강피, 바랭이  
③ 향부자, 참방동사니 ④ 바랭이, 참방동사니

90. 논에서 잡초의 군락천이를 유발시키는 데 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 장간종 품종 재배  
② 동일 작물로만 재배  
③ 화학비료의 지속적인 사용  
④ 동일한 제초제의 연속적인 사용

91. 잡초 종별 수량이 가장 적은 것은?

- ① 가지과 ② 국화과  
③ 화본과 ④ 방동사니과

92. 광요구성 제초제가 아닌 것은?

- ① Linuron ② Butachlor  
③ Oxidiazon ④ Oxyfluorfen

93. 논에서 벼와 경합하는 잡초로만 나열한 것은?

- ① 올미, 바랭이      ② 돌피, 쇠비름  
③ 쇠뜨기, 물달개비      ④ 쇠털골, 알방동사니

94. 제초제의 처리구역에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 전처리      ② 전면처리  
③ 대상처리      ④ 관주처리

95. 계면활성제의 특성이 아닌 것은?

- ① 분해성      ② 유화성  
③ 습윤성      ④ 전착성

96. 무처리구의 잡초 발생량이 건물량으로 850g이고 제초제 처리구의 잔존 잡초량이 건물량으로 34g일 때 이 제초제의 방제가는?

- ① 80%      ② 87%  
③ 92%      ④ 96%

97. 제초제 저항성 잡초의 방제 방법으로 옳은 것은?

- ① 제초제를 순환 사용한다.      ② 다른 제초제와 혼용한다.  
③ 제초제 사용량을 늘린다.      ④ 동일한 제초제를 연용한다.

98. 다년생 잡초로만 나열한 것은?

- ① 메꽃, 갯이밥      ② 별꽃, 벼룩나물  
③ 바랭이, 꽃다지      ④ 독새풀, 메귀리

99. 식물의 여러 기관에서 특정 물질이 분비되거나 또는 유출되어 주변 식물의 발아나 생육을 억제하는 현상은?

- ① 상호대립탈질작용      ② 상호대립길항작용  
③ 상호대립용탈작용      ④ 상호대립억제작용

100. 영양번식으로 증식하지 않는 잡초로만 나열된 것은?

- ① 벼풀, 매자기      ② 올방개, 엉겅퀴  
③ 여뀌바늘, 알방동사니      ④ 너도방동사니, 올챙이고랭이

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ①  | ④  | ④  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ②  | ①  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ④  | ②  | ②  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ②  | ①  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ③  | ③  | ④  | ②  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ③  | ①  | ③  | ④  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  | ④   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ④  | ③  | ①  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ③  | ②  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ②  | ④   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ③   |