

1과목 : 식물병리학

1. 토마토 풋마름병에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 토마토에만 감염된다.
 ② 담자균에 의한 병이다.
 ③ 병원균은 주로 병든 식물체에서 월동한다.
 ④ 병원균이 뿌리로 침입하면 뿌리가 흰색으로 변한다.
2. 식물병을 일으키는 병원체 중 핵산으로만 구성되어 있으며 크기가 가장 작은 것은?
 ① 바이러스 ② 바이로이드
 ③ 파이토플라스마 ④ 스피로플라스마
3. 포도나무 새눈무늬병균의 월동 형태는?
 ① 균핵 ② 균사
 ③ 담자포자 ④ 후막포자
4. 배추 무름병을 일으키는 병원체는?
 ① 세균 ② 곰팡이
 ③ 바이러스 ④ 파이토플라스마
5. 세균의 변이 기작이 아닌 것은?
 ① 접합 ② 형질 전환
 ③ 형질 도입 ④ 이핵 현상
6. 보리에 발생하는 줄기녹병의 중간기주는?
 ① 잣나무 ② 향나무
 ③ 배나무 ④ 매자나무
7. 대추나무 빗자루병 방제를 위하여 옥시테트라사이클린 수화제로 수간주사를 하려고 할 때 유의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 사용 적기는 4월초이다.
 ② 수확 30일 전까지 사용한다.
 ③ 흉고직경이 10cm인 경우 1회에 1L를 주입한다.
 ④ 물 10L에 약제 200g을 정량한 후 잘 녹여 사용한다.
8. 식물병원균에 대한 길항균으로 많이 사용되는 것은?
 ① Rhizoctonia solani ② Steptomyces scabies
 ③ Penicillium expansum ④ Trichoderma harzianum
9. 1970년에 미국에서 발생하여 옥수수 생산에 큰 피해를 준 식물병은?
 ① 역병 ② 맥각병
 ③ 도열병 ④ 깨씨무늬병
10. 배나무 검은별무늬병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 앞에서 처음에 황백색의 병무늬가 나타난다.
 ② 배나무 인근에 향나무가 많은 경우 발병하기 쉽다.
 ③ 배나무의 잎, 잎자루, 열매, 열매자루, 헛가지 등에 발한다.
 ④ 낙엽을 모아 태우거나 땅 속에 묻어 발병을 예방할 수 있다.
11. 병에 걸린 식물의 단면을 잘라서 점액의 누출 여부로 진단

하는 경우로 가장 적합한 것은?

- ① 세균에 의한 병 ② 선충에 의한 병
 ③ 곰팡이에 의한 병 ④ 바이러스에 의한 병
12. 바이로이드에 의한 식물병의 주요 병징은?
 ① 위축 ② 부패
 ③ 점무늬 ④ 줄무늬
13. 그람음성세균에 해당하는 것은?
 ① 토마토 궤양병균 ② 감자 더듬이병균
 ③ 벼 흰잎마름병균 ④ 감자 둘레썩음병균
14. 기주식물의 면역 또는 저항성 개선을 위해 약독 바이러스를 미리 감염시켜 식물체를 강독 바이러스의 감염으로부터 보호하는 것은?
 ① 교차보호 ② 식물방어
 ③ 유도저항성 ④ 저항성 품종
15. 사과나무 뿌리혹병의 주요 발생 원인은?
 ① 세균 감염 ② 토양 선충
 ③ 사상균 감염 ④ 생리적 장애
16. 초승달 모양의 대형 분생포자와 원 모양의 소형 분생포자를 형성하는 병원균은?
 ① 벼 도열병균 ② 벼 오갈병균
 ③ 벼 키다리병균 ④ 벼 흰잎마름병균
17. 벼 잎집무늬마름병의 방제 방법으로 옳은 것은?
 ① 감수성 품종을 재배한다.
 ② 고습도 상태로 재배한다.
 ③ 만생종 품종을 재배한다.
 ④ 칼리질 비료를 가급적 적게 준다.
18. 바이러스로 인한 식물병의 생물학적 진단방법은?
 ① 슬라이드법 ② 형광항체법
 ③ 괴경지표법 ④ X-체 검경법
19. 바이러스로 인한 식물병의 증상 중 세포 조직의 괴사로 나타나지 않은 것은?
 ① 반점 ② 위축
 ③ 줄무늬 ④ 등근검무늬
20. 벼 도열병균이 분비하는 독소는?
 ① 빅토린(Victorin)
 ② 피리클라린(Piricularin)
 ③ 후사릭 산(Fusaric acid)
 ④ 라이코마라스민(Lycomarasmin)

2과목 : 농림해충학

21. 봄에 수목 주변의 잡초를 제거하여 피해를 줄일 수 있는 해충은?
 ① 꽃매미 ② 소나무좀
 ③ 박쥐나방 ④ 포도뿌리혹벌레

22. 딱정벌레목의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 종이 다양하다.
 ② 불완전변태를 한다.
 ③ 앞날개가 두껍고 날개맥이 없다.
 ④ 대부분 외골격이 발달하여 단단하다.
23. 곤충의 천적으로 활용할 수 있는 바이러스가 아닌 것은?
 ① 과립 바이러스 ② 베고모 바이러스
 ③ 핵다각체 바이러스 ④ 세포질다각 바이러스
24. 성충과 유충이 모두 잎을 가해하는 해충은?
 ① 박쥐나방 ② 솔잎혹파리
 ③ 미국흰불나방 ④ 오리나무잎벌레
25. 식도하신경절에 의해 운동신경과 감각신경의 지배를 받지 않는 기관은?
 ① 큰턱 ② 작은턱
 ③ 더듬이 ④ 아랫입술
26. 애벌구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 천적은 날개집게벌, 애꽃노린재 등이 있다.
 ② 2모작 맥류재배를 하면 애벌구가 많이 발생한다.
 ③ 약충과 성충은 벼의 즙액을 빨아먹어 피해를 준다.
 ④ 중국으로부터 비래하지만 우리나라에서 월동은 불가능하다.
27. 벼룩잎벌레에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 번데기로 월동한다.
 ② 성충은 주로 열매를 가해한다.
 ③ 고추에 주로 발생하는 해충이다.
 ④ 일반적으로 작물이 어린 시기에 피해가 많다.
28. 외국으로부터 유입되어 우리나라에 정착한 해충이 아닌 것은?
 ① 벼밤나방 ② 벼물바구미
 ③ 온실가루이 ④ 꽃노랑총채벌레
29. 곤충의 배설을 담당하는 기관은?
 ① 알라타체 ② 존스톤기관
 ③ 말피기소관 ④ 모이주머니
30. 거미와 비교한 곤충의 일반적인 특징이 아닌 것은?
 ① 머리에는 입틀, 더듬이, 겹눈이 있다.
 ② 배마디에는 3쌍의 다리와 2쌍의 날개가 있다.
 ③ 곤충은 머리, 가슴, 배 3부분으로 구성되어 있다.
 ④ 곤충은 동물 중에 가장 종류가 많으며, 곤충강에 속하는 절지동물을 말한다.
31. 곤충의 생식 기관이 아닌 것은?
 ① 심문 ② 저장낭
 ③ 부속샘 ④ 송이체
32. 과변태를 하는 것은?
 ① 가뢰과 곤충 ② 파리과 곤충

- ③ 풍뎡이과 곤충 ④ 날도래과 곤충
33. 톱밥같은 배설물을 밖으로 내보내지 않고 수피 속의 갭도에 쌓아 놓아 피해를 발견하기가 어려운 해충은?
 ① 알락하늘소 ② 미끈이하늘소
 ③ 향나무하늘소 ④ 털두꺼비하늘소
34. 생육 중인 마늘이 하엽부터 고사하기 시작하여 포기의 인경을 파내어 보았더니 구더기 같은 회백색의 유충이 발견되었다면 어느 해충의 피해인가?
 ① 파밤나방 ② 고자리파리
 ③ 담배거세미나방 ④ 아메리카잎굴파리
35. 해충의 밀도와 농작물 피해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 경제적 피해허용수준은 어느 경우에도 일반평형밀도보다 높다.
 ② 경제적 피해수준은 경제적 피해허용수준보다 높게 관리해야 한다.
 ③ 일반적인 환경 조건에서 형성된 해충의 평균밀도를 일반평형밀도라고 한다.
 ④ 경제적 손실이 나타나는 해충의 최저밀도를 경제적 피해수준이라고 한다.
36. 단위생식이 가능한 것은?
 ① 밤나무혹벌 ② 배추흰나비
 ③ 송충알좀벌 ④ 잣나무넓적잎벌
37. 노린재목의 형태적 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 더듬이는 4~5개 마디로 구성된다.
 ② 뿔어 빠는 입이 있으며 미모는 없다.
 ③ 겹눈은 대부분 잘 발달하고 홑눈은 없거나 2~3개이다.
 ④ 다리의 발마디는 1~5개 구성되지만 대체로 5개 마디이다.
38. 카이로몬에 의한 곤충의 행태로 옳은 것은?
 ① 개미 군집에서 계급을 분화하여 생활
 ② 배추흰나방가 유채과 식물을 찾아 섭식
 ③ 노린재가 분비하는 고약한 냄새물질에 대한 포식자 회피
 ④ 수컷 나방이 멀리 떨어져 있는 암컷 나방을 찾아가는 행동
39. 유충이 열매 속으로 뚫고 들어가 가해하는 해충은?
 ① 사과혹진딧물 ② 포도유리나방
 ③ 복숭아심식나방 ④ 배나무방패벌레
40. 식물체 내에 농약 성분을 흡수시킨 후 식물체의 즙액을 빨아먹는 해충을 방제하는데 가장 적합한 것은?
 ① 훈증제 ② 접촉제
 ③ 소화중독제 ④ 침투성 살충제

3과목 : 재배학원론

41. 벼의 생육 중 냉해에 의한 출수가 가장 지연되는 생육단계는?
 ① 유효분얼기 ② 유수형성기

- ③ 감수분열기 ④ 출수기
42. 다음 중 작물의 주요온도에서 '최적온도'가 가장 낮은 작물은?
 ① 보리 ② 오이
 ③ 옥수수 ④ 멜론
43. 질산 환원 효소의 구성 성분으로 콩과작물의 질소고정에 필요한 무기성분은?
 ① 몰리브덴 ② 철
 ③ 마그네슘 ④ 규소
44. 작물의 내동성을 감소시키는 생리적 요인은?
 ① 전분함량이 많다.
 ② 원형질의 수분투과성이 크다.
 ③ 원형질의 점도가 낮다.
 ④ 원형질의 친수성 콜로이드가 많다.
45. 다음 중 감자의 휴면타파에 가장 유효한 것은?
 ① AMO-1618 ② 페놀
 ③ gibberellin ④ 2,4-D
46. 군락의 수광태세가 좋아지고 밀식 적응성이 높은 콩의 초형으로 틀린 것은?
 ① 잎이 크고 두껍다.
 ② 잎자루가 짧고 일어선다.
 ③ 꼬투리가 원줄기에 많이 달린다.
 ④ 가지를 적게 치고 가지가 짧다.
47. 다음 중 토양 유효수분의 범위로 가장 옳은 것은?
 ① 흡습수 이상의 토양수분
 ② 영구위조점과 흡습수사이의 수분
 ③ 최대용수량과 포장용수량사이의 수분
 ④ 포장용수량과 영구위조점사이의 수분
48. 다음 중 T/R율에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 감자나 고구마의 경우 파종기나 이식기가 늦어질수록 T/R율이 감소한다.
 ② 일사가 적어지면 T/R율이 감소한다.
 ③ 질소를 다양시용하면 T/R율이 감소한다.
 ④ 토양함수량이 감소하면 T/R율이 감소한다.
49. 다음 중 재배종과 야생종의 특징에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 ① 야생종은 휴면성이 약하다.
 ② 재배종은 대립종자로 발전하였다.
 ③ 재배종은 단백질 함량이 높아지고 탄수화물 함량이 낮아지는 방향으로 발달하였다.
 ④ 성숙시 종자의 탈립성은 재배종이 크다.
50. 다음 중 굴광현상에 가장 유효한 광은?
 ① 자외선 ② 적색광
 ③ 청색광 ④ 적외선
51. 다음 중 벼의 비료 3요소 흡수 비율로 가장 옳은 것은?

- ① 질소 5 : 인산 1 : 칼륨 1.5
 ② 질소 5 : 인산 2 : 칼륨 4
 ③ 질소 4 : 인산 2 : 칼륨 3
 ④ 질소 3 : 인산 1 : 칼륨 4
52. 다음 중 2년생 식물로만 구성되어 있는 것은?
 ① 가을보리, 코스모스 ② 가을밀, 국화
 ③ 옥수수, 호프 ④ 무, 사탕무
53. 다음 주 에틸렌의 전구물질에 해당하는 것은?
 ① tryptophan ② methionine
 ③ acetyl CoA ④ phenol
54. 강산성이 되면 가급도가 감소되어 작물 생육에 불리한 원소는?
 ① Cu ② Zn
 ③ P ④ Mn
55. 다음 중 식물의 광합성에 가장 효과적인 광색은?
 ① 주황색 ② 황색
 ③ 녹색 ④ 적색
56. 저온 버널리제이션을 실시한 직후 고온처리를 하면 버널리제이션 효과가 상실되는데, 이 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 이춘화 ② 등숙기춘화
 ③ 종자춘화 ④ 재춘화
57. 다음 중 천연 지베렐린에 해당하는 것은?
 ① IPA ② GA₂
 ③ PAA ④ CCC
58. 다음 중 작물의 기원지가 지중해 연안 지역에 해당하는 것으로만 나열된 것은?
 ① 조, 참깨 ② 사탕수수, 당근
 ③ 감자, 고구마 ④ 유채, 사탕무
59. 무기원소 결핍 시 사탕무의 속썩음병, 순무의 갈색속썩음병 등을 유발하는 원소는?
 ① 인 ② 질소
 ③ 망간 ④ 붕소
60. 다음 중 이랑을 세우고 이랑에 파종하는 방식은?
 ① 휴립휴파법 ② 성휴법
 ③ 휴립구파법 ④ 평휴법

4과목 : 농약학

61. 다음 제형 중 주로 병해충 예방용 약제를 대상으로 하며 단위면적당 농약 투입량이 가장 적은 것은?
 ① 종자처리수화제(WS) ② 유현탁제(SE)
 ③ 액상수화제(SC) ④ 미립제(MG)
62. 카복시아니라이드계 살균제로서 담자균류에 의한 병해에 효과가 뛰어난 약제는?
 ① 아이비(카타진) ② 베나솔(오리자)

- ③ 부라딘(금보라) ④ 메프로닐(논사)
63. 갯지렁이에서 천연 살충물질을 추출하여 농약으로 개발한 살충제는?
 ① 아바멕틴(avamectin) ② 벤선탭(bensultap)
 ③ 메소밀(methomyl) ④ 엔도선탭판(endosulfan)
64. 식물체 내에서 베타산화(β -oxidation) 여부로 선택성을 나타내는 것은?
 ① 2,4,5-T ② 2,4-DES
 ③ 2,4-DB ④ UDPG
65. 다음 살충제 중 유기인제가 아닌 것은?
 ① 테트라디폰(테디온) ② 디디브이피(DDVP)
 ③ 파라치온 ④ 파프(PAP)
66. $R - Hg - X$ 로 표시되는 유기수은제에서 X 에 해당되지 않는 것은?
 ① $-HPO_4$ ② $-Cl$
 ③ $-OH$ ④ $-CH_3$
67. 석회 보르도액은 어느 것에 해당하는가?
 ① 황제 ② 염소제
 ③ 구리제 ④ 비소제
68. 다음 살균제 중 유기유황제가 아닌 것은?
 ① 프로피 ② 지람
 ③ 네오아소진 ④ 만코지
69. 어류에 대한 농약의 독성 및 감수성에 영향을 미치는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 전착 ② 성장단계
 ③ 수온 ④ 제제형태
70. 유제(乳劑)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 수화제보다 살포액의 조제가 편리하다.
 ② 수화제보다 약효가 다소 낮다.
 ③ 수화제보다 제조비가 높다.
 ④ 수화제보다 포장 · 수송 · 보관이 어렵다.
71. 보리 겉깜부기병의 종자소독에 가장 효과적인 약제는?
 ① 지네브(Zineb)제 ② MAFA(neozin)제
 ③ 캡탄(captan)제 ④ 카아복신(carboxin)제
72. 농약이 갖추어야 할 사항으로 틀린 것은?
 ① 인축에 대한 독성이 낮아야 한다.
 ② 토양 및 수질 오염을 유발시키지 않아야 한다.
 ③ 작물 또는 토양에 대한 잔류성이 없어야 한다.
 ④ 적용 해충의 범위가 넓고 비선택적이어야 한다.
73. 싸이토키닌계의 식물호르몬제로써 콩나물의 생장촉진제로 가장 적합한 약제는?
 ① 페노프롬(fenoprop) ② 육-비에이(6-BA)
 ③ 지베렐린(gibberellin) ④ 아토닉(atonic)

74. BP(밧사)원제 0.4kg으로 2% 분제를 만들려고 할 때 소요되는 증량제의 양은? (단, 원제의 함량은 94% 이다.)
 ① 1.84kg ② 4.60kg
 ③ 18.4kg ④ 46.0kg
75. 농약의 검사방법에서 저비산분제(DL)의 검사항목이 아닌 것은?
 ① 분산성 ② 분말도
 ③ 입도 ④ 가비중
76. 농약은 종류별로 병뚜껑의 색깔을 달리하여 농민이 농약을 쉽게 식별할 수 있도록 하고 있는데 살균제의 병뚜껑은 다음 중 어떤 색인가?
 ① 분홍색 ② 녹색
 ③ 황색 ④ 청색
77. 다음 중 생장 조정제로 사용할 수 있는 것은?
 ① Oxadiazon ② Butachor
 ③ Molinate ④ 2,4-D
78. 농약 안전살포 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 바람을 등지고 살포 ② 바람을 안고 살포
 ③ 바람의 도움으로 살포 ④ 바람 방향을 무시하고 살포
79. 다음 중 농약제제의 품질불량이 원인이 되는 약해가 아닌 것은?
 ① 원제 부성분에 의한 약해
 ② 불순물의 혼합에 의한 약해
 ③ 섞어 쓰기 때문에 일어나는 약해
 ④ 경시변화에 의한 유해성분의 생성에 의한 약해
80. 다음 중 요소계 제초제는?
 ① 아파론(linuron) ② 2,4-D
 ③ 벤선탭라이드 ④ 론스타(Oxadiazon)

5과목 : 잡초방제학

81. 뿌리가 토양에 고정되어 있지 않고 물 위에 떠다니는 부유성 잡초에 해당하는 것은?
 ① 가래 ② 네가래
 ③ 생이가래 ④ 가는가래
82. 작물과 비교한 잡초의 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 종자 생산량이 많다.
 ② 전파수단이 다양하다.
 ③ 휴면성이 없어 연중 생장한다.
 ④ 불리한 환경에서 적응성이 높다.
83. 잡초의 예방적 방제 방법이 아닌 것은?
 ① 관배수로 관리 ② 재식밀도 조절
 ③ 작물종자 정선 ④ 농기구(농기계) 청결 관리
84. 토양 환경과 잡초의 출현에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 종자가 무거울수록 발생심도가 깊다.

- ② 토양이 과습하면 출현율이 낮아진다.
 ③ 토양이 건조하면 출아율이 낮아진다.
 ④ 사질토는 중점토보다 발생심도가 얕다.
85. 선택성 제초제가 아닌 것은?
 ① 벤틀라온 액제
 ② 세톡시딤 유제
 ③ 나프로파마이드 유제
 ④ 글리포세이트암모늄 입상수용제
86. 일년생 잡초와 비교한 다년생 잡초에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 방제하기 어렵다. ② 영양번식을 한다.
 ③ 생육기간이 길다. ④ 대부분 종자로 번식한다.
87. 작물의 수량 감소가 가장 클 것으로 예상되는 조합은?
 ① C3 잡초와 C3 작물 ② C4 잡초와 C3 작물
 ③ C3 잡초와 C4 작물 ④ C4 잡초와 C4 작물
88. 벼와 잡초간의 경합으로 인한 피해가 가장 적은 시기는?
 ① 출수기부터 수확기 ② 착근기부터 수잉기
 ③ 착근기부터 분얼기 ④ 파종기부터 최고 분얼기까지
89. 상호대립억제작용에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 제초제를 오래 사용한 잡초에 대한 내성을 나타내는 것이다.
 ② 죽은 식물 조직에서 나오는 물질에 의해서도 일어날 수 있다.
 ③ 다른 종의 생육을 억제하는 주된 기작은 주로 차광에 의해 일어난다.
 ④ 잡초가 다른 작물의 생육을 억제하는 것은 아니며 잡초 간에만 일어나는 현상이다.
90. 쌍자엽 잡초의 특징으로 옳은 것은?
 ① 앞은 평행맥이다.
 ② 뿌리는 직근계이다.
 ③ 산재된 유관속의 관상경을 가지고 있다.
 ④ 성장점이 줄기 하단의 절간 부위에 있다.
91. 광발아 잡초에 해당하는 것은?
 ① 강피, 바랭이 ② 냉이, 소리쟁이
 ③ 별꽃, 참방동사니 ④ 메귀리, 광대나물
92. 잡초의 생태적 방제 방법이 아닌 것은?
 ① 윤작 실시 ② 재배양식 변경
 ③ 피복 작물 재배 ④ 잡초만을 골라 먹는 생물 이용
93. 지면을 피복할 경우 잡초에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?
 ① 빛과 산소 공급이 차단된다.
 ② 잡초의 발아심도가 깊어진다.
 ③ 잡초가 물리적으로 질식하거나 출아가 억제되기도 한다.
 ④ 주 · 야간의 온도 차가 커져 잡초 종자의 발아 수가 격감된다.

94. 트리아진계 제초제의 주요 이행 특성은?
 ① 비대 성장 ② 조기 결실
 ③ 광합성 저해 ④ 신초 생장 억제
95. 두 제초제를 혼합하여 사용할 때 나타나는 길항적반응에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 혼합의 효과가 단독 처리의 효과와 같은 것을 의미한다.
 ② 혼합의 효과가 단독 처리의 효과보다 크지도 작지도 않은 것을 의미한다.
 ③ 혼합의 효과가 활성이 높은 물질의 단독처리의 효과보다 큰 것을 의미한다.
 ④ 혼합의 효과가 활성이 높은 물질의 단독처리의 효과보다 작은 것을 의미한다.
96. 작물, 잡초, 제초제의 연결이 옳지 않은 것은?
 ① 벼, 피, 뷰타클로르 입제
 ② 잔디, 크로바, 디캄바 액제
 ③ 콩, 방동사니, 이사-디 액제
 ④ 사과나무, 쇠비름, 시마진 수화제
97. 잡초 종자의 산포 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 바랭이 : 성숙하면서 흩어짐
 ② 소리쟁이 : 물에 잘 떠서 운반됨
 ③ 가막사리 : 바람에 잘 날려서 이동함
 ④ 메귀리: 사람이나 동물 몸에 잘 부착함
98. 유기제초제와 비교한 무기제초제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 처리 약량이 작다.
 ② 대사물의 독성이 낮다.
 ③ 경엽에 처리할 때 활성이 낮다.
 ④ 가격이 비싸며 살초 효과가 적다.
99. 화본과 잡초로만 올바르게 나열한 것은?
 ① 강피, 나도겨풀 ② 마디꽃, 매자기
 ③ 쇠털골, 알방동사니 ④ 가막사리, 올챙이고랭이
100. 논에서 잡초의 군락천이를 유발시키는 데 가장 큰 영향을 주는 것은?
 ① 장간종 품종 재배 ② 동일 작물로만 재배
 ③ 동일한 제초제 연속 사용 ④ 지속적인 화학 비료 사용

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	①	④	④	④	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	①	①	③	③	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	④	③	④	④	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	②	①	①	④	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	①	③	①	④	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	④	①	②	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	③	①	④	③	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	③	①	①	④	①	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	②	④	④	④	②	①	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	④	③	④	③	③	②	①	③