

1과목 : 식물병리학

1. 감자 역병에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세균병이다.
- ② 토마토에도 발생한다.
- ③ 2차 전염은 하지 않는다.
- ④ 진딧물을 잡는 것이 최선의 방제 방법이다.

2. 진딧물에 의해 전염되는 식물병으로 옳지 않은 것은?

- ① 감자 잎말림병 ② 콩 모자이크병
- ③ 배추 모자이크병 ④ 보리 녹지모자이크병

3. 식물병에 걸린 식물에서 보이는 독소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 병원균이 독소를 분비한다.
- ② 식물체가 독소를 분비한다.
- ③ 병원균, 식물체 모두가 독소를 분비한다.
- ④ 병원균, 식물체 모두가 독소를 분비하지 않는다.

4. 배나무 붉은별무늬병의 중간기주는?

- ① 송이풀 ② 향나무
- ③ 사시나무 ④ 매발톱나무

5. 노지에서 고추 역병이 가장 잘 발병하는 요인은?

- ① 건조 ② 고온
- ③ 침수 ④ 사질토양

6. 다음 설명에 해당하는 진단법은?

- 씨감자 중에 바이러스에 감염된 것을 선별하여 도태시키기 위한 것이다.
- 온실에서 생육한 감자의 눈에 나타난 병징으로 바이러스 감염 여부를 판정한다.

- ① 지표식물법 ② 즙액접종법
- ③ 괴경지표법 ④ 파지진단법

7. 식물체 물관에 병원균이 침입하여 시들음 현상이 나타나는 병은?

- ① 보리 녹병 ② 뽕나무 위축병
- ③ 토마토 풋마름병 ④ 사과나무 점무늬낙엽병

8. 균류에 의해 발생하는 수목병이 아닌 것은?

- ① 뽕나무 오갈병 ② 뽕나무 빗자루병
- ③ 낙엽송 잎떨림병 ④ 은행나무 잎마름병

9. 인공 배지에서 배양이 가능한 식물 병원체는?

- ① 세균 ② 선충
- ③ 바이러스 ④ 파이토플라스마

10. 여름의 저온 및 장마 조건에서 가장 발병하기 쉬운 것은?

- ① 벼 도열병 ② 벼 키다리병
- ③ 벼 이삭누룩병 ④ 벼 잎집무늬마름병

11. 난균문의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (문제 오

류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 다핵균사이다.
- ② 균사는 격벽이 없다.
- ③ 세포벽에는 키틴 성분이 없다.
- ④ 무성번식은 1개의 편모가 있는 유주자로 한다.

12. 동양에서 미국으로 옮겨가 큰 피해를 끼친 식물병은?

- ① 벼 도열병 ② 배나무 화상병
- ③ 포도나무 노균병 ④ 밤나무 줄기마름병

13. 유성포자가 아닌 것은?

- ① 난포자 ② 병포자
- ③ 자낭포자 ④ 담자포자

14. 호밀 맥각병에서 이삭에 생기는 자흑색 바나나 모양의 맥각 덩이의 정체는?

- ① 자낭 ② 균핵
- ③ 자낭포자 ④ 후막포자

15. 식물병의 면역학적 진단 방법을 의미하는 용어는?

- ① SSCP ② RACE
- ③ ELISA ④ RAPDs

16. 식물병의 생물적 방제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 신속하고 정확한 효과를 기대할 수 있다.
- ② 천적미생물은 대부분 잎이나 줄기에서 얻는다.
- ③ 넓은 지역에 광범위하게 사용하는 데 가장 효과적이다.
- ④ 미생물의 길항작용, 기생, 상호경쟁 또는 병저항성 유도를 이용하여 병을 억제한다.

17. 토마토 시설재배에서 자외선 차단 비닐을 이용하여 방제효과를 얻을 수 있는 병은?

- ① 풋마름병 ② 잎곰팡이병
- ③ 잿빛곰팡이병 ④ 푸른곰팡이병

18. TMV(Tobacco mosaic virus)로 인하여 발병하는 고추 모자이크병의 방제법으로 옳지 않은 것은?

- ① 살충제로 매개곤충을 제거한다.
- ② 전년도에 재배한 줄기나 뿌리를 제거한다.
- ③ 제3인산소다를 이용하여 종자를 소독한다.
- ④ 생육도중 발병한 식물체는 곧바로 제거한다.

19. 벼 도열병 방제에 가장 효과적인 비료는?

- ① 질소질 비료 ② 규산질 비료
- ③ 인산질 비료 ④ 칼륨질 비료

20. 토양 습도가 작물이 생육하기에 적합한 상태보다 건조할 때 잘 발생하는 병은?

- ① 감자 역병 ② 고추 모잘록병
- ③ 배추 무사마귀병 ④ 오이 덩굴쪼김병

2과목 : 농림해충학

21. 알락하늘소가 월동하는 형태는?

- ① 알 ② 유충
③ 성충 ④ 번데기

22. 곤충 체강 내에서 비틀림 운동을 하면서 pH 또는 무기이온 농도 등을 조절하면서 배설 작용을 돕는 기관은?

- ① 위맹낭 ② 지방체
③ 말피기관 ④ 모이주머니

23. 가해습성에 따른 해충의 분류로 옳지 않은 것은?

- ① 천공성 해충 - 소나무좀, 밤나무혹벌
② 종식 해충 - 밤바구미, 복숭아명나방
③ 흡즙성 해충 - 솔껍질깍지벌레, 버즘나무방패벌레
④ 식엽성 해충 - 오리나무잎벌레, 잣나무넓적잎벌

24. 풀잠자리목의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 완전변태를 한다.
② 생물적 방제에 많이 이용된다.
③ 더듬이는 길고 흡눈이 3개이다.
④ 유충과 성충은 대부분 포식성이다.

25. 해충발생밀도 조사 방법으로 페로몬 조사법을 적용하는 것이 가장 적합한 해충은?

- ① 버벌구 ② 말매미충
③ 고자리파리 ④ 복숭아심식나방

26. 사과응애에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡즙성 해충이다.
② 약충으로 월동한다.
③ 1년에 7~8회 발생한다.
④ 사과나무가 꽃 필 무렵 알에서 부화하여 꽃 주위의 어린 잎을 가해한다.

27. 곤충의 표피 중 가장 바깥쪽에 있는 것은?

- ① 왁스층 ② 원표피
③ 기저막 ④ 시멘트층

28. 곤충이 갖는 살충제 저항성 기작의 원인이 아닌 것은?

- ① 표피층 두께 증가 ② 해독효소 활성 감소
③ 빠른 배설 생리기작 ④ 농약으로부터 기피하는 행동

29. 거세미나방의 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유충은 길이가 40mm 정도이다.
② 성충의 머리와 가슴이 적갈색이다.
③ 알은 반구형이고 방사상의 줄이 있다.
④ 성충의 날개를 편 전체 좌우 길이는 40mm 정도이다.

30. 유약호르몬이 분비되는 기관은?

- ① 앞가슴샘 ② 알라타체
③ 외기관지샘 ④ 카디아카체

31. 방제 방법으로 나무주사가 효과적인 해충들로 올바르게 나열한 것은?

- ① 솔잎혹파리, 밤나무혹벌

- ② 밤바구미, 솔껍질깍지벌레
③ 미국흰불나방, 솔알락명나방
④ 솔잎혹파리, 솔껍질깍지벌레

32. 곤충과 비교한 응애의 특징으로 옳은 것은?

- ① 겹눈이 있다.
② 완전변태를 한다.
③ 다리가 6개 마디로 되어 있다.
④ 몸의 옆에 있는 기관이나 숨문으로 호흡한다.

33. 곤충 분류학상 외시류가 아닌 것은?

- ① 밀들이 ② 강도래
③ 노린재 ④ 집게벌레

34. 솔나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주로 월동 후의 유충기에 식해한다.
② 연 1회 발생하고 제5령 충으로 월동한다.
③ 새로 난 잎을 식해하는 것이 보통이나 밀도가 높으면 묵은 잎도 식해한다.
④ 유충이 소나무의 잎을 식해하며 심한 피해를 받은 나무는 고사하기도 한다.

35. 다리 마디의 위치가 몸쪽에서부터 가장 가까운 것은?

- ① 도래마디 ② 발목마디
③ 종아리마디 ④ 넓적다리마디

36. 곤충 날개가 두 쌍인 경우 날개의 부착 위치는?

- ① 가운데가슴에만 붙어 있다.
② 앞가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있다.
③ 앞가슴에 한 쌍, 가운데가슴에 한 쌍 붙어있다.
④ 가운데가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있다.

37. 우리나라에서 솔잎혹파리가 주로 가해하는 수종은?

- ① 곰솔 ② 잣나무
③ 리기다소나무 ④ 일본잎갈나무

38. 고추의 과실에 구멍을 뚫고 들어가 가해하는 해충은?

- ① 담배나방 ② 파총채벌레
③ 좁은가슴잎벌레 ④ 아메리카잎굴파리

39. 부화 유충이 몇 개의 버 잎을 끌어 모아 세로로 말고, 그 속에 숨어 있다가 해가 진후에 나와 버 잎을 가해하는 해충은?

- ① 버애나방 ② 조명나방
③ 버잎벌레 ④ 줄점팔랑나비

40. 진딧물류 방제를 위한 천적으로 옳지 않은 것은?

- ① 진디벌 ② 진디혹파리
③ 칠레이리응애 ④ 칠성풀잠자리

3과목 : 재배학원론

41. 다음 중 종자 파종 시 복토를 가장 얇게 해야하는 작물은?

- ① 호밀 ② 파

- ③ 잠두 ④ 나리
42. 다음 중 농산물의 안전 저장을 위하여 가장 높은 온도가 요구되는 작물은?
 ① 양파 ② 마늘
 ③ 감자 ④ 고구마
43. 다음 중 영양번식 방법을 가장 이용하지 않는 것은?
 ① 딸기 ② 고구마
 ③ 미니 파프리카 ④ 감자
44. 저장성, 도정율, 식미 등을 고려할 때 미국 저장 시 가장 알맞은 수분함량은?
 ① 5~8% ② 9~11%
 ③ 15~16% ④ 20~23%
45. 벼의 수량 구성요소 중 연차변이계수가 가장 작은 요소는?
 ① 천립중 ② 1수 영화수
 ③ 등숙비율 ④ 수수
46. 수확전 낙과 방지법으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① ABA 처리 ② 과습 방지
 ③ 방풍시설 설치 ④ 칼슘이온 처리
47. 멀칭(mulching)의 이용성에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 생육억제 ② 한해경감
 ③ 잡초억제 ④ 토양보호
48. 일장효과에 영향을 끼치는 조건에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 청색광이 가장 효과가 크다.
 ② 명기가 약광이라도 일장효과는 발생한다.
 ③ 본엽이 나온 뒤 어느 정도 발육한 후에 감응한다.
 ④ 장일식물은 상대적으로 명기가 암기보다 길면 장일효과가 나타난다.
49. 토양의 입단형성과 발달을 돕는 방법은?
 ① 유기물과 석회 사용
 ② 지속적인 경운
 ③ 입단의 팽창과 수축의 반복
 ④ 나트륨 이온(Na⁺)의 첨가
50. 다음 중 연작 장애가 가장 적은 작물은?
 ① 인삼 ② 감자
 ③ 쑥갓 ④ 담배
51. 작물 종자의 퇴화를 방지하는 방법으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 건조 후 밀폐저장 ② 충실한 종자의 선택
 ③ 무병지에서 채종 ④ 품종 간 자연 교잡율의 증대 실시
52. 다음 중 포도의 무핵과 생산에 가장 효과적으로 이용되고 있는 화학물질은?
 ① IBA ② CCC
 ③ Gibberellin ④ NAA

53. 작물의 생태적 분류에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 감자는 저온작물이다.
 ② 벼는 고온작물이다.
 ③ 하고현상은 난지형 목초에서 나타난다.
 ④ 사탕무는 2년생 작물이다.
54. 다음 비료 종류 중 질소 함량이 가장 높은 것은?
 ① 황산암모늄 ② 요소
 ③ 석회질소 ④ 초석
55. 다음 중 담전유효환의 효과를 기대할 수 있는 것은?
 ① 기지의 회피 ② 잡초의 번무
 ③ 지력 감퇴 ④ 벼 수량의 저하
56. 맥류의 형태와 파종방법에 따른 내동성과의 관계에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 파종을 깊게 하면 내동성이 강하다.
 ② 엽색이 진한 것이 내동성이 강하다.
 ③ 중경(中莖)이 덜 발달하여 생장점이 깊게 놓이면 냉동성이 강하다.
 ④ 직립성인 것이 포복성인 것보다 내동성이 강하다.
57. 작물생육에 있어 철(Fe)의 생리작용에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 호흡 효소의 구성 성분이다.
 ② 엽록소의 형성에 관여하지 않는다.
 ③ 망간, 칼슘 등의 과잉은 철의 흡수를 방해한다.
 ④ 결핍되면 어린잎부터 황백화한다.
58. 논토양의 일반적인 특성으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 토층분화가 나타나며 산화층은 적갈색을 띤다.
 ② 암모니아태 질소를 환원층에 주면 탈질 현상이 나타난다.
 ③ 논에서는 질산태 질소를 주로 사용하지 않는다.
 ④ 탈질작용은 질화균과 탈질균이 작용한다.
59. 다음 중 배유 종자로만 나열된 것은?
 ① 콩, 보리, 밀 ② 콩, 팥, 옥수수
 ③ 밤, 콩, 팥 ④ 옥수수, 벼, 보리
60. 벼의 키다리병과 관계되는 식물호르몬은?
 ① 옥신 ② 키네티ن
 ③ 지베렐린 ④ 에틸렌

4과목 : 농약학

61. 다음 보기에서 설명하는 농약은?

- 유기유황계 살균제이다.
- 광범위한 작물에 보호살균제로 사용된다.
- 과수의 탄저병 방제와 채소류 노균병 방제에 유효하다.
- 고온·다습조건에서 불안정하다.

- ① 만코지 수화제 ② 클로르헥타피르 수화제
③ 알파스린 유제 ④ 메치온 유제
62. 우리나라에서 농약 등록 시 농약안전성 평가 항목으로서 환경독성의 평가항목에 해당되는 것은?
① 급성독성 ② 어독성
③ 아급성독성 ④ 신경독성
63. 농약의 약해방지를 위한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?
① 해독제 이용
② 저농도 약액 살포
③ 농약의 안전사용 기준 준수
④ 표류비산을 막기 위한 제제의 개선
64. 맥류(麥類)와 목화(木花)의 종자소독제로 사용되는 침투성살균제는?
① 비타박스 ② 블라스티사이딘-S
③ 톱신 ④ 다코닐
65. 어떤 물질이 농약으로 사용되기 위하여 구비하여야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
① 살포시 작물에 대한 약해가 없어야 한다.
② 병해충을 방제하는 약효가 뛰어나야 한다.
③ 작물재배 전체기간 중 잔효성이 유지되어야 한다.
④ 사용하는 농민에 대하여 독성이 낮아야 한다.
66. 농약 보조제에 속하지 않는 것은?
① 계면활성제 ② 식물생장조정제
③ 증량제 ④ 유화제
67. 가스크로마토그래피에 의해 분석하고자 할 때 전자포획검출기(ECD)로 분석을 가장 용이하게 할 수 있는 농약은?
① Chlorothalonil ② Dichlorvos
③ Parathion ④ EPN
68. 천연물관련 Pyrethroid계 살충제에 해당되지 않는 농약은?
① 알파메스린(Alphamethrin)
② 비펜트린(Bifenthrin)
③ 델타메스린(Deltamethrin)
④ 트리프루르론(Triflumuron)
69. 리바이지드 50% 유제를 1000배로 희석하여 10a 당 180L를 살포하려 할 때 리바이지드 50% 유제의 소요량은?
① 45mL ② 90mL
③ 180mL ④ 360mL
70. 살충제 뚜껑 병뚜껑의 색깔은?
① 청색 ② 녹색
③ 분홍색 ④ 적색
71. 다음 벼농사용 농약 중 펜치온유제와 혼용이 가능한 약제는?
① 비피유제 ② 브로옌수화제
③ 피리다유제 ④ 다수진유제

72. 유기인계 살충제의 일반적인 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 잔효력이 길다.
② 흡습해충에 유효하다.
③ 인축에 대한 독성이 비교적 강하다.
④ 알칼리성 물질에 의하여 분해되기 쉽다.
73. 유제(乳劑)의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 수화제에 비하여 고농도의 제제가 가능하다.
② 수화제에 비하여 살포용 약액의 조제가 편리하다.
③ 수화제보다 생산비가 많이 소요된다.
④ 채소류에서 수화제에 비하여 증량제의 표면 부착으로 인한 흡착오염이 적다.
74. 제충국의 유효성분 중 집파리에 대한 살충력이 가장 강한 것은?
① 시네린 I (cinerin I) ② 시네린 II (cinerin II)
③ 피레트린 I (pyrethrin I) ④ 피레트린 II (pyrethrin II)
75. 잔류성 농약의 분류에 속하지 않는 것은?
① 작물 잔류성농약 ② 토양 잔류성농약
③ 수질 오염성농약 ④ 대기 오염성농약
76. 농약의 사용 기구에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 미스트기(mist spray)는 풍압으로 미립자를 만든 후 다량의 바람으로 불어 붙이는 기기이다.
② 스프링클러(sprinkler)는 관수·시비 등을 포함하여 다목적으로 사용되는 기기이다.
③ 폼스프레이(foam spray)는 살포액에 기포제를 가하여 전용 노즐로 공기와 교반 하는 거품의 집합체로 살포하는 기기이다.
④ 살립기(granule applicator)는 분제농약을 작업상의 안정성이나 능률면에서 고르게 살포하기 위한 기기이다.
77. 유기인계 계통의 약제를 강알칼리성 약제와 혼용을 피하는 가장 큰 이유는?
① 약해가 심하기 때문이다.
② 물리성이 나빠지기 때문이다.
③ 복합요인에 의한 작물의 생육 저해가 일어나기 때문이다.
④ 알칼리에 의해 가수분해가 일어나기 때문이다.
78. 농약의 사용목적에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?
① 식독제 ② 접촉독제
③ 유기인제 ④ 유인제
79. 건조 중 농약잔류량이 0.5ppm 이었다면 시료 1kg 중의 양은?
① 0.05mg ② 0.5mg
③ 5mg ④ 50mg
80. 해충의 콜린에스테라아제 효소활성을 저해시키는 약제는?
① 다이아지논유제 ② 사이헥사틴수화제
③ 네오아소진액제 ④ 디코폴수화제

5과목 : 잡초방제학

81. 광엽 잡초로만 올바르게 나열한 것은?

- ① 여뀌, 명아주 ② 돌피, 여뀌바늘
③ 매자기, 쇠비름 ④ 개비름, 바랭이

82. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 밀식 재배를 한다.
② 만생종 품종을 재배한다.
③ 춘파작물과 추파작물을 윤작한다.
④ 분지수가 많고 엽면적지수가 큰 품종을 재배한다.

83. 잡초 방제에 이용하려는 생물이 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 이동성이 있어서는 안 된다.
② 새로운 지역에서 적응성이 좋아야 한다.
③ 잡초보다 빠른 번식 능력이 있어야 한다.
④ 잡초 이외의 유용 식물을 가해해서는 안 된다.

84. 주로 밭에 발생하는 잡초로만 올바르게 나열한 것은?

- ① 벼풀, 팽이밥 ② 반하, 까마중
③ 가래, 한련초 ④ 올방개, 알방동사니

85. 다년생 잡초로만 올바르게 나열한 것은?

- ① 강피, 참방동사니 ② 쇠뜨기, 나도겨풀
③ 독새풀, 생이가래 ④ 자귀풀, 강아지풀

86. 제초제 제제에 보조제로 사용하는 계면활성제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주제를 변질시켜서는 안 된다.
② 유화력이나 분산력이 작아야 한다.
③ 주제와 친화성을 지니고 있어야 한다.
④ 작물에 약해를 일으키지 않아야 한다.

87. 잡초의 유용성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 논둑 및 경사지 등에서 지면을 덮어 토양 유실을 막아 준다.
② 근연 관계에 있는 식물에 대한 유전자 은행 역할을 할 수 있다.
③ 작물과 같이 자랄 경우 빈 공간을 채워 작물의 도복을 막아준다.
④ 유기물이나 중금속 등으로 오염된 물이나 토양을 정화하는 기능이 있다.

88. 생물학적 잡초방제에 가장 많이 이용되는 식물병원균 종류는?


- ① 선충 ② 세균
③ 균류 ④ 바이러스

89. 잡초 종자가 주로 일장에 반응하여 휴면이 타파되고 발아하게 되는 특성은?

- ① 발아 기회성 ② 발아 계절성
③ 발아 주기성 ④ 발아 연속성

90. 엽채류 작물의 경우 다음 그림에서 잡초경합 한계기간에 해

당하는 것은?



- ① A ② B
③ C ④ D

91. 잡초 종자에서 나타나는 종피에 의한 휴면의 주요 원인으로 옳은 것은?

- ① 미숙한 배 ② 독성 물질 존재
③ 이산화탄소 결핍 ④ 낮은 수분 투과성

92. 주로 영양번식 기관에 의하여 번식하는 잡초로만 올바르게 나열한 것은?

- ① 여뀌, 물옥잠 ② 쇠비름, 질경이
③ 마디꽃, 물달개비 ④ 가래, 너도방동사니

93. 잡초의 종별 수량이 가장 적은 것은?

- ① 국화과 ② 화본과
③ 십자화과 ④ 방동사니과

94. 작물과 잡초의 경합 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 잡초의 종류 ② 잡초의 밀도
③ 잡초의 생육 시기 ④ 잡초의 영양 상태

95. 논에 제초제를 사용하는 경우 처리시기로 가장 바람직하지 않은 것은?

- ① 수확기 처리
② 잡초 발아 전 처리
③ 작물 생육 초중기 처리
④ 작물 파종 또는 이식 후 처리

96. 제초제의 상승 작용에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 제초제를 단독으로 각각 처리하는 경우가 효과가 크다.
② 두 제초제를 혼합하여 처리하는 경우 작물의 생리적 장애 현상이 발생한다.
③ 두 제초제를 혼합하여 처리하는 경우와 단독으로 처리하는 경우의 효과가 같다.
④ 두 제초제를 혼합하여 처리하는 경우가 단독으로 처리하는 경우보다 효과가 크다.

97. 2, 4-D 제초제에 해당하는 것은?

- ① 페녹시계 ② 산아미드계
③ 카바마이트계 ④ 디페닐에테르계

98. 토양 속에 잔류하는 제초제의 양 및 기간에 영향을 주는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 경운 및 정지 ② 광분해 및 휘발성
③ 토양에 흡착 및 용탈 ④ 미생물 및 화학적 분해

99. 논잡초의 군락천이를 유발시키는 원인으로 가장 효과가 큰 것은?

- ① 담수 조건에서 재배
- ② 춘·추경을 많이 실시
- ③ 기계를 이용한 이앙 증가
- ④ 동일한 제초제를 연속하여 사용

100. 잡초 방제 방법으로 담수처리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무더운 날씨에는 효과가 줄어든다.
- ② 온도 조절을 통해 잡초 발생을 줄이는 것이다.
- ③ 발아에 필요한 산소의 흡수를 억제시켜 잡초 발생을 줄인다.
- ④ 다년생 잡초에는 효과가 있으나 일년생 잡초에는 효과가 없다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	②	③	③	③	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	②	③	④	③	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	③	④	②	④	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	③	①	④	①	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	③	①	①	①	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	②	①	④	②	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	①	③	②	①	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	③	④	④	④	③	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	①	②	②	②	③	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	③	④	①	④	①	①	④	③