

1과목 : 식물병리학

- 식물병의 표징을 볼 수 없는 병은?  
 ① 진균에 의한 병      ② 세균에 의한 병  
 ③ 바이러스에 의한 병      ④ 담자균에 의한 병
- 모과나무 잎에 갈색 별무늬 모양의 원형반점이 나타나고 잎 뒷면 병반에 실 같은 털이 나오는 병은?  
 ① 모과나무 탄저병      ② 모과나무 녹병  
 ③ 모과나무 갈반병      ④ 모과나무 역병
- 다음 중 병원체가 비, 바람에 의해 가장 많이 옮겨지는 것은?  
 ① 오동나무빛자루병      ② 콩모자이크병  
 ③ 벼줄무늬잎마름병      ④ 사과탄저병
- 국내 파이토플라스마의 전염방법으로 가장 옳은 것은?  
 ① 월동 후 토양전염을 한다.      ② 즙액전염을 한다.  
 ③ 바람에 의해 매개된다.      ④ 곤충에 의해 전염된다.
- 다음 중 비전염성인 병은?  
 ① 선충에 의한 병      ② 세균에 의한 병  
 ③ 바이러스에 의한 병      ④ 무기원소 결핍에 의한 병
- 종자전염성 병원균으로 가장 적절하지 않은 것은?  
 ① 오이 흰비단병균      ② 맥류 맥각병균  
 ③ 벼 키다리병균      ④ 벼 도열병균
- 사과나무붉은별무늬병균은 진균 중 어느 균류에 속하는가?  
 ① 불완전균류      ② 자낭균류  
 ③ 접합균류      ④ 담자균류
- 호박의 흰가루병을 방제하기 위해서는 어느 부위에 약제를 처리하는 것이 가장 효과적인가?  
 ① 뿌리      ② 토양  
 ③ 잎과 줄기      ④ 종자
- 다음 중 꽃감염(花器感染)을 하는 것으로 가장 적절한 것은?  
 ① 감자 암종병      ② 보리 걸깜부기병  
 ③ 벼나무 빗자루병      ④ 고추 탄저병
- 가지과 풋마름병(청고병)의 병징에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?  
 ① 매우 느리게 주위의 다른 포기로 병이 전파된다.  
 ② 뿌리는 갈변되지 않는다.  
 ③ 잎에 무수히 많은 반점이 생긴다.  
 ④ 경엽 전체가 녹색으로 시드는 경우도 있다.
- 벼 줄무늬잎마름병(호엽고병)의 방제방법으로 가장 적절한 것은?  
 ① 토양소독      ② 매개충의 구제  
 ③ 검역      ④ 발병 후 살균제 살포
- 감자 잎말림병을 일으키는 병원체로 적절한 것은?  
 ① 바이러스      ② 세균

- ③ 진균(곰팡이)      ④ 선충

- 어떤 식물병에 대하여 저항성이었던 품종이 갑자기 해당 식물병에 감수성이 되는 주된 원인은?  
 ① 기상 환경의 변화  
 ② 병원균 집단의 변화  
 ③ 식물체 내 영양성분의 변화  
 ④ 식물병 저항성 인자의 변화
- 벼 잎집얼룩병(잎집무늬마름병)의 표징으로 가장 적절한 것은?  
 ① 자낭반      ② 균사속  
 ③ 포자퇴      ④ 균핵
- 잣나무 잎떨림병균의 월동 장소로 가장 적절한 것은?  
 ① 땅위에 떨어진 병든 잎      ② 토양 속  
 ③ 나뭇가지에 붙어 있는 병든 잎      ④ 땅위에 떨어진 열매
- 벼를 기주로 하여 곰팡이에 의해 발병하는 것은?  
 ① 오갈병      ② 도열병  
 ③ 흰잎마름병      ④ 줄무늬잎마름병
- 벼 도열병 방제방법으로 가장 적절하지 않은 것은?  
 ① 종자소독을 한다.      ② 저항성 품종을 심는다.  
 ③ 질소비료의 과용을 피한다.      ④ 가급적 찬물을 대준다.
- 다음 중 벼의 병에서 물에 의해 가장 많이 전파되는 것은?  
 ① 흰잎마름병      ② 키다리병  
 ③ 키아즈마병      ④ 오갈병
- 병든 부분에 나타난 자낭각을 보고 진단할 수 있는 식물병으로 가장 적절한 것은?  
 ① 옥수수 광부기병      ② 밀 줄기녹병  
 ③ 고추 역병      ④ 보리 붉은곰팡이병
- 인삼 또는 당근의 뿌리에 흑과 같은 병징을 일으키는 대표적인 것은?  
 ① 뿌리혹박테리아      ② 뿌리혹선충  
 ③ 노균병균      ④ 아조토박터

2과목 : 농림해충학

- 곤충 개체간의 통신수단에 사용되는 물질로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① hormone      ② pheromone  
 ③ allomone      ④ kairomone
- 다음 중 성충의 피해가 문제되는 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 최종정답 발표시 1, 2번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)  
 ① 소나무좀      ② 뽕나무하늘소  
 ③ 밤나무순혹벌      ④ 솔나방
- 날개가 있는 것은 날개맥이 없는 가늘고 긴 날개를 가지고 있고 그 가장자리에 긴털이 규칙적으로 나 있으며 좌우대칭

- 이 아닌 입틀을 가지고 있는 곤충군은?
- ① 총채벌레목                      ② 나비목  
③ 노린재목                      ④ 매미목
24. 다음 중 수간에 황색털로 덮혀 있는 난과(알덩어리)는 어떤 해충의 난과인가?
- ① 미국흰불나방                      ② 천막벌레나방  
③ 매미나방                      ④ 복숭아유리나방
25. 복숭아혹진딧물의 학명은?
- ① *Myzus persicae* Sulzer  
② *Green peach aphid*  
③ *Tetranychus urticae* Koch  
④ *Panonychus citi* McGregor
26. 다음 중 씹는 형의 입틀을 갖지 않는 곤충으로 가장 적절한 것은?
- ① 이질바퀴                      ② 꽃노랑총채벌레  
③ 벼메뚜기                      ④ 장수풍뎅이
27. 다음 중 곤충의 방어물질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 곤충의 방어물질을 총칭 카이로몬이라고 한다.  
② 사회성 곤충에서는 독샘에서 분비하는 방어물질들이 대부분 효소들이다.  
③ 곤충의 방어샘에서 동정된 화합물로는 알칼로이드, 테르페노이드, 퀴논, 페놀 등이 있다.  
④ 비사회성 곤충에서는 방어물질 중에 개미들의 경보 페로몬과 같거나 비슷한 구조의 화합물도 있다.
28. 다음 중 곤충강으로 분류되지 않는 것은?
- ① 먹줄왕잠자리                      ② 벼물바구미  
③ 꿀벌                      ④ 지네
29. 곤충의 번성원인에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 세대가 길고 산란수가 많다.  
② 번태시 적에게 쉽게 노출된다.  
③ 불리한 환경에 적응하기 위해 휴면을 한다.  
④ 행동이 민첩하고 농약에 강하여 생존율이 높다.
30. 다음 중 충영을 형성하는 해충으로 가장 적절한 것은?
- ① 솔잎혹파리                      ② 독나방  
③ 어스랭이나방                      ④ 참나무겨울가지나방
31. 곤충의 알라타체에서 분비되는 호르몬은?
- ① 유약호르몬                      ② 뇌호르몬  
③ 카디아카체                      ④ 탈피호르몬
32. 다음 중 번대기 또는 마지막 영기의 약충이 탈피하여 성충이 되는 현상을 무엇이라고 하는가?
- ① 우화                      ② 부화  
③ 용화                      ④ 세대
33. 곤충의 뇌는 전대뇌, 중대뇌, 후대뇌로 3개의 신경절로 되어 있다. 후대뇌의 역할로 가장 옳은 것은?

- ① 시각각에 관여                      ② 청각각에 관여  
③ 소화기 운동에 관여                      ④ 촉각각에 관여
34. 곤충의 중장과 후장 사이에 분포하여 배설작용을 하는 기관은?
- ① 타액선                      ② 말피기씨관  
③ 직장                      ④ 소장
35. 다음 중 수목의 수피 속 형성층이나 목질부를 가해하는 해충으로 가장 적절하지 않은 것은?
- ① 향나무하늘소                      ② 회암목명나방  
③ 소나무좀                      ④ 박쥐나방
36. 곤충이 탈피할 때 새로운 표피로 대체(代替)되지 않는 기관은?
- ① 식도                      ② 전소장  
③ 직장                      ④ 맹장
37. 다음 중 나비목 유충이 견사(絹絲)를 분비하는 곳으로 가장 적절한 것은?
- ① 전위                      ② 맹장  
③ 침샘                      ④ 말피기씨관
38. 큰턱샘이 분비하는 물질로 가장 적절하지 않은 것은?
- ① 소화효소                      ② 경보페로몬  
③ 혈액응고 억제제                      ④ 성페로몬
39. 곤충의 날개는 대개 2쌍이 있다. 앞날개는 일반적으로 어디에 달려있는가?
- ① 앞가슴                      ② 가운데 가슴  
③ 뒷가슴                      ④ 측각
40. 다음 중 성충이 우화하여 공중으로 날면서 알을 떨어뜨리는 해충으로 가장 적절한 것은?
- ① 짚시나방                      ② 텐트나방  
③ 흰불나방                      ④ 박쥐나방

3과목 : 재배학원론

41. 다음 중 작물의 생리작용을 위한 주요온도에서 최적 온도가 가장 낮은 것은?
- ① 오이                      ② 보리  
③ 삼                      ④ 벼
42. 단일식물로만 나열한 것은?
- ① 양귀비, 양파                      ② 티머시, 감자  
③ 시금치, 상추                      ④ 코스모스, 벼
43. 농토양의 환원상태에서 원소별 존재형태를 바르게 나타낸 것은?
- ①  $C \rightarrow CO_2$                       ②  $N \rightarrow NO_3$   
③  $Fe \rightarrow Fe^{+2}$                       ④  $S \rightarrow SO_4^{-2}$
44. 저장 중 곡물의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 호흡소모로 중량감소가 일어난다.  
② 발아율이 저하된다.

- ③ 환원당 함량이 증가한다.  
 ❶ 유리지방산이 감소한다.

45. 다음 중 협채류에 속하는 작물은?

- ❶ 동부                      ② 토란  
 ③ 우엉                    ④ 미나리

46. 작물의 광합성에 가장 효과적인 광은?

- ① 녹색광                  ② 황색광  
 ③ 주황색광               ❶ 적색광

47. 사탕무의 속썩음병, 순무의 갈색속썩음병, 담배의 끝마름병 등과 관련 있는 필수원소는?

- ① 망간                    ❷ 붕소  
 ③ 아연                    ④ 몰리브덴

48. 눈이 트려고 할 때 필요하지 않은 눈을 손끝으로 따주는 것은?

- ❶ 적아                    ② 적엽  
 ③ 절상                    ④ 휘기

49. 다음 중 배의 미숙에 의한 휴면 현상이 나타나는 작물로 가장 옳은 것은?

- ① 자운영                  ❷ 인삼  
 ③ 귀리                    ④ 보리

50. 자가불화합성을 이용하는 작물로만 나열된 것은?

- ① 벼, 고추                  ② 밀, 옥수수  
 ❸ 배추, 무                  ④ 감자, 상추

51. 포장동화능력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 총엽면적×수광능률×군락상태  
 ❷ 총엽면적×수광능률×평균동화능력  
 ③ 총엽면적×광 차광률×상대습도  
 ④ 단위 엽면적×수분 포화율×평균동화능력

52. 다음에서 설명하는 것은?

파종된 종자의 약 40%가 발아한 날이다.

- ❶ 발아기                  ② 발아시  
 ③ 발아전                  ④ 발아 양부

53. 춘화처리의 농업적 이용관 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대파 할 수 있다.              ❷ 성전환이 가능하다.  
 ③ 채종에 이용될 수 있다.      ④ 축성재배가 가능하다.

54. 관개방법 중 등고선에 따라 수로를 내고, 임의의 장소로부터 월류하도록 하는 것은?

- ① 보더관개                  ❷ 일류관개  
 ③ 수반관개                  ④ 살수관개

55. 작물의 유전변이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 환경변이는 다음 세대에 유전한다.  
 ② 연속변이를 하는 형질을 질적 형질이라고 한다.  
 ③ 불연속변이를 하는 형질을 양적 형질이라고 한다.

- ❶ 꽃 색깔이 붉은 것과 흰 것으로 구별되는 것은 불연속변이다.

56. 벼 신품종 종자 증식을 위해 채종포에서 사용하는 종자는?

- ① 기본식물종자              ② 원원종  
 ❸ 원종                    ④ 보급종

57. 1대 잡종품종에서 잡종강세가 가장 크게 나타나는 것은?

- ❶ 단교배 종자              ② 3원교배 종자  
 ③ 복교배 종자              ④ 합성품종 종자

58. 우리나라 주요 작물의 기상상태형에서 감광형에 해당하는 것은?

- ❶ 그루조                    ② 조생종  
 ③ 울릉                    ④ 여름 메밀

59. 고구마의 안전저장 조건에서 온도 조건으로 가장 옳은 것은?

- ❶ 쿨어링 후 13~15℃      ② 쿨어링 후 20~25℃  
 ③ 쿨어링 후 28~30℃      ④ 쿨어링 후 35~38℃

60. 다음 중 단명종자로만 나열된 것은?

- ① 사탕무, 벼치              ② 수박, 나팔꽃  
 ③ 토마토, 가지              ❶ 메밀, 기장

#### 4과목 : 농약학

61. 95%인 원제 2kg으로 2% 분제를 만들려할 때, 소요되는 중량제의 양(kg)은?

- ① 73                      ② 83  
 ❸ 93                      ④ 103

62. 카바메이트(Carbamate)계 살충제의 작용에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 살충작용이 선택적이다.  
 ❷ 인축에 대한 독성이 가장 강하다.  
 ③ 적용범위가 넓고 약해가 적다.  
 ④ 식물체에 대한 침투력이 있다.

63. 페녹시(Phenoxy)계로서 고농도에서는 광엽선택제초성의 제초제이지만 낮은 농도에서는 생장촉진, 도복방지 등의 효과가 있다고 알려져 있는 농약은?

- ① pyrethrin                  ❷ 2,4-D  
 ③ DDT                    ④ BHC

64. 농약관리법령상 농약이 아닌 것은?

- ① 살충제                  ② 전착제  
 ③ 기피제                  ❶ 위생해충제

65. 살충제 농약의 작용점이 잘못 연결된 것은?

- ① 원형질독-유기수은계      ② 피부독-기계유유제  
 ③ 호흡독-청산가스          ❶ 근육독-피레스린

66. 급성 경구독성이 가장 강한 농약은?

- ① Zineb제                  ❷ Parathion제  
 ③ DDVP제                  ④ Diazinon제

67. 교차저항성(cross resistance)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동일한 작용기작을 가진 약제군 사이에서 그 중 1개의 약제에 저항성을 지니게 된 균은 같은 군의 다른 약제에 대해서도 저항성을 가진다.
- ② 작용점이 여러 개인 약제에 대하여 2가지 이상의 작용점에 저항을 획득하면 그 균은 교차저항성을 획득하였다고 한다.
- ③ 베노밀(benomyl)과 톱신-M(Topsin-M)의 경우 화학구조가 완전히 다르기 때문에 저항성의 획득도 다른 기작을 따른다.
- ④ 저항성균이 한 지역에 발생하여 다른 지역으로 이동되었을 때, 이동된 지역에서도 저항성을 유지하는 것을 교차저항성이라고 한다.

68. 기계유유제의 불포화탄화수소의 양을 표시하는 값으로 정제도(精制度)와 관계있는 물리적 성질은?

- ① 점조(viscosity)                      ② 비등점(boiling point)
- ③ 술폰가(sulfonative value)          ④ 응고(coagulation)

69. 피리딘계(4급 암모늄계) 제초제는?

- ① Paraquat                      ② Oxadiazon
- ③ Butachlor                      ④ Chlornitrofen

70. 비중이 1.15인 이소프로치오란 유제(50%) 100mL로 0.05% 살포액을 제조하는데 필요한 물의 양은 몇 L인가?

- ① 104.9                      ② 114.9
- ③ 124.9                      ④ 110.5

71. 유제, 수화제, 수용제 등의 약제 살포방법 중 별도의 공기는 주입하지 않으며 약액에 압력을 가하여 미세한 출구로 직접 분사·살포하는 방법은?

- ① 분무법                      ② 미스트법
- ③ 스프링클러법                      ④ 폼스프레이법

72. 농약의 잔류허용기준을 (MRL)을 결정하는 요소가 아닌 것은?

- ① 최대무작용량(NOEL)                      ② 안전계수
- ③ 농약 살포 횟수                      ④ 1일 섭취허용량(ADI)





73. 재배면적 10ha인 어떤 농지에서 펜티온 유제 50%fmf 1000배로 희석하여 10a당 8말의 살포량으로 방제하려고 한다. 펜티온 유제는 500mL 단위로 몇 병을 구입해야 하는가? (단, 1말은 18L이다)

- ① 21병                      ② 25병
- ③ 29병                      ④ 35병

74. 조제 직후 보르도액의 구리의 용해도가 0에 가까울 때의 pH는?

- ① pH 12.4                      ② pH 11.3
- ③ pH 10.4                      ④ pH 9.3

75. Ziram의 구조식은?



76. 농약의 살포방법 중 살포액의 농도가 높고 정밀한 액적조절 살포가 필요한 살포방법은?

- ① 분입제 살포                      ② 공중액제 살포
- ③ 입제 살포                      ④ 수면 시용

77. 헤테로옥신이라고도 하며 무색 바늘 모양의 결정으로 과수, 화초 등의 삼목 때 발근촉진제로 사용될 수 있는 것은?

- ① 포스톤                      ② 지베렐린
- ③ β-인돌초산                      ④ 카시네린

78. 액상시용제의 물리적 특성으로만 나열된 것은?

- ① 유화성과 토분성                      ② 수화성과 비산성
- ③ 습전성과 현수성                      ④ 분산성과 부착성

79. 약해(藥害)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 약해란 농약에 의해서 식물의 정상적인 생육을 저해하는 것이다.
- ② 약해라고 해서 전부 작물의 수확에 영향을 끼치는 것은 아니고, 환경조건에 따라 회복되는 일시적 약해도 있다.
- ③ 살충제의 약해발생은 유기인계 계통이 많다.
- ④ 만성적인 약해는 약제를 살포한지 1주일 이내에 나타난다.

80. 제초제 DCMUwp(Diuron)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 요소계 제초제이다.
- ② 토양처리효과가 크다.
- ③ 포유동물에 대한 독성은 낮다.
- ④ 호르몬형의 접촉형 제초제이다.

#### 5과목 : 잡초방제학

81. 잡초 종자의 휴면타파 및 발아율을 촉진시키는 생장조절 물질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사이토키닌                      ② 에틸렌
- ③ 지베렐린                      ④ MH

82. 다음 중 바랭이는 형태적 분류상 어디에 속하는가?

- ① 광엽 잡초                      ② 화본과 잡초  
③ 방동사니과 잡초              ④ 국화과 잡초

83. 다음 중 식물간 상호작용에서 기생에 해당하는 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 콩의 뿌리혹박테리아  
② 콩밭 잡초 새삼  
③ 나무껍질에 붙어있는 지의류  
④ 목초지에서 두과와 화본과 식물

84. 일정기간 이내에 대부분 종자가 발아를 마치는 집중발아 습성을 무엇이라고 하는가?

- ① 발아 준동시성                  ② 발아 계절성  
③ 발아 기회성                    ④ 발아 내성

85. 다음 중 광발아 종자에서 적색광과 적외선광을 교체하여 조사하였을 때 종자가 가장 발아가 되지 않는 것은?

- ① 적외선광 조사→적색광 조사  
② 적색광 조사→적외선광 조사  
③ 적색광 조사→적외선광 조사→적색광 조사  
④ 적외선광 조사→적외선광 조사→적색광 조사

86. 종자에 낙하선과 같은 긴 털을 가지거나 솜털과 같은 것으로 덮여서 바람에 잘 날리는 잡초로 가장 옳은 것은?

- ① 도꼬마리                      ② 소리쟁이  
③ 메거리                        ④ 민들레

87. 다음 중 노토양 표토에 주로 지하경을 형성하는 다년생 잡초로 가장 옳은 것은?

- ① 깨풀                            ② 쇠비름  
③ 올미                            ④ 명아주

88. 멀칭용 플라스틱 필름에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 흑색필름은 잡초의 발생을 줄인다.  
② 녹색필름은 지온상승의 효과가 크다.  
③ 흑색필름은 지온이 높을 때 지온을 낮추어 준다.  
④ 투명필름은 잡초 발생을 크게 줄인다.

89. 다음 중 여름잡초로만 나열된 것은?

- ① 벼룩나물, 바랭이              ② 피, 쇠비름  
③ 별꽃, 속속이풀                ④ 피, 냉이

90. 잡초의 발아습성 중 발아기회성에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 일장에 감응하여 발아하게 되는 특성  
② 온도조건에 감응하여 발아하게 되는 특성  
③ 일정한 간격을 가지고 최고의 발아율을 나타내는 특성  
④ 오랜 기간에 걸쳐 지속적으로 발아하게 되는 특성

91. 화본과잡초와 사초과잡초의 차이점에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 화본과잡초는 줄기가 삼각형인 반면, 사초과잡초는 줄기가 둥글다.

② 화본과잡초는 속이 차 있는 반면, 사초과잡초는 속이 비어있다.

③ 화본과잡초는 마디가 있는 반면, 사초과잡초는 마디가 없다.

④ 화본과잡초는 엽초와 엽신이 뚜렷하지 않은 반면, 사초과잡초는 엽초와 엽신이 뚜렷하다.

92. 생태적 잡초방제 중 경합 특성을 이용한 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작부체계 관리                  ② 관개수로 관리  
③ 육묘(이식) 재배 관리          ④ 재식밀도 관리

93. 다음 중 우리나라 과수원에서 발생하는 잡초종으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 바랭이                          ② 매자기  
③ 강아지풀                        ④ 닭의장풀

94. 다음 중 작물과 잡초가 경합하고 있을 때 작물 수량 손실이 가장 높은 경우는?

- ① C<sub>3</sub> 작물과 C<sub>4</sub> 잡초              ② C<sub>3</sub> 작물과 C<sub>3</sub> 잡초  
③ C<sub>4</sub> 작물과 C<sub>3</sub> 잡초              ④ C<sub>4</sub> 작물과 C<sub>4</sub> 잡초

95. 잡초의 식물학적 분류로 세분되는 순서로 가장 옳은 것은?

- ① 계→문→과→강→목→속→종  
② 계→문→강→목→과→속→종  
③ 속→계→문→과→강→목→종  
④ 강→속→계→문→과→목→종

96. 잡초가 종내 변이를 일으키는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 돌연변이 발생                  ② 시비량의 변화  
③ 자연교잡                        ④ 잡초의 생리적 형질 변화

97. 논에서 사초과인 올방개를 방제하기 위하여 사용하는 후기 경엽처리 제초제로 가장 적절한 것은?

- ① 알라클로르 입제              ② 옥사디아존 유제  
③ 디티오피르 유제              ④ 벤타존 액제

98. 다음 중 부유성 잡초로만 나열된 것은?

- ① 너동방동사니, 별꽃              ② 올미, 토끼풀  
③ 개구리밥, 부레옥잠              ④ 깨풀, 망초

99. 다음 중 암조건에서도 발아가 가장 잘 되는 것은?

- ① 참방동사니                      ② 개비름  
③ 독말풀                        ④ 소리쟁이

100. 다음 중 화본과 잡초로 가장 옳은 것은?

- ① 나도겨풀                        ② 물달개비  
③ 발뚝외풀                        ④ 올미

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ③  | ②  | ④  | ④  | ④  | ①  | ④  | ③  | ②  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ②  | ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  | ①  | ④  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ①  | ①  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ③  | ①   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  | ②  | ④   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ②  | ④  | ③  | ④  | ①  | ④  | ②  | ①  | ②  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ②  | ①  | ②  | ②  | ④  | ③  | ①  | ①  | ①  | ④   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①  | ②   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ③  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  | ③  | ④  | ④   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ②  | ②  | ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ②  | ②   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③  | ②  | ②  | ①  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  | ①   |