

1과목 : 토양학

1. 간척지 토양의 특성을 설명한 것이 아닌 것은?

- ① 알칼리성 토양이다.
- ② 유기물함량이 일반 논에 비해 낮다.
- ③ 염분농도가 낮다.
- ④ 비전도도가 매우 높다.

2. 높이 5cm, 내경 4cm인 금속 실린더를 양토(loam)에 박은 후 이를 채취하여 오븐에서 건조시킨 후 무게를 재니 80g이었다. 이 토양의 전용적밀도(bulk density)는 얼마인가?(단, 원 주율은 3으로 계산)

- ① 2.66 Mg/m³ ② 0.33 Mg/m³
- ③ 1.33 Mg/m³ ④ 1.00 Mg/m³

3. 우리나라의 토양 침식 작용이 많은 지역이나, 공사로 인해 생성되는 절개지에 주로 나타나는 토양의 목(order)은 다음 어디에 해당하는가?

- ① Entisols ② Mollisols
- ③ Spodosols ④ Andisols

4. 형태학적 토양분류체계(Soil taxonomy)에는 12가지 명칭의 목(Order)이 있다. 토양 목의 명칭이 아닌 것은?

- ① Entisol ② Mollisol
- ③ Oxisol ④ Latosol

5. 미생물이 고등식물에 끼치는 유해 작용이 아닌 것은?

- ① 질산염의 환원과 탈질작용
- ② 황산염의 환원
- ③ 고등식물과 미생물과의 양분 경쟁
- ④ 미생물간의 길항작용

6. 다음 식물체 중 탄질물(C/N율)이 가장 큰 것은?

- ① 감자 ② 알팔파
- ③ 완두 ④ 밀짚

7. 다음 모재 중 다른 셋과 생성기작이 다른 것은?

- ① 충적토(alluvial) ② 봉적토(colluvial)
- ③ 해성토(marine) ④ 호성토(lacustrine)

8. 부식의 기능으로 적합하지 않은 것은?

- ① 부식은 물을 흡수하는 힘이 크다.
- ② 부식은 토양미생물의 활동을 활발하게 한다.
- ③ 부식은 양이온치환능력이 점토에 비하면 적은편이다.
- ④ 부식은 토양의 입단화를 촉진시킨다.

9. 다음 중 토양양분의 유효도에 가장 영향을 적게 주는 요인은?

- ① 토양의 pH ② 토양의 산화환원전위
- ③ 토양 양분함량 ④ 경지정리상태

10. 검토장(soil auger)의 가장 적합한 용도는 무엇인가?

- ① 토양시료 채취기 ② 토양인산 검출기
- ③ 토양수분 측정기 ④ 토양산도 측정 키트(kit)

11. 무기질 토양이 산성으로 될 때 주된 역할을 하며, 토양에 함유되어 있는 금속원소로서 토양반응을 산성으로 기울게 하는 것은?

- ① 칼슘(Ca) ② 수소(H)
- ③ 알루미늄(Al) ④ 망간(Mn)

12. 다음 중 토양으로부터 가장 쉽게 탈착되는 이온은?

- ① H⁺ ② NH₄⁺
- ③ Mg²⁺ ④ Ca²⁺

13. 토양의 풍화작용 중 화학적 풍화에 해당하지 않는 것은?

- ① 산화작용 ② 가수분해작용
- ③ 수화작용 ④ 온열작용

14. 고상 46%, 액상 25%, 기상 29%로 구성되어 있는 토양이 있다. 이 토양의 공극율(%)은?

- ① 54 ② 46
- ③ 29 ④ 25

15. 면적이 1ha인 밭토양에서 작토층 두께 20cm의 전체 토양질량을 건조상태에서 계산하면? (단, 건조상태 토양의 용적밀도:1.35 Mg/m³, Mg:mega gram)

- ① 2.7 × 10³ Mg ② 1.35 × 10³ Mg
- ③ 2.7 × 10²Mg ④ 1.35 × 10²Mg

16. 토양의 투수력에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토양입자 ② 유기물함량
- ③ 토심 ④ 규산함량

17. 토양 중에 서식하는 조류(algae)에 대한 설명이다. 관계가 가장 먼 것은?

- ① 단세포로 되어 있다.
- ② 엽록소를 지니고 있다.
- ③ 세균과 공존하면서 유기물을 공급한다.
- ④ 공중질소를 고정할 수 없다.

18. 토양의 탄질물(C/N비)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일 기온하에서 건조지방이 습윤지방보다 크다.
- ② 일반적으로 경작지 토양에서는 표토가 심토보다 크다.
- ③ 유기물 분해과정에서 질소는 미생물, 리그닌, 점토 등에 의해 보존된다.
- ④ 일반적으로 화분과 작물의 C/N율이 두과작물보다 크다.

19. 추락현상을 나타내는 저위 생산답(논)의 개량방법으로 가장 많이 사용되는 방법은?

- ① 화학비료를 많이 시용할 것
- ② 휴경기에도 항상 담수를 할 것
- ③ 경운을 자주할 것
- ④ 좋은 품질의 객토를 할 것

20. 미사질 양토의 밭 토양에서 식물생육에 가장 좋은 토양의 고상-액상-기상의 비율(%)로 가장 적합한 것은?

- ① 20-40-40 ② 40-30-30
- ③ 50-25-25 ④ 60-35-5

2과목 : 비료학

21. 토양미생물비료 효과를 연구하기 위해서 무처리, 관행구를 포함한 미생물처리량을 다르게 5구간을 두어 2반복으로 시험구를 배치하였다. 시험구의 배치방법은?
 - ① 완전난괴법 ② 완전임의 배치법
 - ③ 라틴방격법 ④ 무계획적인 시험
22. 질소 10kg을 사용하여 재배한 결과, 수확 후 질소 시용구의 작물이 질소를 20kg 흡수하였으며, 무시용구에서는 질소가 16kg이었다면 이 때의 질소 흡수율은?
 - ① 20% ② 40%
 - ③ 50% ④ 60%
23. 다음 중에서 비료시험의 방법이라고 볼 수 없는 것은?
 - ① 난괴법 ② 수경법
 - ③ 사경법 ④ 토경법
24. 시비(施肥)시험의 일환으로 실시하는 적량시험(適量試驗)은?
 - ① 보수점감의 법칙에 준한 증수곡선으로 결정
 - ② 한 작물의 시험 결과로 모든 작물에 적용
 - ③ 지역별 시험을 수행할 필요가 없음
 - ④ 1년 이상 다년 시험이 불필요함
25. 비료시험 중 생육, 수량조사 및 수확물의 분석방법에 대하여 옳지 못한 것은?
 - ① 벼의 조사 시기는 생육초기, 최고분얼기, 유수형성기, 성숙기, 수확기 등의 각 시기별로 실시한다.
 - ② 초장은 지표면에서 가장 높은 잎 혹은 이삭의 끝가지의 길이를 측정한다.
 - ③ 감자, 고구마, 채소류, 과수, 콩 등은 오차가 많지 않으므로 유의성을 10% 이하로 보는 것이 좋다.
 - ④ 수확물의 분석법은 보통 수분, 전질소, 전인산, 전칼륨 등을 통상법에 의하여 정량한다.
26. 용성인비 25kg의 시장가격이 3000원이다. 인산(P_2O_5) 1kg의 가격은 얼마인가?
 - ① 400원 ② 500원
 - ③ 600원 ④ 700원
27. 퇴비의 사용방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 퇴비는 원천적으로 밑거름으로 사용하는 것이 좋다.
 - ② 퇴비를 사용한 후에는 즉시 종자를 파종하거나, 묘를 정식하는 것이 필요하다.
 - ③ 퇴비성분이 고르게 섞이도록 잘 혼합해야 한다.
 - ④ 퇴비사용 후에는 곧 갈아엎어서 양분의 손실을 방지해야 한다.
28. 다음 비료 중 화학적 산성비료이며, 생리적 중성비료는?
 - ① 황산칼리 ② 염화암모늄
 - ③ 칠레초석 ④ 중과인산석회
29. 엽면살포의 이점이 아닌 것은?
 - ① 토양 조건이 나쁜 경우에 유리하다.
 - ② 뿌리가 약화되었을 때 유리하다.
 - ③ 비효가 빨리 나타난다.

- ④ 속효성 무기양분의 사용에 좋다.
30. 비료의 반응에 대한 내용 중 맞지 않는 것은?
 - ① 비료의 화학적 반응이란 비료 수용액 상태의 고유한 반응이다.
 - ② 화학비료의 사용은 토양을 모두 산성화 시킨다.
 - ③ 비료의 생리적 반응이란 토양 중에서 식물에 의한 흡수 작용과 미생물의 작용을 받은 뒤에 나타난 반응이다.
 - ④ 유기질비료는 그 화학적 조성이 복잡하며, 토양중에서 일단 분해되어 가용성으로 변화된 후 식물에 흡수 이용된다.
31. 논토양에서 탈질작용으로 질소가 공기중으로 휘산되는 형태가 아닌 것은?
 - ① NO_3^- ② N_2
 - ③ NO ④ N_2O
32. 다음 중 비료효과의 지속에 의해 분류된 비료는?
 - ① 완효성비료 ② 유기질비료
 - ③ 농후비료 ④ 희박비료
33. 질소순환에 관여하는 주요미생물로 잘못 짝지어진 것은?
 - ① 질화작용 : 아질산균, 질산균
 - ② 질산환원작용 : 유기영양미생물
 - ③ 탈질작용 : 공생질소고정세균, 질산균, 남조류
 - ④ 암모니아화성작용 : 대부분의 유기영양미생물
34. 생물 유체의 유기물 중에서 가장 분해되기 쉬운 물질은?
 - ① 납질(蠟質) ② 단백질(蛋白質)
 - ③ 수지류(樹脂類) ④ 리그닌(lignin)
35. 토양에서 작물이 흡수하는 원소의 형태로 옳지 않은 것은?
 - ① 질소 : NO_3^- , NH_4^+ ② 황 : S^-
 - ③ 칼슘 : Ca_2^+ ④ 칼륨 : K^+
36. 화성비료인 황인산암모늄(질소 : 17.5%, 인산 : 15.0%) 60kg 중에 함유된 질소 및 인산 성분량은?
 - ① 질소(N) : 10.5kg, 인산(P_2O_5) : 9.0kg
 - ② 질소(N) : 9.5kg, 인산(P_2O_5) : 8.5kg
 - ③ 질소(N) : 9.0kg, 인산(P_2O_5) : 8.0kg
 - ④ 질소(N) : 8.5kg, 인산(P_2O_5) : 7.5kg
37. 다음의 비료 중 노후화답에 시비하여도 작물에 해가 되지 않는 비료는?
 - ① 과인산석회 ② 유안
 - ③ 황산칼리 ④ 요소
38. 다음 중에서 구용성 인산이 가장 많이 들어 있는 인산질비료는?
 - ① 인산암모늄 ② 과인산석회
 - ③ 용성인비 ④ 질산암모늄
39. 다음 표는 비료수용액의 수증기 분압(단위:Hgmm)을 나타낸 것이다. 표를 보고 비료를 흡습성이 큰 것에서 작은 것 순서로 바르게 나열한 것은?

비료명	20℃
질산석회	9,61
질산암모늄	11,10
질산나트륨	13,06
질산칼륨	16,58

- ① 질산석회, 질산암모늄, 질산나트륨, 질산칼륨
② 질산석회, 질산나트륨, 질산칼륨, 질산암모늄
③ 질산암모늄, 질산석회, 질산칼륨, 질산나트륨
④ 질산칼륨, 질산나트륨, 질산암모늄, 질산석회

40. 우리나라의 비료공정규격상 부산물비료에 속하지 않는 것은?

- ① 퇴비 ② 분뇨잔사
③ 커피박 ④ 부엽토

3과목 : 재배학원론

41. 식물호르몬 중 작물의 세포분열을 촉진하며, 잎의 생장촉진, 호흡억제, 엽록소와 단백질의 분해억제, 노화방지 등의 효과가 있는 것은?

- ① 오옥신류(auxins) ② 지베렐린(gibberellin)
③ 사이토키닌(cytokinins) ④ 플로리겐(florigen)

42. 다음 중 춘화처리와 일장처리의 감응부위를 순서대로 바르게 쓰여진 것은?

- ① 성엽, 생장점 ② 줄기, 성엽
③ 뿌리, 생장점 ④ 생장점, 성엽

43. 다음 중 식물과 작물 분류의 기본단위가 순서대로 쓰여진 것은?

- ① 종, 계통 ② 속, 변종
③ 종, 품종 ④ 속, 품종

44. 다음 중 작물생육에 적당하지 않은 토양 수분상태는?

- ① 최대용수량 ② 최소용수량
③ 수분당량 ④ 포장용수량

45. 다음 식물이 영양기관을 이용해서 번식하는 이유로 가장 옳은 것은 ?

- ① 차대에 다양한 변이 발생
- ② 모수의 유전형질을 차대에 계승
- ③ 종자생산이 용이함
- ④ 작업이 간편함

46. 작물 수량을 지배하는 3요소로 가장 적당한 것은?

- ① 유전성, 환경조건, 재배기술
- ② 유전성, 환경조건, 유통시장
- ③ 유전성, 지대, 자본
- ④ 환경조건, 재배기술, 토지자본

47. 다음 중 도복 대책으로 적절하지 않는 것은?

- ① 밀식재배 ② 내도복성 품종 선택
③ 배토 후 답압 ④ 균형시비

48. 다음 중 일반적으로 내습성이 강한 작물의 특성이 아닌 것은?

- ① 피층세포의 직렬 배열 ② 파생 통기조직의 형성
③ 뿌리조직의 목화(木化) ④ 심근성의 근계 형성

49. 가을 감자 재배시 가장 효과적인 휴면타파 방법은 ?

- ① 2 ~ 5ppm 지베렐린 수용액에 30 ~ 60분 처리
- ② 2 ~ 5ppm 지베렐린 수용액에 24시간 처리
- ③ 250 ~ 500ppm 지베렐린 수용액에 60분 처리
- ④ 250 ~ 500ppm 지베렐린 수용액에 24시간 처리

50. 식물의 생장조절제 중에서 과일의 성숙을 촉진하는 것은?

- ① Auxin ② Gibberellin
③ Cytokinin ④ Ethylene

51. 병해충 방제에서 기계적 방제법이 아닌 것은?

- ① 소각 ② 중간기주 식물의 제거
③ 담수 ④ 온도처리

52. 다음 중 가장 낮은 농도에서 피해를 일으키는 대기오염 물질은?

- ① SO₂
② HF
③ PAN
④ O₃

53. 다음 중 요수량(要水量)이 가장 큰 작물은?

- ① 기장 ② 감자
③ 귀리 ④ 호박

54. C/N율(C-N ratio)의 설명으로 가장 바르게 된 것은?

- ① 탄수화물보다 광물질양분이 풍부하면 화성 및 결실이 양호하다.
- ② 탄수화물과 다른 양분이 동시에 풍부하면 화성 및 결실이 양호하다.
- ③ 수분과 질소의 공급이 약간 쇠퇴하고 탄수화물이 풍부해지면 화성 및 결실이 양호하지만 생육은 약간 감소한다.
- ④ C/N율은 화성 유도도의 주요 외적 요인이다.

55. 겨울철 작물의 내동성을 높이는 요인이 아닌 것은?

- ① 지방 함량이 적다.
- ② 당분 함량이 높
- ③ 세포의 수분함량이 낮다.
- ④ 칼슘, 마그네슘 함량이 많다.

56. 다음 벼의 이상적인 초형(Plant type)으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상위엽일수록 직립한다.
- ② 이삭이 지엽 밑에 위치한다.
- ③ 각 잎이 공간적으로 균일하게 분포되어야 한다.
- ④ 엽초가 길어아 한다.

57. 모체의 영양체 일부를 절단하여 적당한 곳에 심어서 뿌리를 내어 번식시키는 것은?

- ① 삽목 ② 분주
③ 취목 ④ 점목

58. 일정한 간격을 두고 종자를 일에서 수립씩 뒤엎뒤엎 파종하는 방식으로 두류, 감자 등과 같이 개체가 평면공간으로 상당히 퍼지는 작물에 적용되는 파종양식은?

- ① 적파 ② 조파
③ 점파 ④ 산파

59. 식물영양에 대한 무기영양설을 주장한 사람은?

- ① Koelreuter ② Mendel
③ Morgan ④ Liebig

60. 다음 중에서 장일성 작물로 짝지어진 것은?

- ① 시금치, 감자, 양파 ② 담배, 들깨, 코스모스
③ 당근, 고추, 토마토 ④ 딸기, 사탕수수, 메밀

4과목 : 분석화학기초

61. 다음 중 가장 강한 산화제는?

- ① $Zn^{+2} + 2e \rightarrow Zn$ ($E^0 = -0.76$ V)
② $Cu^{+2} + 2e \rightarrow Cu$ ($E^0 = +0.34$ V)
③ $Fe^{+2} + 2e \rightarrow Fe$ ($E^0 = +0.44$ V)
④ $Cd^{+2} + 2e \rightarrow Cd$ ($E^0 = -0.40$ V)

62. 4g의 고체 수산화나트륨(NaOH 분자량 = 40g)이 녹아있는 수용액 1.0L의 몰농도(M)는?

- ① 1.0 M ② 0.1 M
③ 0.01 M ④ 10.0 M

63. 다음 각 반응 중 반응용기의 부피를 감소시켰을 때, 평형이 오른쪽으로 이동하는 것은?

- ① $N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrow 2NH_3(g)$
② $H_2(g) + F_2(g) \leftrightarrow 2HF(g)$
③ $PCl_3(g) + 3NH_3(g) \leftrightarrow P(NH_2)_3(g) + 3HCl(g)$
④ $COCl_2(g) \leftrightarrow CO(g) + Cl_2(g)$

64. 다음 중 분광분석법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 원자흡수분광법 ② 형광분석법
③ 광회절분석법 ④ 침전법

65. 당량점과 종말점에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 종말점은 지시약으로 구별한다.
② 종말점은 실험값이다.
③ 당량점과 종말점은 항상 같다.
④ 당량점은 이론적인 값이다.

66. 화학 실험에서 10ml의 용액을 가장 정확하게 취하려면 어느 기구를 사용해야 하는가?

- ① 메스실린더(mess cylinder) ② 피펫(pipette)
③ 스포이드(spoid) ④ 메스플라스크

67. 다음 가운데 망간의 산화수가 +6인 것은?

- ① $MnSO_4$ ② MnO_2
③ $KMnO_4$ ④ K_2MnO_4

68. 반응속도가 느려서 직접 측정할 수 없을 때 과량의 반응시

약을 가하여 반응에 소요되고 남은 부분을 측정하는 방법은?

- ① 직접 측정법 ② 역적정법
③ 치환적정법 ④ 간접적정법

69. 다음 중 햇빛을 쬌거나 구리 조각을 넣으면 적갈색 기체를 발생하는 것은?

- ① 진한 황산 ② 묽은 황산
③ 진한 질산 ④ 묽은 질산

70. 다음 중 일양성자 산으로 알맞은 것은?

- ① H_3PO_4 ② H_2SO_4
③ H_2CO_3 ④ HCl

71. AgCl의 용해도곱상수(K_{sp})가 x일 때 AgCl의 용해도는 얼마인가?

- ① x^2 ② x
③ $\sqrt{x}$ ④ $1/x$

72. 산화-환원 반응에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 산화-환원 반응은 전자가 한 화학종에서 다른 화학종으로 옮겨가는 것을 의미한다.
② 전자를 잃었을 때 산화되었다고 하고, 전자를 얻게되면 환원되었다고 한다.
③ 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신도 산화되는 것을 말한다.
④ 환원제는 다른 물질에게 전자를 주어 환원시키는 물질을 말한다.

73. 0.2M $K_2Cr_2O_7$ 500ml를 조제하려고 한다. 0.25M $K_2Cr_2O_7$ 가 얼마나 필요한가?

- ① 200ml ② 250ml
③ 400ml ④ 150ml

74. 열량, 일 등에 사용되는 줄(J)을 SI 기본단위로 표시하면 다음 어느 것인가?

- ① $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$ ② $m \cdot kg \cdot s^{-2}$
③ $s \cdot A$ ④ 1/s

75. 0.1M-KOH 수용액의 pH는 얼마인가?

- ① 1 ② 6
③ 8 ④ 13

76. Henderson-Hasselbalch 공식을 바르게 나타낸 것은?

- ① $pH = pKa + \log [염기]/[산]$
② $pH = pKa + \log [산]/[염기]$
③ $pKa = pH + \log [염기]/[산]$
④ $pKa = pH + \log [산]/[염기]$

77. 다음 중 1M NaOH를 만드는 과정으로 알맞은 것은?

- ① NaOH 1mol에 해당하는 g수를 칭량하여 잘 녹여서 1L로 맞추었다.
② NaOH 1mol에 해당하는 g수를 칭량하여 물 1L에 잘 녹였다.
③ NaOH 1g을 칭량하여 잘 녹여서 1L로 맞추었다.
④ NaOH 1g을 칭량하여 물 1L에 잘 녹였다.

78. 침전과정에서 침전의 용해도에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?
- ① 침전의 용해도는 용액의 온도를 올리면 감소된다.
 - ② 침전의 용해도는 용액의 온도를 내리면 감소된다.
 - ③ 침전의 용해도는 사용되어지는 용매에 관계없다.
 - ④ 침전의 용해도는 항상 일정하다.
79. 다음 화합물 중에서 페놀프탈레인 용액을 붉게 변화 시킬 수 있는 것은?
- ① K_2CO_3 ② NH_4Cl
 - ③ $CuSO_4$ ④ $NaCl$
80. 1.0×10^{-2} M 수산화나트륨($NaOH$) 용액에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 약전해질인 수산화나트륨이 녹아 있는 수용액이다.
 - ② pOH가 12인 약염기성 용액이다.
 - ③ 염산용액과 반응해서 침전을 생성한다.
 - ④ pH가 12인 염기성 용액이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	④	④	④	②	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	①	①	④	④	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	①	③	③	②	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	②	②	①	④	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	①	②	①	①	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	③	①	④	①	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	④	③	②	④	②	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	①	④	①	①	②	①	④