

1과목 : 제조이론

1. 케이크의 배합에서 고율배합이 저율배합에 비하여 높거나 많은 항목은?

- ① 믹싱 중 공기혼입 정도 ② 비중
③ 화학팽창의 양 ④ 굽는 온도

2. 과일 파이의 충전물을 만들 때 주스에 대한 전분의 사용량으로 가장 적당한 것은?

- ① 1-2% ② 6-8%
③ 12-14% ④ 17-19%

3. 다음 보기의 조건에서 계산된 물 온도는?

- 반죽희망온도 : 23℃	- 밀가루 온도 : 25℃
- 실내온도 : 25℃	- 설탕온도 : 25℃
- 쇼트닝온도 : 20℃	- 계란 온도 : 20℃
- 수돗물 온도 : 20℃	- 마찰계수 : 20

- ① 3℃ ② 8℃
③ 12℃ ④ 20℃

4. 일반 파운드 케이크와 비교할 때 마블 파운드 케이크에 들어가는 재료는?

- ① 코코아 ② 버터
③ 밀가루 ④ 계란

5. 다음 제품 중 일반적으로 비중이 가장 낮은 것은?

- ① 파운드 케이크 ② 레이어 케이크
③ 스펀지 케이크 ④ 과일 케이크

6. 케이크 반죽의 pH가 적정 범위를 벗어나 너무 알칼리 쪽에 있는 경우의 제품은?

- ① 부피가 작다. ② 향이 약하다.
③ 겹질색이 여리다. ④ 기공이 거칠다.

7. 비스킷을 제조할 때 유지보다 설탕을 많이 사용하면 어떤 결과가 오는가?

- ① 제품의 촉감이 단단해진다.
② 제품이 부드러워진다.
③ 제품의 퍼짐이 작아진다.
④ 제품의 색깔이 옅어진다.

8. 쿠키의 퍼짐이 나빠지는 경우에 대한 설명 중 틀리는 것은?

- ① 높은 오븐 온도 ② 과도한 믹싱
③ 입자가 고운 설탕사용 ④ 반죽이 알칼리성

9. 분할무게 50g짜리 도넛을 190℃의 튀김기름에서 튀겨 좋은 제품이 되었다면 분할무게 60g짜리 도넛 반죽은 몇 도에서 튀기는 것이 가장 좋은가?

- ① 160℃ ② 185℃
③ 195℃ ④ 200℃ 이상

10. 과일케이크를 만들 때 과일이 가라앉는 이유에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강도(强度)가 약한 밀가루의 사용

- ② 믹싱이 지나치고 큰 공기방울이 반죽에 남는 경우
③ 진한 속색을 위한 탄산수소나트륨의 과다 사용
④ 시럽에 당근 과일의 시럽을 배수시켜 사용

11. 무스 케이크 제조시 수분에 대한 젤라틴의 사용 비율로 알맞은 것은?

- ① 2% ② 5%
③ 8% ④ 12%

12. 다음 중 반죽의 희망 결과온도가 가장 낮은 제품은?

- ① 슈 ② 카스테라
③ 퍼프 페이스트리 ④ 소프트 롤 케이크

13. 제과·제빵, 아이스크림 등에 널리 사용되는 바닐라에 대한 설명 중 맞지 않은 것은?

- ① 바닐라 향은 조화된 향미를 가지므로 식품의 기본향으로 널리 이용된다.
② 바닐라는 열대지방 원산지로 바닐라 빈을 발효 건조시킨 것이다.
③ 바닐라 에센스는 수용성 제품에 사용한다.
④ 바닐라는 안정제의 역할을 한다.

14. 소프트 롤 케이크를 구운 후 즉시 팬에서 꺼내는 이유로 알맞지 않은 것은?

- ① 찢득거리는 것을 방지하기 위해
② 수축방지를 위해
③ 냄새제거를 위해
④ 표면이 터지지 않게 하기 위해

15. 케이크의 노화 지연 방법이 아닌 것은?

- ① 정확한 공정을 지킨다.
② 신선한 재료를 사용한다.
③ 제품을 4~10℃에서 보관한다.
④ 제품을 실온에서 보관한다.

16. 반죽을 스펀지법으로 만들었다. 도우(Dough) 반죽에서 이스트를 소맥분량의 0.5%를 추가하고자 한다. 이때 추가 할 이스트의 양은? (반죽 총량 160kg, 소맥분은 반죽 총량의 60%)

- ① 0.48 kg ② 0.52 kg
③ 0.60 kg ④ 0.66 kg

17. 다음 제품 중 반죽을 가장 많이 발전시키는 것은?

- ① 불란서빵 ② 햄버거빵
③ 과자빵 ④ 식빵

18. 식빵의 1차 발효실의 온도는?

- ① 24℃ ② 27℃
③ 34℃ ④ 37℃

19. 총 배합율 180%인 식빵을 제조하는데 밀가루 22kg을 사용하였더니 분할무게 600g짜리 65개가 되었다. 이제품의 발효손실은 얼마로 보는가?

- ① 0.52% ② 1.52%
③ 2.02% ④ 2.52%

20. 표준 스펀지의 1차 발효 시간은?

- ① 1~2시간 ② 3~4시간
③ 5~6시간 ④ 7~8시간

2과목 : 재료과학

21. 빵을 구울 때 오븐스프링(오븐팽창)이 일어나는 현상과 관계가 적은 것은?

- ① 가스압이 증가한다.
② 탄산가스의 용해도가 감소한다.
③ 알코올의 휘발로 증기압이 생긴다.
④ 캐러멜화가 일어나 겹질의 신장성을 증가시킨다.

22. 다음 제품 중 반죽이 가장 진 것은?

- ① 식빵 ② 불란서빵
③ 잉글리쉬 머핀 ④ 과자빵

23. 일반 제품의 메이크업(Make up)과정 중 작업실의 온도 및 습도가 맞는 것은?

- ① 온도 25~28℃, 습도 65~70%
② 온도 10~18℃, 습도 65~70%
③ 온도 25~28℃, 습도 80~85%
④ 온도 10~18℃, 습도 80~85%

24. 발효빵의 제조 공정에서 주요 요소는?

- ① 선별, 발효, 굽기 ② 배합, 시간, 발효
③ 재료, 발효, 정형 ④ 배합, 중간발효, 온도

25. 스펀지 발효에 생기는 결함을 없애기 위하여 만들어진 제조법으로 ADMI법이라고 불리는 제빵법은?

- ① 액체 발효법(brew method)
② 비상 반죽법(emergency dough method)
③ 노타임 반죽법(no time dough method)
④ 스펀지법(sponge & dough method)

26. 이형유에 관한 설명 중 옳바르지 않은 것은?

- ① 틀을 실리콘으로 코팅하면 이형유 사용을 줄일 수 있다.
② 이형유는 발연점이 높은 기름을 사용한다.
③ 이형유 사용량은 반죽무게에 대하여 0.1 - 0.2% 정도이다.
④ 이형유 사용량이 많으면 밀 겹질이 얇아지고 색상이 밝아진다.

27. 다음 제품 중 2차 발효실의 습도를 가장 높게 설정해야 되는 것은?

- ① 호밀빵 ② 햄버거빵
③ 불란서빵 ④ 빵도넛

28. 계란의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 계란 노른자의 색은 플라보노이드 색이다.
② 계란 노른자의 고형분 함량은 50% 정도이다.
③ 신선한 계란 흰자의 pH는 보통 6.0~7.7정도이다.
④ 계란 흰자의 수분은 85~88% 정도이다.

29. 식빵의 굽기 후 포장온도로 가장 적합한 것은?

- ① 25~30℃ ② 35~40℃
③ 42~47℃ ④ 50~55℃

30. 빵의 밑바닥이 움푹 들어가는 이유가 아닌 것은?

- ① 뜨거운 팬의 사용 ② 반죽이 질었다.
③ 팬의 기름칠 과다 ④ 2차 발효실의 습도가 높음

3과목 : 영양학

31. 전분이 호화됨에 따라 다음과 같은 성질에 변화가 생긴다. 그 이유로 타당치 않는 것은?

- ① 팽윤에 의한 부피팽창 ② 방향 부동성의 손실
③ 용해현상의 감소 ④ 점도의 증가

32. 다음 글리세린에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시럽과 같은 액체로 물보다 가볍다.
② 물과 잘 혼합한다.
③ 수분의 보유제로 응용된다.
④ 케이크 제품의 색과 향을 보존해 준다.

33. 밀가루에 함유된 회분이 의미하는 것이 아닌 것은?

- ① 광물질은 껍질에 많다.
② 정제 정도를 알 수 있다.
③ 강력분은 박력분보다 회분함량이 높다.
④ 제빵 특성을 대변한다.

34. 상대적 감미도가 순서대로 나열된 것은?

- ① 과당 > 전화당 > 설탕 > 포도당 > 맥아당 > 유당
② 설탕 > 과당 > 전화당 > 포도당 > 유당 > 맥아당
③ 유당 > 설탕 > 포도당 > 맥아당 > 과당 > 전화당
④ 전화당 > 설탕 > 포도당 > 과당 > 맥아당 > 유당

35. 전란의 고형질은 일반적으로 약 몇 % 인가?

- ① 12% ② 25%
③ 75% ④ 88%

36. 코코아 20%에 상당하는 초콜릿 양은?

- ① 16% ② 32%
③ 48% ④ 64%

37. 동물의 결합조직에 존재하는 단백질로 콜라겐을 부분적으로 가수분해하여 얻어지는 유도 단백질은?

- ① 알부민 ② 한천
③ 젤라틴 ④ 트레오닌

38. 100g의 밀가루에서 얻은 젖은 글루텐이 39g이 되었을 때 이 밀가루의 단백질 함량은?

- ① 2% ② 8%
③ 13% ④ 19%

39. 제빵에서 당의 중요한 기능은?

- ① 겹질색을 낸다. ② 글루텐을 질기게 한다.

- ③ 완충 작용을 한다. ④ 유화 작용을 한다.
40. 빵에서 탈지분유의 역할 중 틀린 것은?
 ① 흡수율 감소 ② 조직개선
 ③ 완충제 역할 ④ 진한 껍질색
41. 제빵시 사용하는 이스트의 주요 기능과 거리가 먼 것은?
 ① 산소발생 ② 팽창작용
 ③ 향미부여 ④ 발효조절
42. 영구적 경수(세물)를 사용 시 취해야 할 조치로 틀린 것은?
 ① 소금 증가 ② 효소 강화
 ③ 이스트 증가 ④ 광물질 이스트푸드의 감소
43. 반죽조절제와 이스트의 영양소가 함께 들어 있는 것은?
 ① 이스트 ② 제빵용 이스트푸드
 ③ 영양 강화제 ④ 펜토산
44. 맥아에는 아밀라아제가 풍부하게 들어 있어 식혜나 맥아엿 또는 맥주를 만드는데 사용된다. 이 같은 맥아를 만드는데 주로 사용되는 곡류는?
 ① 보리 ② 쌀
 ③ 밀 ④ 콩
45. 유지에 가소성을 주는 지방 결정체는 자연계에서 여러 가지 형태를 이루고 있는데 다음 중 융점이 가장 높은 형태는?
 ① 알파(α)형 ② 베타(β)형
 ③ 베타프라임(β')형 ④ 감마(γ)형
46. 필수지방산을 가장 많이 함유하고 있는 식품은?
 ① 달걀 ② 식물성 유지
 ③ 마가린 ④ 버터
47. 유당이 가수분해 되면 무엇이 생성되는가?
 ① 과당+포도당 ② 포도당+맥아당
 ③ 과당+갈락토오스 ④ 갈락토오스+포도당
48. 다음 중 연결이 잘못된 것은?
 ① 난백 -알부민 ② 밀-글리아딘
 ③ 옥수수 -제인 ④ 혈액 -케라틴
49. 무기질의 영양상 기능이 아닌 것은?
 ① 우리 몸의 경조직 성분이다.
 ② 열량을 내는 열량 급원이다.
 ③ 효소의 기능을 촉진시킨다.
 ④ 세포간의 삼투압 평형유지 작용을 한다.
50. 열량 섭취량을 2500 kcal 내외로 했을 때 이상적인 1일 지방 섭취량은?
 ① 약10-20g ② 약40-50g
 ③ 약70-80g ④ 약90-100g

4과목 : 식품위생학

51. 다음 세균 중 부패세균이 아닌 것은?

- ① 어위니아균(*Erwinia*)
 ② 슈도모나스균(*Pseudomonas*)
 ③ 고초균(*Bacillus subtilis*)
 ④ 티포이드균(*Salmonella typhi*)
52. 아플라톡신을 생산하는 미생물은?
 ① 효모 ② 세균
 ③ 바이러스 ④ 곰팡이
53. 다음 중 경구 전염병이 아닌 것은?
 ① 콜레라 ② 이질
 ③ 발진티푸스 ④ 유행성 간염
54. 이타이이타이병(Itai-itai Disease)의원인 물질은?
 ① 수은(Hg) ② 납(Pb)
 ③ 비소(As) ④ 카드뮴(Cd)
55. 정제가 불충분한 면실유에 들어 있을 수 있는 독성분은?
 ① 듀린(Dhurrin)
 ② 테무린(Temuline)
 ③ 고시폴(Gossypol)
 ④ 브랙큰 편독신(Bracken Fern Toxin)
56. 과산화수소의 주 사용 목적은?
 ① 보존료 ② 표백제
 ③ 살균료 ④ 산화방지제
57. 결핵의 특히 중요한 감염원이 될 수 있는 것은?
 ① 토끼고기 ② 양고기
 ③ 돼지고기 ④ 불완전 살균우유
58. 식중독 발생시의 조치 사항 중 잘못된 것은?
 ① 환자의 상태를 메모한다.
 ② 보건소에 신고한다.
 ③ 식중독 의심이 있는 환자는 의사의 진단을 받게 한다.
 ④ 먹던 음식물은 전부 버린다.
59. 세균의 오염 경로가 될 수 없는 환경은?
 ① 상수도가 공급되지 않는 지역에서의 세척수나 음료수
 ② 습도가 낮은 지역에서 냉동 보관 중인 식품
 ③ 어항이나 포구 주변에서 잡은 물고기
 ④ 분뇨처리가 미비한 농촌지역의 채소나 열매
60. 식품첨가물의 규격과 사용기준은 누가 지정하는가?
 ① 식품의약품안전청장 ② 국립보건원장
 ③ 시·도 보건연구소장 ④ 시·군 보건소장

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	①	③	④	①	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	③	①	②	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	①	④	②	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	①	②	②	③	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	①	②	②	④	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	③	②	④	④	②	①