

1과목 : 제조이론

1. 옐로 레이어 케이크에서 전란 사용량이 55%일 때 쇼트닝 사용량으로 적정한 것은?
 ① 30% ② 50%
 ③ 70% ④ 90%
2. 과자 반죽 믹싱법 중에서 크림법은 어떤 재료를 먼저 믹싱하는 방법인가?
 ① 설탕과 쇼트닝 ② 밀가루와 설탕
 ③ 계란과 설탕 ④ 계란과 쇼트닝
3. 다음 제품 중 반죽의 비중이 가장 낮은 것은?
 ① 파운드 케이크 ② 옐로 레이어 케이크
 ③ 초콜릿 케이크 ④ 버터 스펀지 케이크
4. 퍼프 페이스트리(puff pastry) 제조시 굽기과정에서 부풀어 오르지 않는 이유로 틀린 것은?
 ① 밀가루의 사용량이 증가되었다.
 ② 오븐이 너무 차다.
 ③ 반죽이 너무 차다.
 ④ 품질이 나쁜 계란이 많이 사용되었다.
5. 도넛 글레이즈의 사용온도로 가장 적당한 것은?
 ① 49℃ ② 39℃
 ③ 29℃ ④ 19℃
6. 파이를 만들 때 충전물이 끓어 넘쳤다. 그 원인으로 틀린 것은?
 ① 배합이 적합하지 않았다.
 ② 충전물의 온도가 낮았다.
 ③ 바닥 껍질이 너무 얇다.
 ④ 껍질에 구멍이 없다.
7. 방과자를 성형한 후 물을 뿌려주는 이유가 아닌 것은?
 ① 덧가루의 제거 ② 소성 후 철판에서 잘 떨어짐
 ③ 껍질색의 균일화 ④ 껍질의 터짐방지
8. 파운드 케이크를 구운 직후 계란 노른자에 설탕을 넣어 칠하는 방법이 있다. 이 때 설탕의 역할이 아닌 것은?
 ① 광택제 효과 ② 보존기간 개선
 ③ 탈색 효과 ④ 맛의 개선
9. 다음 설명 중 저울배합에 대한 고울배합의 상대적 비교로 틀린 것은?
 ① 고울배합은 믹싱 중 공기 혼입이 적은 편이다.
 ② 고울배합의 비중은 낮아진다.
 ③ 고울배합에는 화학팽창제의 사용량을 감소한다.
 ④ 고울배합의 제품은 상대적으로 낮은 온도에서 오래 굽는다.
10. 슈 바닥 껍질 가운데가 위로 올라가는 이유 중 틀리게 설명한 것은?
 ① 오븐 바닥온도가 너무 강하다.
 ② 굽기 초기에 수분을 많이 잃었다.

③ 팬에 기름칠을 너무 많이 했다.

④ 표피가 거북이 등처럼 되고 색깔이 날 때 밀불을 낮추어서 굽는다.

11. 다음 제법 중 비교적 스크래핑을 가장 많이 해야하는 제법은?
 ① 공립법 ② 별립법
 ③ 설탕/물법 ④ 크림법
12. 다음 중 반죽의 희망 결과온도가 가장 낮은 제품은?
 ① 슈 ② 카스테라
 ③ 퍼프 페이스트리 ④ 소프트 롤 케이크
13. 케이크 도넛에 대두분을 사용하는 목적이 아닌 것은?
 ① 흡유율 증가 ② 껍질 구조 강화
 ③ 껍질색 개선 ④ 식감의 개선
14. 스펀지 케이크의 반죽 1g당 팽용적(cm³)은 얼마인가?
 ① 2.40 ② 2.96
 ③ 4.71 ④ 5.08
15. 스펀지 케이크 제조시 계란의 사용량을 줄이려고 한다. 옳지 않은 것은?
 ① 물을 조금 더 사용한다.
 ② 유화제를 더 쓴다.
 ③ 설탕사용량을 줄인다.
 ④ 베이킹 파우더 사용량을 늘린다.
16. 빵을 믹싱할 때 반죽이 최대의 탄력성을 갖는 믹싱 단계는?
 ① 픽업 단계 ② 발전 단계
 ③ 최종 단계 ④ 파괴 단계
17. 냉각시킨 식빵의 가장 일반적인 수분함량은?
 ① 약 18% ② 약 28%
 ③ 약 38% ④ 약 48%
18. 빵의 노화가 가장 빠른 온도는?
 ① -18℃ ② 5℃
 ③ 20℃ ④ 30℃
19. 비상스트레이법 반죽의 가장 적당한 온도는?
 ① 20℃ ② 25℃
 ③ 30℃ ④ 45℃
20. 제빵시 적량보다 많은 분유를 사용했을 때의 결과 중 잘못된 것은?
 ① 양옆면과 바닥이 움푹 들어가는 현상이 생김
 ② 껍질색은 캐러멜화에 의하여 검어짐
 ③ 모서리가 예리하고 터지거나 슈레드가 적음
 ④ 세포벽이 두꺼우므로 황갈색을 나타냄

2과목 : 재료과학

21. 분할기에 의한 기계식 분할시 분할의 기준이 되는 것은?
 ① 무게 ② 모양

③ 배합율

④ 부피

22. 제품을 생산하는데 생산 원가요소는?

- ① 재료비, 노무비, 경비
- ② 재료비, 용역비, 감가상각비
- ③ 판매비, 노동비, 월급
- ④ 광열비, 월급, 생산비

23. 빵이 팽창하는 원인이 아닌 것은?

- ① 이스트에 의한 발효 활동 생성물에 의한 팽창
- ② 이스트나 설탕, 달걀 등의 거품에 의한 팽창
- ③ 탄산가스, 알콜, 수증기에 의한 팽창
- ④ 글루텐의 공기 포집에 의한 팽창

24. 우유의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유지방 함량은 보통 3~4% 정도이다.
- ② 당으로는 글루코오스(glucose)가 가장 많이 존재 한다.
- ③ 주요 단백질은 카제인(casein)이다.
- ④ 우유의 비중은 평균 1.032이다.

25. 다음 중 올바른 팬닝요령이 아닌 것은?

- ① 반죽의 이음매가 틀의 바닥으로 놓이게 한다.
- ② 철판의 온도를 60℃로 맞춘다.
- ③ 반죽은 적정 분할량을 넣는다.
- ④ 비용적의 단위는 cm^3/g 이다.

26. 굽기 공정에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전분의 호화가 일어난다.
- ② 빵의 옆면에 슈레드가 형성되는 것을 억제한다.
- ③ 이스트는 사멸되기 전까지 부피팽창에 기여한다.
- ④ 굽기 과정 중 당류의 캐러멜화가 일어난다.

27. 일반적으로 작은 규모의 제과점에서 사용하는 믹서는?

- ① 수직형 믹서 ② 수평형 믹서
- ③ 초고속 믹서 ④ 커터 믹서

28. 2차발효에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 2차 발효실 온도는 33~45℃이다.
- ② 2차발효실의 상대습도는 70~90%이다.
- ③ 2차발효시간이 경과함에 따라 pH는 5.13에서 5.49로 상승한다.
- ④ 2차발효실 온도가 너무 낮으면 발효시간은 길어지고 빵 속의 조직이 거칠게 된다.

29. 빵의 제품평가에서 브레이크와 슈레드 부족현상의 이유가 아닌 것은?

- ① 발효시간이 짧거나 길었다.
- ② 오븐의 온도가 높았다.
- ③ 2차 발효실의 습도가 낮았다.
- ④ 오븐의 증기가 너무 많았다.

30. 냉동반죽의 해동방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 실온해동
- ② 온수해동

③ 리타더(retard)해동

④ 도우 컨디셔너(dough conditioner)

3과목 : 영양학

31. 제과용 밀가루 제조에 사용되는 밀로 가장 좋은 것은?

- ① 경질동맥 ② 경질춘맥
- ③ 연질동맥 ④ 연질춘맥

32. 버터를 쇼트닝으로 대체할 때 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 유지고형질 ② 수분
- ③ 소금 ④ 유당

33. 어떤 케이크 제조에 1kg의 달걀이 필요하다면 껍질을 포함한 평균 무게가 60g인 달걀은 약 몇 개가 필요한가?

- ① 15개 ② 19개
- ③ 23개 ④ 27개

34. 전분의 노화에 대한 설명 중 틀리는 것은?

- ① 일반적으로 냉장 온도에서 노화가 빨리 일어난다.
- ② 노화의 원인 중에는 습도의 변화도 포함된다.
- ③ 노화된 전분은 소화가 잘된다.
- ④ 노화란 α -전분이 β -전분으로 되는 것이다.

35. 지방의 산패를 촉진하는 인자와 거리가 먼 것은?

- ① 질소의 존재 ② 산소의 존재
- ③ 동물의 존재 ④ 자외선의 존재

36. 글루텐을 약화하는 것이 아닌 것은?

- ① 환원제 ② 소금
- ③ 단백질 분해효소 ④ 지나친 발효

37. 식빵에서 설탕의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반죽시간 단축 ② 이스트의 영양공급
- ③ 껍질색 개선 ④ 수분 보유제

38. 우유 단백질의 응고에 관여하지 않는 것은?

- ① 산 ② 레닌
- ③ 가열 ④ 리파아제

39. 제빵시 생이스트(효모) 첨가에 가장 적당한 물의 온도는?

- ① 10℃ ② 20℃
- ③ 30℃ ④ 50℃

40. 제빵시 소금 사용량이 적량보다 많으면 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 부피가 적다. ② 세포벽이 얇다.
- ③ 껍질색이 검다. ④ 발효손실이 적다.

41. 반죽조절제와 이스트의 영양소가 함께 들어 있는 것은?

- ① 이스트 ② 제빵용 이스트푸드
- ③ 영양 강화제 ④ 펜토산

42. 아밀로그래프에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 산화제와 발효시간의 관계 이해
 ② 맥아의 액화효과 측정
 ③ 알파 아밀라아제의 활성 측정
 ④ 보통 제빵용 밀가루는 약 400 - 600 B.U.
43. 다음 밀가루 중 스파게티나 마카로니를 만드는데 주로 사용되는 것은?
 ① 강력분 ② 중력분
 ③ 박력분 ④ 듀럼밀분
44. 밀알을 껍질 부위, 배아 부위, 배유 부위로 분류할 때 배유에 대한 설명으로 틀리는 것은?
 ① 밀알의 대부분으로 무게비로 약 83%를 차지한다.
 ② 전체 단백질의 약 90%를 구성하며 무게비에 대한 단백질 함량이 높다.
 ③ 회분 함량은 0.3% 정도로 낮은 편이다.
 ④ 무질소물은 다른 부위에 비하여 많은 편이다.
45. 밀단백질에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 글루텐은 글리아딘과 글루테닌이 결합된 것이다.
 ② 글리아딘은 점성이 있고 유동적이다.
 ③ 글루테닌은 매우 질기고 탄력성이 있다.
 ④ 글루텐은 응집성, 탄력성, 점성이 없다.
46. 다른 식물성 식품보다 대두에서 비교적 많이 얻을 수 있는 영양소는?
 ① 물 ② 탄수화물
 ③ 단백질 ④ 비타민
47. 효소의 활성에 영향을 주는 요인과 거리가 먼 것은?
 ① 기질 ② pH
 ③ 작용온도 ④ 탄소
48. 단당류에 속하지 않는 것은?
 ① 젖당(lactose) ② 포도당(glucose)
 ③ 과당(fructose) ④ 리보오스(ribose)
49. 야채샌드위치를 만드는 일부 야채류의 어느 물질이 칼슘의 흡수를 방해하는가?
 ① 옥살산(oxalic acid) ② 초산(acetic acid)
 ③ 구연산(citric acid) ④ 말산(malic acid)
50. 피칸파이를 50g 섭취하였을 때 지방으로부터 얻을 수 있는 열량은 몇 kcal인가? (100g 피칸파이 - 8.0g 단백질, 17.2g 지질, 41.4g 당질)
 ① 77.4kcal ② 154.8kcal
 ③ 34.4kcal ④ 68.8kcal

4과목 : 식품위생학

51. 미생물이 성장하는데 필수적으로 필요한 요인이 아닌 것은?
 ① 적당한 온도 ② 적당한 햇빛
 ③ 적당한 수분 ④ 적당한 영양소
52. 빵 반죽을 분할시 또는 구울 때 달라붙지 않게 하고, 모양

을 유지하는데 사용되는 것은?

- ① 가소제 ② 보존제
 ③ 이형제 ④ 윤제
53. 사람과 동물이 같은 병원체에 의하여 발생하는 질병 또는 감염 상태와 관련 있는 질병을 총칭하는 것은?
 ① 법정 전염병 ② 화학적 식중독
 ③ 인축 공통전염병 ④ 진균독증
54. 자연독 식중독과 그 독성물질을 잘못 연결한 것은?
 ① 무스카린 - 버섯중독
 ② 베네루핀 - 모시조개중독
 ③ 솔라닌 - 맥각중독
 ④ 테트로도톡신 - 복어중독
55. 장염 비브리오균의 성질에 속하는 것은?
 ① 염분이 있는 곳에서 잘 자란다.
 ② 아포를 형성한다.
 ③ 열에 강하다.
 ④ 독소를 생산한다.
56. 원인균은 바실러스 안트라시스(*Bacillus anthracis*)이며, 수육을 조리하지 않고 섭취하였거나 피부상처 부위로 감염되기 쉬운 인축 공통 전염병은?
 ① 야토병 ② 탄저
 ③ 브루셀라병 ④ 돈단독
57. 팔랑금류, 잼, 케찹, 식육 가공품에 사용하는 보존료는?
 ① 소르빈산(염) ② 디히드로초산(염)
 ③ 프로피온산(염) ④ 파라옥시 안식향산 부틸
58. 부패를 판정하는 방법으로 사람에게 의한 관능검사를 실시할 때 검사하는 항목이 아닌 것은?
 ① 색 ② 맛
 ③ 냄새 ④ 균수
59. 경구전염병의 병원체 중 바이러스(virus)에 의해 전염되어 발병되는 것은?
 ① 성홍열 ② 장티푸스
 ③ 전염성 설사증 ④ 아메바성 이질
60. 다음 전염병 중 쥐를 매개체로 전염되는 질병이 아닌 것은?
 ① 돈단독증
 ② 쯔쯔가무시증
 ③ 신증후군출혈열(유행성출혈열)
 ④ 렙토스피라증

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	①	①	②	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	④	③	②	③	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	②	②	②	①	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	③	①	②	①	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	②	④	③	④	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	③	①	②	①	④	③	①