

1과목 : 제조이론

- 초콜릿 케이크에서 초콜릿을 32% 사용하면 원래 사용하던 쇼트닝 60%는 얼마로 조정해야 되는가?
① 44% ② 54%
③ 66% ④ 76%
- 고율배합 제품과 저율배합 제품의 비중을 비교해본 결과 일반적으로 맞는 것은?
① 고율배합 제품의 비중이 높다.
② 저율배합 제품의 비중이 높다.
③ 비중의 차이는 없다.
④ 제품의 크기에 따라 비중은 차이가 있다.
- 케이크 도넛의 가장 적합한 튀김 온도는? (이때 사용되는 튀김유는 신선한 유지를 기준으로 한다.)
① 140-150℃ ② 160-170℃
③ 190-196℃ ④ 220-230℃
- 퐁당(fondant)을 만들기 위하여 시럽을 끓일 때 시럽의 온도로 가장 적당한 범위는?
① 72-78℃ ② 82-85℃
③ 114-118℃ ④ 131-136℃
- 다음 케이크 중 계란노른자를 사용하지 않는 것은?
① 파운드 케이크 ② 화이트 레이어 케이크
③ 데블스 푸드 케이크 ④ 소프트 롤케이크
- 밀가루 100%, 계란 166%, 설탕 166%, 소금 2%인 배합율은 어떤 케이크 제조에 적당한가?
① 파운드 케이크 ② 엘로우 레이어 케이크
③ 스펀지 케이크 ④ 엔젤푸드 케이크
- 일반적으로 우유 1ℓ로 만든 커스터드 크림과 무당 휘핑크림 1ℓ로 만든 생크림을 혼합하여 만드는 제품은?
① 디프로매트 크림(diplomat cream)
② 퐁당(fondant)
③ 마쉬멜로우(marshmallow)
④ 퍼지 아이싱(fudge icing)
- 도넛에 기름이 많이 흡수되는 이유에 대한 설명으로 틀리는 항목은?
① 믹싱이 부족하다.
② 반죽에 수분이 많다.
③ 배합에 설탕과 팽창제가 많다.
④ 튀김온도가 높다.
- 과일케이크를 만들 때 과일이 가라앉는 이유에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 강도(強度)가 약한 밀가루의 사용
② 믹싱이 지나치고 큰 공기방울이 반죽에 남는 경우
③ 진한 속색을 위한 탄산수소나트륨의 과다 사용
④ 시럽에 담긴 과일의 시럽을 배수시켜 사용
- 스펀지 케이크 제조시 제품의 중앙 부분이 함몰하는 원인으

로 가장 알맞은 것은?

- 반죽의 비중이 높다.
 - 굽기가 부족하다
 - 팽창제 사용량을 감소시켰다.
 - 밀가루 사용량을 증가시켰다.
- 다음 기계 설비 중대량 생산업체에서 사용하는 설비로 가장 알맞은 것은?
① 터널오븐 ② 데크오븐
③ 전자렌지 ④ 생크림용 탁상믹서
 - 소프트 롤케이크를 구운 후 즉시 팬에서 꺼내는 이유로 알맞지 않은 것은?
① 찢겨버리는 것을 방지하기 위해
② 수축방지를 위해
③ 냄새제거를 위해
④ 표면이 터지지 않게 하기 위해
 - 다음 중 케이크용 포장 재료의 구비 조건이 아닌 것은?
① 방수성일 것 ② 상품 가치를 높일 수 있을 것
③ 원가가 낮을 것 ④ 통기성일 것
 - 파이롤러(pie roller)는 반죽을 롤러에 의해 평균적으로 늘리는 기계인데, 주로 유지가 많은 반죽에 사용한다. 다음 중 파일롤러를 사용하지 않는 제품은?
① 데니시 페이스트리 ② 케이크 도넛
③ 쿠키 ④ 롤케이크
 - 이탈리안 머랭에 대한 설명 중틀린 것은?
① 설탕량이 많으면 설탕의 일부를 제외하고 남은 설탕에 물을 넣어 끓인다.
② 흰자와 설탕 일부로 50% 정도의 머랭을 만든다.
③ 뜨거운 시럽에 머랭을 넣으면서 거품을 올린다.
④ 강한 불에 구워 착색하는 제품을 만드는데 알맞다.
 - 같은 밀가루로 식빵과 불란서 빵을 만들 경우, 식빵의 가수율이 63%였다면 불란서 빵의 가수율은 얼마로 하는 것이 가장 좋은가?
① 61% ② 63%
③ 65% ④ 67%
 - 미국식 데니시 페이스트리 제조시 반죽무게에 대한 총전용 유지(롤인유지)의 사용 범위로 가장 적당한 것은?
① 10~15% ② 20~40%
③ 45~60% ④ 60~80%
 - 데니시 페이스트리의 일반적인 반죽 온도는?
① 0℃ ② 8-12℃
③ 18-22℃ ④ 27-30℃
 - 일반적인 2차 발효실의 가장 적당한 온도는?
① 18~30℃ ② 32~40℃
③ 45~61℃ ④ 62~70℃
 - 빵제품의 모서리가 예리하게 된 것은 다음 중 어떤 반죽에서 오는 결과인가?

- ① 발효가 지친 반죽 ② 믹싱이 지친 반죽
③ 어린 반죽 ④ 2차 발효가 지친 반죽

2과목 : 재료과학

21. 빵의 노화가 가장 빨리 발생하는 온도는?
① -18°C ② 0°C
③ 20°C ④ 35°C
22. 빵을 오븐에 넣으면 빵속의 온도가 높아지면서 부피가 증가한다. 이때의 현상을 설명한 것 중 잘못된 것은?
① 가스압이 증가한다.
② 이산화탄소 가스의 용해도가 증가한다.
③ 이스트의 효소활성은 60°C 까지 계속된다.
④ 79°C 부터 알코올이 증발하여 특유의 향이 발생한다.
23. 가로 10cm, 세로 18cm, 높이 7cm의 팬을 사용할 때 비용적이 3.4인 빵의 분할량은 약 얼마인가?
① 330g ② 350g
③ 370g ④ 390g
24. 스트레이트법에서 1차 발효시 최적의 발효 상태를 파악하는 방법으로 손가락으로 눌러서 판단하는 테스트법 중 가장 발효가 좋은 상태는?
① 반죽부분이 움추러 든다.
② 반죽부분이 퍼진다.
③ 누른 부분이 살짝 오므러 든다.
④ 누른 부분이 옆으로 퍼져 함몰한다.
25. 다음 중 계량한 활성건조이스트(Active dry yeast)를 용해시키기에 적합한 물의 온도는?
① 0°C ② 15°C
③ 27°C ④ 40°C
26. 제빵의 생산시 고려해야할 원가요소에서 가장 거리가 먼 것은?
① 재료비 ② 노무비
③ 경비 ④ 학술비
27. 포장에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 포장은 제품의 노화를 지연시킨다.
② 뜨거울 때 포장하여 냉각손실을 줄인다.
③ 미생물에 오염되지 않은 환경에서 포장한다.
④ 온도, 충격 등에 대한 품질변화에 주의한다.
28. 냉동제품에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 저장기간이 길수록 품질저하가 일어난다.
② 상대습도를 85% 이상으로 하여 해동한다.
③ 냉동반죽의 분할량이 크면 좋지 않다.
④ 수분이 결빙할 때 다량의 잠열을 요구한다.
29. 다음 패닝(panning) 방법 중 풀먼 브래드 같이 뚜껑을 덮어 굽는 제품에 반죽을 길게 늘려 U자, N자, M자형으로 넣는 방법은?
① 직접 패닝 ② 트위스트 패닝

- ③ 스파이럴 패닝 ④ 교차 패닝

30. 오븐 실내 속에서 뜨거워진 공기를 강제 순환시키는 열 전달방식은?

- ① 대류 ② 전도
③ 복사 ④ 전자파

3과목 : 영양학

31. 전분의 노화에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 노화는 -18°C 에서 잘 일어나지 않는다.
② 노화된 전분은 소화가 잘된다.
③ 노화란 α -전분이 β -전분으로 되는 것을 말한다.
④ 노화된 전분은 향이 손실된다.
32. 튀김기름의 발연 현상과 관계가 깊은 것은?
① 유리지방산가 ② 크림가
③ 유화가 ④ 검화가
33. 아이싱 크림이나 데커레이션에 사용되는 분당은 어느 당류를 이용하는가?
① 포도당 ② 과당
③ 설탕 ④ 유당
34. 유지의 산화에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?
① 산소 ② 수분
③ 질소 ④ 철
35. 우유의 응고에 관여하고 있는 금속이온은?
① Mg^{2+} (마그네슘) ② Mn^{2+} (망간)
③ Ca^{2+} (칼슘) ④ Cu^{2+} (구리)
36. 제과·제빵에 쓰이는 팽창제가 아닌 것은?
① 베이킹파우더 ② 빵효모
③ 탄산칼슘 ④ 탄산암모늄
37. 계란 흰자가 360g 필요하다고 할 때 전체 무게 60g짜리 계란이 몇 개정도 필요한가?
① 6개 ② 8개
③ 10개 ④ 13개
38. 글레이즈(glaze)를 사용할 때 가장 적당한 온도는?
① 15°C ② 25°C
③ 35°C ④ 45°C
39. 다음 설명 중 코팅용 초콜릿으로 가장 중요한 것을 바르게 설명한 것은?
① 맛이 좋은 것
② 융점이 항상 높은 것
③ 초콜릿 냄새가 강한 것
④ 융점이 겨울에는 낮고, 여름에는 높은 것
40. 다음 중서로 연결이 잘못된 것은?
① 알파 아밀라아제 : 전분
② 베타 아밀라아제 : 섬유소

- ③ 트립신 : 단백질
④ 리파아제 : 지방
41. 제빵에 있어 단위 무게당 흡수율이 가장 높은 밀가루의 성분은?
① 전분 ② 회분
③ 단백질 ④ 펜토산
42. 자유수를 올바르게 설명한 것은?
① 당류와 같은 용질에 작용하지 않는다.
② 0℃이하에서도 얼지 않는다.
③ 정상적인 물보다 그 밀도가 크다.
④ 염류, 당류 등을 녹이고 용매로서 작용한다.
43. 제빵에서 소금의 역할 중 틀린 것은?
① 글루텐을 강화시킨다. ② 방부 효과가 있다.
③ 빵의 내상을 희게 한다. ④ 맛을 조절한다.
44. 일반적으로 밀가루를 전문적으로 시험하는 기기로 이루어진 항목은?
① 패리노그래프, 가스크로마토그래피, 익스텐소그래프
② 패리노그래프, 아밀로그래프, 파이브로 미터
③ 패리노그래프, 익스텐소그래프, 아밀로그래프
④ 아밀로그래프, 익스텐소그래프, 평추어 테스트
45. 동물의 가죽이나 뼈등에서 추출하며 안정제나 제과 원료로 사용되는 것은?
① 젤라틴 ② 한천
③ 펙틴 ④ 카라기난
46. 밥을 오래 씹으면 단맛이 나는데, 이것은 밥속에 어떤 영양소가 들어 있기 때문인가?
① 단백질 ② 비타민
③ 탄수화물 ④ 지방질
47. 다음 결핍 증세 중 필수지방산의 결핍으로 인해 발생 하는 것은?
① 신경통 ② 결막염
③ 안질 ④ 피부염
48. 생리기능의 조절작용을 하는 영양소는?
① 탄수화물과 지방질 ② 탄수화물과 단백질
③ 지방질과 단백질 ④ 무기질과 비타민
49. 단백질의 구성단위는?
① 아미노산 ② 지방산
③ 글리세린 ④ 포도당
50. 열량 계산공식 중 맞는 것은?
① [(탄수화물의 양 + 단백질의 양) × 4] + (지방의 양 × 9)
② [(탄수화물의 양 + 지방의 양) × 4] + (단백질의 양 × 9)
③ [(지방의 양 + 단백질의 양) × 4] + (탄수화물의 양 × 9)
④ [(탄수화물의 양 + 지방의 양) × 9] + (단백질의 양 × 4)

4과목 : 식품위생학

51. 감염형 식중독이 아닌 것은?
① 살모넬라 식중독 ② 병원성대장균 식중독
③ 장염비브리오 식중독 ④ 포도상구균 식중독
52. 유해한 합성 착색료는?
① 수용성 안나토 ② 베타 카로틴
③ 이산화티타늄 ④ 아우라민
53. 요소수지 용기에서 이행될 수 있는 대표적인 유독 물질은?
① 에탄올 ② 포름알데히드
③ 알루미늄 ④ 주석
54. 제품의 포장용기에 의한 화학적 식중독에 대한 주의를 특히 요하는 것과 거리가 가장 먼 것은?
① 형광 염료를 사용한 종이 제품
② 착색된 셀로판 제품
③ 페놀수지 제품
④ 알루미늄박 제품
55. 생유의 미생물 오염에 대한 변화를 설명한 것 중 잘못된 것은?
① 대장균군의 오염이 있으면 거품을 일으키며 이상응고를 나타낸다.
② 단백질해균 중 일부는 우유를 점질화 시키거나 쓴맛을 주는 것도 있다.
③ 생유 중의 산생성균은 산도상승의 원인이 되어 선도를 저하시키기도 한다.
④ 냉장 중에는 우유에 변패를 일으키는 미생물이 증식하지 못한다.
56. 제과·제빵에서 설탕이 어떤 원리로 미생물 번식을 억제하는가?
① 온도 변화 ② 삼투압 변화
③ pH 변화 ④ 산화 환원
57. 제과·제빵 공정 중 곰팡이에 의한 오염이 주로 발생하는 과정은?
① 배합 ② 발효
③ 굽기 ④ 냉각
58. 다음 중병원체가 바이러스인 질병은?
① 폴리오 ② 결핵
③ 디프테리아 ④ 성홍열
59. 육류에 주로 기생하는 O-157은 다음 어느 세균류에 속하는가?
① 대장균 ② 살모넬라균
③ 리스테리아균 ④ 비브리오균
60. 경구 전염병의 예방대책 중전염원에 대한 대책으로 바르지 않은 것은?
① 환자를 조기 발견하여 격리 치료한다.
② 환자가 발생하면 접촉자의 대변을 검사하고 보균자의 발견에 힘쓴다.

- ③ 일반 및 유흥음식점에서 일하는 사람들은 정기적인 건강 진단이 필요하다.
- ④ 오염되었다고 생각되는 물건은 손이 닿지 않는 곳에 모아둔다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	③	②	③	①	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	③	①	②	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	③	④	④	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	③	③	③	③	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	③	①	③	④	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	④	④	②	④	①	①	④