

1과목 : 제조이론

- 제과에서 머랭이라고 하는 것은 어떤 것을 의미하는가?
 - 계란 흰자를 건조시킨 것
 - 계란 흰자를 중탕한 것
 - 계란 흰자에 설탕을 넣어 믹싱한 것
 - 계란 흰자에 식초를 넣어 믹싱한 것
- 커스터드 푸딩(Custard Pudding)을 제조할 때 설탕:계란의 사용비율로 적합한 것은?
 - 1:1
 - 1:2
 - 2:1
 - 3:2
- 스펀지케이크의 반죽 1g당 팽용적(cm^3)은 얼마인가?
 - 2.40
 - 2.96
 - 4.71
 - 5.08
- 제과반죽이 너무 산성에 치우쳐 발생하는 현상과 거리가 먼 것은?
 - 연한 향
 - 여린 껍질색
 - 빈약한 부피
 - 거치른 기공
- 다음 제품 중 코코아를 사용하는 것은?
 - 화이트 레이어 케이크
 - 옐로 레이어 케이크
 - 파운드 케이크
 - 데블스 푸드 케이크
- 굽기를 할 때 갈색화 반응을 가장 잘 일으키는 당은?
 - 포도당
 - 과당
 - 갈락토오스
 - 만노오스
- 파이를 냉장고 등에서 휴지시키는 이유와 가장 거리가 먼 것은?
 - 전 재료의 수화 기회를 준다.
 - 유지와 반죽의 굳은 정도를 같게 한다.
 - 반죽을 경화 및 긴장시킨다.
 - 끈적거림을 방지하여 작업성을 좋게 한다.
- 케이크 도넛에 대두분을 사용하는 목적이 아닌 것은?
 - 흡유율 증가
 - 껍질 구조 강화
 - 껍질색 개선
 - 식감의 개선
- 언더 베이킹(Under Baking)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - 너무 낮은 온도에서 굽는 것이다.
 - 중앙부분이 익지 않는 경우가 많다.
 - 윗면이 갈라지기 쉽다.
 - 속이 거칠어지기 쉽다.
- 반죽형 케이크가 아닌 것은?
 - 옐로 레이어 케이크
 - 화이트 레이어 케이크
 - 소프트 롤 케이크
 - 데블스 푸드 케이크
- 설탕 300g 대신 전량을 고품질 75%인 물엿으로 대체하려면 물엿의 사용량은?
 - 50g
 - 150g

③ 400g ④ 600g

- 제과 제품을 평가하는데 있어 외부 특성에 해당되지 않는 것은?
 - 부피
 - 껍질색
 - 기공
 - 균형
- 제과에서 설탕의 기능과 가장 거리가 먼 것은?
 - 부피의 증가
 - 감미도 증가
 - 연화 작용
 - 수분 보유작용
- 반죽 온도를 너무 낮게 하여 만든 케이크 도넛의 설명 중 맞는 것은?
 - 흡유율이 적다.
 - 점도가 강하게 된다.
 - 팽창이 커진다.
 - 표면이 매끄럽다.
- 다음의 제품에서 크림법을 사용하여 만들 수 있는 제품은?
 - 슈
 - 마블파운드케이크
 - 버터스펀지케이크
 - 엔젤푸드케이크
- 2차 발효가 과다할 때 일어나는 현상이 아닌 것은?
 - 옆면이 터진다.
 - 색상이 어리다.
 - 신 냄새가 난다.
 - 오븐에서 주저 앉기 쉽다.
- 빵을 구웠을 때 갈변이 되는 것은 어느 반응에 의해서인가?
 - 비타민C의 산화에 의하여
 - 효모에 의한 갈색(brown) 반응에 의하여
 - 마이아르(maillard) 반응과 캐러멜 반응이 동시에 일어나서
 - 클로로필(chlorophyll) 반응에 의하여
- 팬기름의 사용에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 - 발연점이 높아야 한다.
 - 산패에 강해야 한다.
 - 반죽무게의 3~4%를 사용한다.
 - 기름이 과다하면 밀껍질이 두껍고 색이 어둡다.
- 단백질 분해효소인 프로테아제(protease)를 햄버거 빵에 첨가하는 이유로 가장 알맞은 것은?
 - 저장성 증가를 위하여
 - 팬 흐름성을 좋게 하기 위하여
 - 껍질색 개선을 위하여
 - 발효 내구력을 증가시키기 위하여
- 빵의 포장온도로 가장 적당한 것은?
 - 15℃
 - 25℃
 - 35℃
 - 45℃

2과목 : 재료과학

- 적당한 2차 발효점은 여러 여건에 따라 차이가 있다. 일반적으로 완제품의 몇 % 까지 팽창시키는가?
 - 30~40%
 - 50~60%

- ③ 70~80% ④ 90~100%
22. 제빵시 발효점을 확인하는 방법을 설명한 것 중 적당하지 못한 것은?
 ① 부피가 증가한 상태 확인
 ② 반죽 내부에 생긴 망상조직 상태 확인
 ③ 반죽의 현재 온도 확인
 ④ 손가락으로 눌렀을 때의 탄력성 정도 확인
23. 오븐 내에서 뜨거워진 공기를 강제 순환시키는 열전달 방식은?
 ① 대류 ② 전도
 ③ 복사 ④ 전자파
24. 다음 중 뜨거워진 공기를 강제 순환시키는 열전달 방식은?
 ① 대류 ② 전도
 ③ 복사 ④ 전자파
25. 다음 중 보관 장소가 나머지 재료와 크게 다른 재료는?
 ① 설탕 ② 소금
 ③ 밀가루 ④ 생이스트
26. 산화제와 환원제를 함께 사용하여 익상시간과 발효시간을 감소하는 제빵 법은?
 ① 스트레이트법 ② 노타임법
 ③ 비상 스펀지법 ④ 비상 스트레이트법
27. 냉동빵에서 반죽의 온도를 낮추는 가장 주된 이유는?
 ① 수분 사용량이 많으므로
 ② 밀가루의 단백질 함량이 낮아서
 ③ 이스트 활동을 억제하기 위해
 ④ 이스트 사용량이 감소하므로
28. 노화를 지연시키는 방법으로 옳바르지 않은 것은?
 ① 방습 포장재를 사용한다.
 ② 다량의 설탕을 첨가한다.
 ③ 냉장 보관시킨다.
 ④ 유화제를 사용한다.
29. 제빵에서 원가(재료비) 상승의 원인이 아닌 것은?
 ① 창고에 장기 누적 및 사장 자재 발생
 ② 수요 창출에 역행하는 신제품 개발
 ③ 자재 선입 선출 방식 실시
 ④ 다품종 소량 생산의 세분화 전략
30. 일반적인 스펀지/도법에서 가장 적당한 스펀지 온도는?
 ① 12~15℃ ② 18~20℃
 ③ 23~25℃ ④ 29~32℃

3과목 : 영양학

31. 과일 잼 형성의 3가지 필수요건이 아닌 것은?
 ① 설탕 ② 펙틴
 ③ 산(酸) ④ 젤라틴

32. 맥아당(maltose)은 말타아제에 의하여 무엇으로 분해되는가?
 ① 포도당 + 과당 ② 포도당 + 갈락토오스
 ③ 포도당 + 포도당 ④ 포도당 + 유당
33. 다음 향신료 중 대부분의 피자소스에 필수적으로 들어가는 향신료는?
 ① 오레가노 ② 계피
 ③ 정향 ④ 넛메그
34. 설탕을 포도당과 과당으로 분해하는 효소는?
 ① 인버타아제(Invertase)
 ② 지마아제(Zymase)
 ③ 말타아제(Maltase)
 ④ 알파 아밀라아제(α -amylase)
35. 칼슘염의 설명으로 부적당한 것은?
 ① 글루텐을 강하게 하여 반죽을 되고 건조하게 한다.
 ② 인산칼슘염은 반응 후 산성이 된다.
 ③ 곰팡이와 로프(rope) 박테리아의 억제효과가 있다.
 ④ 이스트 성장을 위한 질소공급을 한다.
36. 포도당의 설명 중 틀린 것은?
 ① 포도당은 물엿을 완전히 전환시켜 만든다.
 ② 설탕에 비해 삼투압이 높으며 감미가 높다.
 ③ 입에서 용해될 때 시원한 느낌을 준다.
 ④ 효모의 영양원으로 발효를 촉진시킨다.
37. 케이크, 쿠키, 파이, 페이스트리용 밀가루의 제과적성 및 점성을 측정하는 기구는?
 ① 아밀로그래프(Amylograph)
 ② 패리노그래프(Farinograph)
 ③ 애그트론(Agtron)
 ④ 맥캐미카엘 점도계(Macmichael Viscosimeter)
38. 다음 밀가루 중 면류를 만드는데 주로 사용되는 것은?
 ① 박력분 ② 중력분
 ③ 강력분 ④ 대두분
39. 일시적 경수에 대하여 바르게 설명한 것은?
 ① 끓임으로 물의 경도가 제거되는 물
 ② 황산염에 기인하는 물
 ③ 끓여도 제거되지 않는 물
 ④ 보일러에 쓰면 좋은 물
40. 계란 흰자의 조성과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 오브알부민 ② 콘알부민
 ③ 라이소자임 ④ 카로틴
41. 천연 버터와 마가린의 가장 큰 차이는?
 ① 수분 ② 지방산
 ③ 산가 ④ 과산화물가

42. 제빵에서 소금의 역할 중 틀린 것은?

- ① 글루텐을 강화시킨다.
- ② 방부효과가 있다.
- ③ 빵의 내상을 희게 한다.
- ④ 맛을 조절한다.

43. 풍당 아이싱의 끈적거림을 배제하는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 아이싱에 최소의 액체를 사용한다.
- ② 안정제(한천 등)를 사용한다.
- ③ 흡수제(전분 등)를 사용한다.
- ④ 케이크 온도가 높을 때 사용한다.

44. 밀가루 반죽을 끓어질 때까지 늘려서 끓음으로써 그 때의 힘과 반죽의 신장성을 알아보는 기계는?

- ① 아밀로그래프 ② 패리노그래프
- ③ 익스텐소그래프 ④ 믹소그래프

45. 식빵 제조시 물을 넣는 것 보다 우유를 넣은 제품의 겹질색이 진하다.우유의 무엇이 제품의 겹질색을 진하게 하는가?

- ① 젖산 ② 카제인
- ③ 무기질 ④ 유당

46. 당질이 혈액내에 존재하는 형태는?

- ① 글루코오스(glucose) ② 글리코겐(glycogen)
- ③ 갈락토오스(galactose) ④ 프럭토오스(fructose)

47. 유지의 도움으로 흡수, 운반되는 비타민으로만 구성된 것은?

- ① 비타민 A,B,C,D ② 비타민 B,C,E,K
- ③ 비타민 A,B,C,K ④ 비타민 A,D,E,K

48. 다음 중 포화지방산은?

- ① 올레산(oleic acid)
- ② 스테아르산(stearic acid)
- ③ 리놀레산(linoleic acid)
- ④ 아이코사펜테노익산(eicosapentaenoic acid)

49. 단백질의 소화효소 중 체장에서 분비되고, 아르기닌(arginine) 등 염기성 아미노산의 COOH기에서 만들어진 펩타이드(peptide) 결합을 분해하는 효소는?

- ① 트립신(trypsin)
- ② 펩신(pepsin)
- ③ 아미노펩티다아제(aminopeptidase)
- ④ 카르복시펩티다아제(carboxypeptidase)

50. 아미노산의 성질에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 모든 아미노산은 선광성을 갖는다.
- ② 아미노산은 용점이 낮아서 액상이 많다.
- ③ 아미노산은 종류에 따라 등전점이 다르다.
- ④ 천연단백질을 구성하는 아미노산은 주로 D형이다.

① 급성 전신성 열성질환

② 급성 이완성 마비질환

③ 급성 간염 질환

④ 계절에 관계없이 발생

52. 다음 세균성 식중독 중 섭취 전에 가열하여도 예방하기가 가장 어려운 것은?

- ① 살모넬라 식중독
- ② 포도상구균 식중독
- ③ 클로스트리디움 보툴리눔 식중독
- ④ 장염 비브리오 식중독

53. 요소수지 용기에서 이행될 수 있는 대표적인 유독물질은?

- ① 에탄올 ② 포름알데히드
- ③ 알루미늄 ④ 주석

54. 클로스트리디움 보툴리눔 식중독과 관련 있는 것은?

- ① 화농성 질환의 대표균
- ② 저온살균 처리 및 신속한 섭취로 예방
- ③ 내열성 포자 형성
- ④ 감염형 식중독

55. 빵 및 생과자에 사용할 수 있는 보존료는?

- ① 안식향산
- ② 파라옥시 안식향산 부틸
- ③ 파라옥시 안식향산 에틸
- ④ 프로피온산나트륨

56. 식품첨가물 중 유화제에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 물과 기름의 경계면에 작용하는 힘을 저하시켜 물 중에 기름을 분산시키는 작용을 한다.
- ② 기름 중에 물을 분산시키고, 또 분산된 입자가 다시 응집하지 않도록 안정화시키는 작용을 한다.
- ③ 식품에 사용할 수 있는 종류가 지정되어 있다.
- ④ 지정된 유화제들은 식품의 종류에 관계없이 모두 동일한 유화효과를 가진다.

57. 식품 첨가물에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 화학적 합성품만 있다.
- ② 천연품과 화학적 합성품이 있다.
- ③ 화학 합성품은 약국에서만 판매할 수 있다.
- ④ 허용된 것은 어느 식품에나 모두 쓸 수 있다.

58. 비병원성 미생물에 속하는 세균은?

- ① 결핵균 ② 이질균
- ③ 젖산균 ④ 살모넬라균

59. 미생물에 의해 주로 단백질이 변화되어 악취, 유해물질을 생성하는 현상은?

- ① 발효(Fermentation) ② 부패(Puterifaction)
- ③ 변패(Deterioration) ④ 산패(REancidity)

60. 소화기계 전염병과 비교한 세균성 식중독의 특징에 해당되는 것은?

- ① 미량의 병원균으로도 발병한다.
- ② 2차 오염이 가능하다.
- ③ 면역성이 나타나지 않는다.

4과목 : 식품위생학

51. 장티푸스를 가장 올바르게 설명한 것은?

④ 잠복기간이 비교적 길다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	④	④	②	③	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	②	②	①	③	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	①	④	②	③	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	①	④	②	④	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	③	④	①	④	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	③	④	④	②	③	②	③