

1과목 : 어류양식

1. 초어의 인공부화기로 쓰이는 아트킨스 부화기는 다음 중 어디에 속하는가?

- ① 유통식 ② 폐쇄식
③ 침지식 ④ 습식

2. 다음 중 조피볼락을 이용하여 중요 생산을 할 때 출산 자어의 최초 수용밀도로 가장 적당한 것은?

- ① m³ 당 1000 ~ 2000마리 ② m³ 당 3000 ~ 4500마리
③ m³ 당 5000 ~ 7500마리 ④ m³ 당 8000 ~ 10000마리

3. 넙치 식용어 양성에 있어 먹이와 성장에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 초기 방양시 하루 중 먹이 주는 횟수는 3 ~ 4회이다.
② 성장함에 따라서 하루에 2번(아침과 해질 무렵에)주는 것이 좋다.
③ 수온이 10℃ 이하로 되면 먹이량은 급격히 상승한다.
④ 하루에 먹이 주는 양은 체중비율에 따른다.

4. 무지개송어의 경우, 사료 중에 Mg가 부족하면 나타나는 증세가 아닌 것은?

- ① 성장부진 ② 사망률 증가
③ 백내장 ④ 골격이상

5. 양식대상종의 선택기준 중 생산성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가급적 빨리 자라고, 크게 성장해야 한다.
② 강인하여 병에 잘 걸리지 않아야 한다.
③ 사육 기술이 확립되어 있는 종을 선택해야 한다.
④ 사료는 가격에 관계없이 쉽게 필요한 양을 구할 수 있어야 한다.

6. 해산 어류 중 양식장의 수온이 10℃ 이하이거나 28℃ 이상의 환경에서 양식장 저면의 사니질속에 매몰하는 습성이 있는 어종은?

- ① 방어 ② 콩치
③ 자주복 ④ 참돔

7. 참돔 가두리 양식장의 적지조건으로 적합하지 않은 것은?

- ① 해수의 유동이 좋은 수역
② 수온이 연중 10 ~ 15℃를 유지하는 수역
③ 사료의 공급, 양성어의 출하 등이 편리한 곳
④ 하천수의 유입에 의한 비중 변동이 없는 곳

8. 다음 중 순환여과식 양식법의 장점과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 적은 수량(水量)으로도 양식이 가능하다.
② 노폐물 제거와 수질정화가 용이하다.
③ 계절의 영향을 적게 받는다.
④ 사료량이 적게 든다.

9. 은연어의 해수양식 시 일일 먹이 공급 횟수로 가장 적합한 것은?

- ① 1회 ② 2회
③ 3회 ④ 4회

10. 다음 중 은어의 자어 및 치어를 사육하는데 가장 좋은 먹이 생물이 될 수 있는 것은?

- ① 기수산 로티퍼와 물벼룩류 ② 남조류와 녹조류
③ 식물성 부유생물 ④ 환형동물류

11. 다음 중 넙치 자어 사육에 가장 적합한 수온은?

- ① 5 ~ 10℃ ② 11 ~ 15℃
③ 16 ~ 19℃ ④ 20 ~ 25℃

12. 어류의 사료에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 어분 외의 단백질 원으로 대두박, 육골분, 혈분 등이 사용된다.
② 단백질원으로 배합사료 내 어분의 함량이 점점 더 높아지고 있다.
③ 사료 계수가 높을수록 사료가치가 적어진다.
④ 단백질 내 아미노산의 요구량은 어종에 따라 큰 차이가 있다.

13. 다음 복어류 중 현재 업계에서 축양 또는 양식 대상으로 가장 많이 택하고 있는 것은?

- ① 매리복 ② 자주복
③ 흰점복 ④ 황복

14. 다음 중 일반적인 양성과정이라고 감안 할 때 사육기간이 가장 짧은 것은?

- ① 무지개 송어 ② 붕어
③ 잉어 ④ 은어

15. 순환여과식 장치에서 배설물의 물리적 제거를 하는 곳은?

- ① 사육조 ② 침전조
③ 여과조 ④ 저수조

16. 잉어의 먹이 습성에 대한 설명의 잘못된 것은?

- ① 수온이 24 ~ 28℃ 일 때 먹이를 가장 많이 먹는다.
② 어릴 때에는 주로 식물성 먹이를 먹고 자라며, 성장한 후에는 동물성 먹이를 많이 먹는다.
③ 위가 없어 한꺼번에 많은 먹이를 먹지 못하므로 양식 시 먹이를 여러 번 나누어 주어야 한다.
④ 산란용 친어에게 주는 먹이는 단백질과 지방 함량이 비교적 적은 것을 준다.

17. 다음 양식방법 중 가장 고전적인 방법은?

- ① 정수식 양식 ② 유수식 양식
③ 가두리 양식 ④ 순환여과식 양식

18. 해산 어류의 중요 생산과정에서 Baker's Yeast 로 배양한 로티퍼를 먹이로 공급하는 경우 나타날 수 있는 현상에 해당되지 않은 것은?

- ① 자극에 대한 반응이 완만하고 복부가 팽만해짐
② 기형어가 출현함
③ 포식력이 높아져 성장이 빨라짐
④ 활력저하로 대량 폐사를 일으킴

19. 어류의 축양에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 축양은 생존율을 높이는 데 그 목적이 있다.

- ② 가두리에서 축양할 수 있는 동물은 잉어, 송어, 메기, 은어, 방어, 돔 등이 있다.
- ③ 축양은 살아있는 수산동물을 적절한 시설 안에서 일시적으로 보관하는 일이다.
- ④ 다량의 어류를 넣어 1 ~ 2일 이상의 축양을 위해서는 에어레이션 장치와 오물제거를 위한 장치가 필요하다

20. 다음 주 실험장어가 가장 많이 소상하는 시간대는?

- ① 간조시 일몰 후 2 ~ 3 시간
- ② 만조시 일몰 후 2 ~ 3 시간
- ③ 조석에 관계없이 야간에
- ④ 조석에 관계없이 주간에

2과목 : 무척추동물양식

21. 다음 중 치패 발생 장소가 가장 높은 지반인 것은?

- ① 대합 ② 피조개
- ③ 새조개 ④ 우럭

22. 인공 종묘 생산을 할 때 채란용 어미의 선택에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 성숙연령에 도달하기 직전의 것을 선택한다.
- ② 영양상태가 좋고 성숙이 충실한 것을 선택한다.
- ③ 선택 시기는 산란기의 전기나 중기가 좋다.
- ④ 채포나 운반할 때 시달리지 않은 것이 좋다.

23. 굴 양식장의 바닥에 유기물의 분해가 불충분할 때 생기는 현상이 아닌 것은?

- ① 황화수소가 생긴다. ② 수온약층이 생긴다.
- ③ 환원층이 생긴다. ④ 메탄가스가 생긴다.

24. 다음 중 대하의 일반적인 주 교접시기는?

- ① 3 ~ 4월 ② 5 ~ 8월
- ③ 7 ~ 8월 ④ 10 ~ 11월

25. 조개류의 종묘 생산시에 사용되는 먹이 생물을 배양할 때 가장 좋은 배양법은?

- ① 순종배양 ② 동조배양
- ③ 혼합배양 ④ 개방배양

26. 동해안에서 참가리비 부유유생의 주 출현시기는?

- ① 1 ~ 3월 ② 4 ~ 6월
- ③ 7 ~ 9월 ④ 10 ~ 12월

27. 대합의 종묘생산에 위한 채묘방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 수하식 채묘 ② 로프식 채묘
- ③ 침설고정식 채묘 ④ 완류식 채묘

28. 다음 중 백합의 개체 중량에서 육질이 차지하는 비중이 가장 높은 크기는?

- ① 1 ~ 2 cm ② 3 ~ 4 cm
- ③ 5 ~ 6 cm ④ 7 ~ 8 cm

29. 우리나라에서 일반적으로 비단련 종굴을 양성시설에 수하하는 시기는?

- ① 5 ~ 6월 ② 7 ~ 8월
- ③ 9 ~ 10월 ④ 11 ~ 12월

30. 전복의 습성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 야행성이다. ② 부유 유생시 주광성을 가진다.
- ③ 해조류 식성이다. ④ 산란시 깊은 곳으로 이동한다.

31. 수온과 해상의 관계를 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 수온과 소화관의 발달은 관계없다.
- ② 수온이 낮아지면 해상의 재생력은 감소한다.
- ③ 수온이 낮아지면 해상의 소화관은 발달한다.
- ④ 수온이 높아지면 해상의 먹이 섭취율은 증가한다.

32. 상자형 가두리식 양성을 하는 종으로 가장 적합한 것은?

- ① 꽃게 ② 문어
- ③ 피별고둥 ④ 백엽조개

33. 다음 중 참전복의 유생사육 및 초기치패 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 참전복은 20℃에서 수정되면 11시간 이내에 담륜자가 된다.
- ② 참전복 유생의 부유기간은 수온이 낮은 경우에는 3일 내외, 수온이 높은 경우에는 8일 내외이다.
- ③ 참전복의 부착치패이 먹이는 소형의 나비쿨라, 암포라 등이다.
- ④ 부착치패의 초기성장을 위해서 규조류가 많이 발생하는 합성수지의 투명파판을 사용한다.

34. 다음 중 전복의 산란 자극 방법으로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 음건자극 ② 담수주입자극
- ③ 뇌하수체 호르몬 주사 ④ 자외선 조사해수 자극

35. 대하의 유생을 4단계로 나눌 경우 2번째에 해당하는 것은?

- ① 조에아 ② 마이시스
- ③ 노플리우스 ④ 포스트 라바

36. 채롱망을 이용한 진주조개 양성시 적정 수하 깊이는?

- ① 1 m 내외 ② 2 m 내외
- ③ 5 m 내외 ④ 10 m 내외

37. 다음 중 굴 연승수하식 양성에서 가장 많은 비중을 차지하는 원가 항목은? (단, 3 ha, 60 대 시설인 경우)

- ① 인건비 ② 사료비
- ③ 종묘비 ④ 유류비

38. 청정해역이란 어떤 상태의 해역을 말하는가?

- ① 대장균의 오염율을 낮게 하기 위한 해역
- ② 양식장을 보호하기 위한 조업금지 구역
- ③ 해적생물을 방지하는 해역
- ④ 치패 발생의 보호 구역

39. 우리나라의 남해안에서 전기 산란기 참굴의 부유유생이 가장 많이 나타나는 시기는?

- ① 2 ~ 3월 ② 4 ~ 5월

㉓ 6 ~ 7월

㉔ 8 ~ 9월

40. 다음 고막(Anadara)류 중 수심이 제일 깊은 곳에서 서식하는 종류는?

- ① 고막 ② 새고막
㉓ 피조개 ④ 큰이랑피조개

3과목 : 해조류양식

41. 김어장에서 해수시비법(海水施肥法)의 장점은?

- ① 조류에 의한 비료분의 손실이 크다.
② 효과범위가 그다지 뚜렷하지 않다.
③ 각 어장마다 시비의 기준이 다르다.
㉔ 시비에 노력이 적게 든다.

42. 큰참김의 양식에 실패하기 쉬운 요인이 아닌 것은?

- ① 병해에 약하기 때문에
② 고노출에 약하기 때문에
③ 과포자를 받기가 어렵기 때문에
④ 부착기의 발달이 나쁘기 때문에

43. 다음 갈조류 중 포복지에 의하여 무성적으로 번식하는 것은?

- ① 툇 ② 미역
③ 산말 ④ 갯쟁이모자반

44. 다시마의 포자낭에서 방출된 유주자의 크기는?

- ① 0.8 ~ 1.0 μm ㉔ 8 ~ 10 μm
③ 80 ~ 100 μm ④ 800 ~ 1000 μm

45. 다음 중 일반적인 조가비 사상체의 배양 시작 시기는?

- ① 6 ~ 9월 ② 9 ~ 12월
㉓ 12 ~ 3월 ④ 3 ~ 6월

46. 재생력을 이용하여 양식할 수 있는 해조류는?

- ① 김 ② 다시마
㉓ 우뚝가사리 ④ 톨파래

47. 풀가사리의 좌에서 직립체가 발생하는 시기는?

- ① 3 ~ 5월 ② 6 ~ 7월
③ 7 ~ 8월 ㉔ 9 ~ 11월

48. 하구부근에 좋은 김 양식장이 많았던 이유와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 저수온과 영양염 ㉔ 저비중과 영양염
③ 저수온과 저비중 ④ 고수온과 영양염

49. 해수 유동이 양식 김에 주는 영향이 아닌 것은?

- ① 해수의 pH가 하강한다.
② 미세한 부니의 부착을 방지한다.
③ 영양염 및 이산화탄소를 공급한다.
④ 양식 김의 활발한 대사작용을 유지한다.

50. 미역양식장의 적절한 양성시설 수심은?

① 2 ~ 4 m

② 4 ~ 6 m

㉓ 5 ~ 8 m

④ 7 ~ 10 m

51. 다시마를 어미줄에 착생시키는 밀도는 수확시의 m 당 몇 개체를 기준으로 하는가?

- ① 10 개체 미만 ② 10 ~ 20 개체
㉓ 25 ~ 50 개체 ④ 50 ~ 100 개체

52. 다시마 양식 방법 중 인공 채묘하여 실내에서 배양액 속에서 수온과 조도를 조절하면 약 45일간 수조 배양을 한 후에 바다 수온의 하강 시기에 이식하여 양성하는 양식은?

- ① 1년 양식 ② 2년 양식
㉓ 축성 양식 ④ 억제 배양 양식

53. 조석과 기상조건으로 인한 김이 갯병이 가장 많을 때는?

- ① 날씨가 춥고 바람이 심한 대조 때
② 비바람 직후의 대조 때
③ 날씨가 춥고 바람이 부는 소조 때
㉔ 날씨가 따뜻하고 바람이 없는 소조 때

54. 10월 중에 김 양식장 주변에 해파리 대군이 나타나면 어떤 일이 일어나는가?

- ① 싹갯병이 잘 발생한다.
② 색택이 검어진다.
③ 성장이 빨라지고 중성포자의 방출이 적어진다.
④ 규조류가 밀생하게 된다.

55. 다음 중 김발에 불기 시작할 때 발의 저노출선에 며칠간 고정시켜 주면 구제되는 김의 해적생물은?

- ① 따개비 ② 규조류
③ 파래류 ㉔ 매생이

56. 우량 품질의 마른 김 제품을 만들기에 적합한 생장 일령은?

- ① 30일 전후 ② 40일 전후
㉓ 50일 전후 ④ 60일 전후

57. 공장폐수가 유입된 어장에서 김의 암종병이 발생하는 조건은?

- ① 노출시에 찬바람을 많이 받았을 때
② COD의 농도가 높은 때
㉓ 공장 폐수 등의 영향을 강하게 받았을 때
④ 저온에 오래 노출 되었을 때

58. 미역 가이식의 필요성에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부니와 잡생물의 제거 작업 또는 싹녹음 예방을 위한 대 피 작업이 용이하다.
② 배우체의 성숙과 수정이 오랫동안 계속 일어나기 때문에 배우체가 씨줄틀에 밀접해 있는 것이 유리하다.
③ 광선도 고루 잘 받고 조류소통도 잘 되어 발아, 성장이 빠르다.
㉔ 아포체가 육안적인 크기 이후일 때에는 가이식한 것이 본 양성시설을 한 것보다 빠르다.

59. 미역의 아포체 시기 이후의 생장 방법은?

- ① 연변생장 ② 침단생장
㉓ 개재생장 ④ 확산생장

60. 다음 해조류 중 포자체와 배우자체가 동형인 것은?

- ① 곰피 ② 김
③ 미역 ④ 파래

4과목 : 수산생물

61. 새우류의 발생단계가 아닌 것은?

- ① 노우플리우스 ② 미시스
③ 메갈로파 ④ 조애아

62. 다음 해역 중 순생산량이 높은 것부터 바르게 정리된 것은?

- ① 외양 >연안 >용승해역 ② 연안 >용승해역 >외양
③ 용승해역 >외양 >연안 ④ 용승해역 >연안 >외양

63. 어류의 성장에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 모든 조건이 동일하면 염분이 높을수록 성장이 빠르다.
② 적은 범위 내에서는 수온이 높으면 성장이 빠르고 낮으면 느리다.
③ 모든 조건이 동일하면 먹이의 공급여부가 성장을 좌우한다.
④ 모든 조건이 동일하면 용적이 넓을수록 성장률이 빠르다.

64. 우뚝가사리(*Gelidium amansii*)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 다년생이다.
② 사분포자 또는 과포자를 형성한다.
③ 난류성이다.
④ 세대교번을 하지 않는다.

65. 대형 플랑크톤(Macroplankton)의 크기는?

- ① 2 ~ 20 μm ② 20 ~ 200 μm
③ 0.2 ~ 20 mm ④ 2 ~ 20 cm

66. 산란을 위하여 바다에서 강으로 올라오는 습성을 갖는 어종은?

- ① 연어 ② 잉어
③ 뱀장어 ④ 미꾸라지

67. 다음 중 일생동안 부유생활을 하는 것은?

- ① 완족류 ② 유폐류
③ 익족류 ④ 이새류

68. 일반적인 해조류의 주된 영양소 흡수기관은?

- ① 뿌리 ② 줄기
③ 몸 표면 전체 ④ 뿌리와 줄기

69. 우뚝가사리의 생태와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 포복지에 의한 번식 ② 유주자 방출
③ 재생력 ④ 사분포자 방출

70. 생물학적 최소형(Biological minimum size)을 결정하는 가장 중요한 요건은?

- ① 어장에의 가입 ② 색채의 구비
③ 생식능력의 구비 ④ 종 특성의 완성

71. 갑각류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 몸은 보통 두부와 흉부로 되어 있다.
② 몸은 보통 두부, 흉부와 복부로 나누어지나 흉부와 복부가 합쳐진 것이 많다.
③ 몸은 보통 두부, 흉부, 복부로 나누어지나 두부와 흉부가 합쳐진 것이 많다.
④ 몸은 보통 두부, 흉부, 복부, 족부로 된 것이 많다.

72. 생태계 구성 요소 중에서 분해자는?

- ① 박테리아 ② 식물플랑크톤
③ 동물플랑크톤 ④ 미세 조류

73. 다음 중 가장 유독한 적조생물은?

- ① *Peridinium sp.* ② *Chaetoceros sp.*
③ *Gymnodinium sp.* ④ *Skeletonema sp.*

74. 다음 해산 식물 중 갈조류에 속하는 것은?

- ① 청각 ② 감태
③ 김 ④ 우뚝가사리

75. 다음 어류 중 연지류에 속하지 않는 것은?

- ① 철갑상어 ② 용상어
③ 노랑가오리 ④ 농어

76. 해양생물이 부력을 증가시키기 위한 수단이 아닌 것은?

- ① 돌기물 ② 지방축적
③ 부레 ④ 각질층

77. 수중의 먹이연쇄에 관한 다음의 설명 중 가장 적합한 것은?

- ① 먹이연쇄의 마지막 단계에 가까울수록 단위 개체의 크기가 커지고 개체 수는 적어진다.
② 일반적으로 먹이연쇄의 계급 수는 2로써 많다고 더라도 3을 넘지 않는다.
③ 먹이연쇄의 마지막 단계에 가까울수록 운동성이 커지면 에너지 소비는 적어진다.
④ 먹이연쇄의 초기 단계에서는 운동성이 약하나 에너지 소비는 많은 편이다.

78. 다음 중 적조 발생 방지 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 준설 ② 해조류 양식
③ 양식장 휴식년제 ④ 치어의 방류

79. 분류학상 따개비가 속하는 것은?

- ① 갑각류 ② 복족류
③ 이매패류 ④ 극피동물

80. 다음 새우 중 분류학적으로 연관관계가 가장 먼 것은?

- ① 대하 ② 중하
③ 젓새우 ④ 보리새우

5과목 : 수질분석 및 양식생물

81. 오염된 시수를 채수한 경우 몇 시간 이내에 분석을 마쳐야 하는가?

- ① 48시간 ② 24시간

③ 12시간

④ 6시간

82. 다음 중 수중의 암모니아 측정에 이용하는 방법은?

① 이온전극법

② 비탁법

③ 중량분석법

④ 불꽃광도법

83. 시료 20 mL를 사용하여 어떤 성분을 정량한 결과 28μg이 함유되어 있었다. 이 성분의 ppm 농도는? (단, 시료비중은 1로 본다)

① 28 ppm

② 2.8 ppm

③ 14 ppm

④ 1.4 ppm

84. 채수시 물과 공기의 접촉을 피해야 하는 측정 항목은?

① 용존산소

② 화학적 산소 소비량

③ 수소이온 농도

④ 암모니아

85. 복어류의 아가미에 기생하여 흡혈을 함으로서 피해를 입히는 충으로 충체는 가늘고 긴 방추형이며 뒤 끝의 고착반에 4쌍의 파악기를 가지고 있는 형태의 충은?

① 헤테로보스리움

② 자이로탁티루스

③ 헤타락신

④ 비바기나

86. 어류의 단백질 분해 이후 분해산물의 배설 형태는?

① 요소

② 요산

③ 요소와 요산의 혼합

④ 암모니아

87. 무지개 송어의 비브리오병 증세가 아닌 것은?

① 표면의 융기된 환부가 형성되며, 부풀어 올라 부스럼 같이 된다.

② 근육에 궤양이 형성되며, 체표의 큰 팽윤 환부를 볼 수 있다.

③ 간장과 생식소에 정상 출혈이 나타난다.

④ 근육환부는 초기에는 단지 근육내 출혈만 보인다.

88. 송어의 복부가 부풀어 오르고, 천천히 헤엄치는 개체가 발견되어 해부하여 보니 위가 심하게 확장되어 있고, 위 속에 회갈색의 액체와 기포가 많이 들어있었다면 그 원인으로 생각되는 것은?

① *Saprolegnia* sp.② *Candida* sp.③ *Branchiomyces* sp.④ *Dermocystium* sp.

89. 무지개 송어가 virus성 질병에 감염되었을 때 폐사율을 최소한으로 줄일 수 있는 방법은?

① 항생제의 지속적인 경구 투여

② 설파제의 약욕처리

③ 영양가 높은 사료 투여

④ 사육수온보다 수온을 올려줌

90. 해수의 투명도를 측정하는데 이용하는 기구는?

① 난센병

② 세키 디스크

③ 바라스 샘플러

④ 포렐 시약

91. 전기 전도도를 이용하여 염분을 측정할 때 측정치에 가장 크게 영향을 미치는 요소는?

① 수온

② pH

③ 투명도

④ 색도

92. 시안화물 측정용 시료수를 사정에 의하여 채수 다음 날 분석을 하고자 한다. 시료수에 어떤 처리를 해두는 것이 좋을까?

① 수산화나트륨으로 pH를 12로 해둔다.

② 염산으로 pH를 1로 한다.

③ 완충제로 pH를 7 ~ 8로 한다.

④ 포르말린으로 미생물을 제거한다.

93. 채수현장에서 미생물 활동 억제제를 사용하였다면 다음 중 어느 항목을 정확히 측정할 수 없는가?

① DO

② BOD

③ COD

④ pH

94. 체내에 투입되어 특정한 질병 원인체에 대응하는 항체를 체내에 생성시켜 특정 질병에 감염되는 것을 예방할 목적으로 사용되어지는 생물학적 제제는?

① 합성항균제

② 항생물질

③ 푸란제

④ 백신제

95. 뱀장어의 아가미에 기생하는 흡충은?

① *Chilodonella*② *Trichodina*③ *Pseudodactylogyrus*④ *Ichthyophthirius*96. 담수에 기생하는 요각류 중 *Ergasilus*가 닳벌레에 비해 사망률이 높은 이유로 가장 적절한 것은?

① 아가미에 시생하여 호흡곤란을 일으키므로

② 체표에 기생하여 체표에 궤양이 형성되므로

③ 구강 내에 기생하여 먹이 섭취가 곤란하므로

④ 기생에 따른 스트레스로 어체가 쇠약해지기 때문

97. 다음 약제 중 항생물질이 아닌 것은?

① 옥시테트라사이클린

② 에리스로마이신

③ 옥소리산

④ 설파메라진

98. 어류에 비타민 B가 부족한 사료를 투여했을 때, 나타나는 결핍증과 관계가 없는 것은?

① 표피 염증 유발

② 평형감각 상실

③ 식욕부진

④ 척추골의 이상변이

99. 종점판정에 pH 지사약을 쓴 용량분석법은?

① 중화적정법

② 산화환원적정법

③ 침전적정법

④ 킬레이트적정법

100. 백점병에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 온수성 양어장에서 연중 발병한다.

② 치어지, 월동지, 저수지의 치어에 큰 피해를 준다.

③ 체표 기생시 보다 아가미 기생시에 폐사율이 높다.

④ 해산 백점병은 20 °C 이상에서 잘 번식하고 15 °C 이하에서는 잘 발병하지 않는다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	③	③	④	③	②	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	④	②	②	①	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	④	①	②	④	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	①	②	①	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	③	③	④	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	①	④	③	③	④	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	④	④	①	③	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	②	④	④	①	④	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	④	①	①	④	①	②	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	②	④	③	①	③	④	①	①