Energieäquivalenz und dynamische Raumzeit

Reproduzierbare Modellprüfung einer Energie-Gleichheitskette

QIK-VRT Forschungsnotiz · 3. November 2026 · Arbeitsfassung zur fachlichen Prüfung

Fragestellung und Forschungsauftrag: Ingolf Lohmann. Modellimplementierung, Rechnung und Ausarbeitung: OpenAI Codex. Diese Zuordnung ersetzt keine inhaltliche Autorenfreigabe oder unabhängige Begutachtung.

Kurzfassung

Untersucht wird die Gleichheitskette $E = mc^2 = pc = k_B T \ln(2) I = G m_1 m_2 / r$. Eine explizite Parameterwahl kann ihre Terme auf denselben Energiewert beziehen. Daraus folgt keine universelle Identität dieser Größen für dasselbe physikalische System. Zusätzlich wurde ein dynamisches FLRW-Modell mit Materie, Strahlung und Vakuumenergie numerisch integriert. Im räumlich geschlossenen Modell wird die Materialenergie über die gesamte kompakte Raumfläche integriert. Diese wohldefinierte, schnittabhängige Größe wird ausdrücklich von einer globalen Energie einschließlich Gravitation unterschieden. Die abschließende Ausführung besteht 48 spezifizierte Kontrollen. Das Ergebnis ist eine reproduzierbare Modellprüfung bekannter Beziehungen; eine neue empirische Naturgesetzbestätigung oder wissenschaftliche Neuheit ist damit nicht nachgewiesen.

1. Welche Aussage wird geprüft?

Eine universelle Gleichheitskette müsste bei unveränderter Bedeutung der Symbole für alle zugelassenen Systeme gelten. Die übliche Energie-Impuls-Beziehung eines relativistischen Systems lautet $E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$; m_0 ist die invariante Masse. Im Ruhesystem gilt $E_0 = m_0 c^2$. Für einen masselosen Träger gilt $E = pc$. Setzt man für dasselbe System gleichzeitig $E = m_0 c^2 = pc$, folgt $E^2 = 2E^2$ und damit $E = 0$. Bereits ein ruhender Körper mit $m_0 > 0$ und $p = 0$ liefert ein Gegenbeispiel zur uneingeschränkten positiven Gleichheitskette [1].

Die Landauer-Beziehung betrifft einen Prozess: Bei isothermer idealisierter Löschung unabhängiger, gleichwahrscheinlicher Bits in einem symmetrischen Speicher beträgt die Untergrenze der mittleren Wärmeabgabe $k_B T \ln(2)$ je Bit. Allgemeiner kann I eine entsprechend definierte Entropieverringerung in Bits bezeichnen. Gleichheit ist eine Idealgrenze unter geeigneten thermodynamischen Voraussetzungen, keine Energieformel für beliebige gespeicherte Inhalte [2].

Newtonsche gravitative potentielle Energie zweier punktförmiger oder geeigneter kugelsymmetrischer Körper ist bei Nullpunkt im Unendlichen $U = -Gm_1m_2/r$. Der positive Term der Grafik kann daher den Betrag dieser Energie oder eine passend definierte Energiefreisetzung bezeichnen. Die Newtonsche Näherung benötigt schwache Felder und einen eindeutig bestimmten Zweikörperprozess.

2. Eine konstruktiv richtige, bedingte Lesart

Für positive Größen E, c, k_B, T, G, m_1 und m_2 lassen sich folgende Größen definieren:

$$m_{eq} = E/c^2;\ p_{gamma} = E/c;\ I = E/[k_B T \ln(2)];\ r = Gm_1m_2/E.$$

Einsetzen ergibt die Gleichheitskette exakt. Dabei ist m_{eq} das Massenäquivalent der gewählten Energie, p_{gamma} der Impuls eines masselosen Trägers und r der aus der Gleichsetzung bestimmte Abstand. Diese Größen müssen nicht zu demselben System gehören. Der Abstand wird in dieser

Konstruktion definiert und nicht unabhängig vorhergesagt. Thermodynamische Umsetzbarkeit, verfügbare Arbeit und ein tatsächlicher Wandler sind zusätzliche Anforderungen.

Die Ausführung prüft vier solche Parameterbeispiele. Für die Zweikörperterme werden die Massen so groß und die Bindungsenergien so klein gewählt, dass $G(m_1+m_2)/(rc^2) < 10^{-4}$ bleibt. Diese notwendige Prüfung der Schwachfeldnähe ist kein Nachweis einer real gebauten Energieumwandlung. Die konstruktive Lesart trägt somit eine bedingte Energieäquivalenz, nicht die uneingeschränkte Naturgesetzbehauptung.

3. Kosmologischer Gegenstand und Energiedefinition

Die Allgemeine Relativitätstheorie liefert lokale kovariante Energie-Impuls-Erhaltung. Für eine allgemeine expandierende Raumzeit folgt daraus keine beliebige beobachterunabhängige und erhaltene globale Energie einschließlich Gravitation. Solche Energiebegriffe erfordern zusätzliche Struktur, etwa geeignete Symmetrien oder Randbedingungen [3]. Eine mathematische Außenansicht eines Modells schafft diese Struktur nicht von selbst.

Hier wird deshalb eine begrenzte, explizite Größe berechnet: das Integral der von mitbewegten Beobachtern gemessenen Energiedichte über einen räumlichen Schnitt. Im Hauptfall ist der Schnitt eine vollständige kompakte Dreisphäre. Der berechnete Wert ist die Materialenergie einschließlich des als Fluid beschriebenen Vakuumanteils. Er ist keine zusätzlich konstruierte globale Gravitationsenergie und keine gemessene Gesamtenergie unseres Universums.

Die gewählte Metrik lautet, in den unten festgelegten Einheiten:

$$ds^2 = -d\tau^2 + [a(\tau)L]^2 [d\chi^2 + \sin^2\chi\, d\Omega^2]; 0 \le \chi \le \pi.$$

Der FLRW-Ansatz und die räumliche Topologie werden vorausgesetzt. Dynamisch berechnet wird $a(\tau)$. Die Metrik wird hier nicht aus Informationsspeichern oder einem nichtgeometrischen Grundmodell hergeleitet. Die Rechnung belegt deshalb keine Entstehung einer eigenständigen physikalischen Raumzeit im ausführenden Assistenzsystem.

4. Gleichungen, Parameter und Beobachter

Es werden normierte Einheiten $c = G = H_{ref} = k_B = 1$ verwendet. Der Ausgangszeitpunkt ist $\tau = 0$ mit $a = 1$ und $a' = 1$. Die kritische Referenzdichte ist $\rho_c = 3/(8\pi)$. Für das geschlossene Hauptmodell gelten $\Omega_m = 0{,}3$, $\Omega_r = 0{,}0001$ und $\Omega_v = 0{,}7999$. Damit ist $K = \Omega_m + \Omega_r + \Omega_v - 1 = 0{,}1$ und $L = K^{-1/2}$. Diese Werte sind illustrative Eingaben und keine Parameterschätzung aus astronomischen Daten.

$$H^2 = (8\pi/3)(\rho_m + \rho_r + \rho_v) - K/a^2; H = a'/a.$$

$$a'' = -(4\pi/3)a(\rho_m + 2\rho_r - 2\rho_v).$$

Die getrennten Kontinuitätsgleichungen lauten $\rho_m' = -3H\rho_m$, $\rho_r' = -4H\rho_r$ und $\rho_v' = 0$. Die Drücke sind $p_m = 0$, $p_r = \rho_r/3$ und $p_v = -\rho_v$. Die vollständige Raumfläche besitzt das Eigenvolumen $V = 2\pi^2(aL)^3$. Es folgt:

$$E_{mat} = V(\rho_m + \rho_r + \rho_v); dE_{mat} = -p_{total}\, dV.$$

Diese integrierte Druck-Arbeit-Relation auf den gewählten Raumschnitten benötigt keinen äußeren Kolben oder einen Beobachter außerhalb des Universums. Sie darf auch nicht als Konstruktion eines beliebigen globalen Energievorrats interpretiert werden.

Ein radialer Lichtstrahl wird mit $\chi' = 1/(aL)$ verfolgt. Für einen vernachlässigbar schwachen Testphotonen-Puls gilt $E_{gamma}' = -H\, E_{gamma}$. Die lokale Photonenergie ist vom mitbewegten Beobachter gemessen. Ein zusätzlicher Rechenlauf mit der Zeitkoordinate $\lambda = 3\tau$ prüft dieselbe

Lösung unter einer Zeitkoordinatenänderung. Er ist keine unabhängige astronomische Beobachtung und keine Untersuchung sämtlicher Beobachterwechsel.

5. Ausführung und Kontrollen

Der Quelltext run_experiment.py verwendet ausschließlich die Python-Standardbibliothek. Integriert wird von $\tau = 0$ bis $\tau = 1$ mit klassischem Runge-Kutta vierter Ordnung und 800 Schritten. Der Zustandsvektor enthält a, a', drei Dichten, die radiale Nullkoordinate, die Testphotonen-Energie und das Integral von -p dV. Die erste Friedmann-Gleichung wird als Kontrolle verwendet; die Hauptintegration entwickelt die Beschleunigung und Dichten. Eine zweite Formulierung entwickelt a direkt aus der ersten Friedmann-Gleichung und analytischer Fluidverdünnung.

Als Vergleichsfälle dienen flache reine Materie-, reine Strahlungs- und reine Vakuummodelle. Ihre bekannten Lösungen sind $a = (1 + 3\tau/2)^{2/3}$, $a = (1 + 2\tau)^{1/2}$ und $a = \exp(\tau)$. Die endliche Zelle dieser flachen Vergleichsfälle wird nicht als gesamtes unendliches Universum ausgegeben.

Die 48 Kontrollen umfassen Friedmann-Residuen, Materie- und Strahlungsverdünnung, Druck-Arbeit-Bilanz, Rotverschiebung, einen bedingten Informationsdeckel, analytische Lösungen, zwei ODE-Formulierungen, die Zeitkoordinatenänderung, eine geometrische Krümmungskontrolle, Schrittweitenkonvergenz, Negativkontrollen und die konstruierten Energieäquivalenzen. Ein absichtlich umgekehrtes Vorzeichen der Photonengleichung wird erkannt. Ebenso wird die falsche Annahme einer konstanten Materialenergie im gewählten Mischmodell zurückgewiesen.

6. Ergebnisse

Größe	Anfang	Ende	Bedeutung
Skalenfaktor a	1	2.518897465	Geometrie
Materieenergie	22.3528236	22.3528236	Druckloser Anteil
Strahlungsenergie	0.007450941199	0.002958016872	Verdünnung und Rotverschiebung
Vakuumenergie	59.60007865	952.5292062	Konstante Dichte
Materialenergie gesamt	81.96035319	974.8849878	Vollständiger S^3-Schnitt
Testphotonen-Energie	10	3.969990895	Mitbewegter Beobachter

Im geschlossenen Hauptmodell wächst der Skalenfaktor auf 2,5188974648. Die Materialenergie wächst von 81,9603531928 auf 974,8849877975 normierte Energieeinheiten. Der Anstieg beträgt 892,9246346046 und stimmt mit dem integrierten Term -p dV überein. Der Staubanteil bleibt konstant, die Strahlungsenergie fällt proportional zu 1/a und der Vakuumanteil wächst proportional zu a^3. Das ist das erwartete Verhalten der vorausgesetzten Fluidgleichungen, kein neuer experimenteller Befund.

Das größte relative Residuum der Druck-Arbeit-Bilanz beträgt $9{,}78 \times 10^{-14}$; das Friedmann-Residuum erreicht $8{,}44 \times 10^{-14}$. Eine getrennte Auswertung der analytischen Materialenergieformel am numerisch bestimmten Endwert von a stimmt bis zu einer relativen Differenz von $7{,}55 \times 10^{-14}$ überein. Beim Halbieren der Schrittweite sinkt der Fehler im Materievergleich um Faktoren 16,53, 16,27 und 16,14. Das entspricht im untersuchten Bereich der erwarteten vierten Ordnung. Diese Werte sind numerische Residuen in einem Modell und keine Messunsicherheiten astronomischer Daten.




Abbildung 1. Geschlossenes illustratives FLRW-Modell; keine astronomischen Messdaten. Durchgezogene und gestrichelte Kurven der Bilanz bzw. Rotverschiebung liegen innerhalb der angegebenen Residuen übereinander.

7. Bedingter Informationsanschluss

Zusätzlich wird für den Testpuls ein ausdrücklich angenommener nutzbarer Arbeitsanteil η = 1/2 und eine Referenzbadtemperatur T = T₀/a betrachtet. Aus einer vorausgesetzten Landauer-Schranke und W_nutzbar = ηE_gamma ergibt sich:

$$I_{max} = \eta E_{gamma}/[k_B T \ln(2)].$$

Da sowohl E_gamma als auch T proportional zu 1/a abnehmen, bleibt diese bedingte Obergrenze konstant: 7,2134752044 Bits für E_gamma(0) = 10 und T₀ = 1. Die Rechnung modelliert weder einen Löschapparat noch einen Wandler. Insbesondere kann aus thermischer Gleichgewichtsstrahlung nicht ohne zusätzliche Nichtgleichgewichtsressource beliebig Arbeit gewonnen werden. Der Testpuls wird hier als vernachlässigbare separate Ressource behandelt; die Verfügbarkeit des angesetzten Arbeitsanteils bleibt eine Prämisse.

8. Nachweisstatus und offene Forschungsfragen

Die numerische Modellprüfung ist ausgeführt und protokolliert. Die Parameterkonstruktion und die Bilanzableitungen sind elementare mathematische Folgerungen der angegebenen Definitionen und Annahmen; für die neue kosmologische Rechnung wird kein Lean-Kernelbeleg beansprucht. Unabhängige physikalische Messung, neue Naturgesetze, wissenschaftliche Neuheit, Begutachtung und eine universelle Gleichheit aller Posterterme sind nicht nachgewiesen.

Die früheren sechs Lean-Quellen bleiben als eigener Vorgänger erhalten. Ihr Budgetsatz setzt die mit landauer bezeichnete Ungleichung voraus und verwendet Transitivität. Er beweist dadurch nicht deren physikalische Korrespondenz. Die historischen Kernelprüfungen sind im Arbeitsjournal berichtet; ihre vollständigen damaligen Rohlogs wurden in dieser Nachprüfung nicht

wiedergewonnen. Neu ausgeführte Rechnungen werden nicht rückwirkend zu historischen Ausführungsbelegen erklärt.

Ein weiterführendes Forschungsprogramm benötigt einen präzisen Geltungsanspruch: Welche Energie soll invariant sein, welche Größen werden unabhängig gemessen, und welche Vorhersage unterscheidet das vorgeschlagene Modell von den bekannten Beziehungen? Für eine Behauptung emergenter Lorentz-Geometrie wäre zusätzlich eine Herleitung der Metrik aus einem andersartigen Ausgangsmodell einschließlich eines überprüfbaren Grenzübergangs nötig. Für eine experimentelle Kopplung von Gravitation und Informationslöschung wären ein realer Prozess, Kalibrierung, Verlustbilanz und unabhängige Messungen erforderlich.

9. Reproduktion und Persistenz

Ausführung: python3 -B run_experiment.py --output results. Der Prozess muss Exit 0 liefern. RESULTS.json enthält jeden Kontrollnamen, die Parameter, Toleranzen, Grenzen und den Quell-SHA-256. closed_mixed_trajectory.csv enthält 801 Zustände einschließlich des Anfangszustands. Die Ausführungsverzeichnisse erhalten stdout, stderr und Prozessbelege beider Iterationen. Die erste Ergebnisdatei wurde nach Wiederverwendung ihres Pfads aus dem erhaltenen ersten Quelltext bytegleich reproduziert; dieser Vorgang ist als neue Reproduktion gekennzeichnet.

README.md und ENTRY_INDEX.json bilden den schnellen Einstieg. CLAIM_MATRIX.json trennt Aussagen, Nachweise und Grenzen. Das Dateimanifest bindet die exakten Artefakte. Quellarchivierung, Main-Aufnahme, öffentliche Zenodo-Veröffentlichung und produktive IONOS-/EAP-Wirkung bleiben getrennte Zustände. Diese Arbeitsfassung beansprucht keine DOI und keine erfolgte Produktivierung.

Quellen

[1] Robert F. Mudde: Classical Mechanics & Special Relativity for Starters, Kapitel 20, TU Delft. Energie-Impuls-Beziehung und masselose Teilchen. https://interactivetextbooks.tudelft.nl/classical-mechanics-and-special-relativity/content/ChXX0_FourMomentum.html

[2] Y. Jun, M. Gavrilov und J. Bechhoefer: High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap. Physical Review Letters 113, 190601 (2014). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.190601

[3] M. Trodden und S. M. Carroll: TASI Lectures: Introduction to Cosmology, Abschnitt 2.2, Friedmann-Gleichungen, Kontinuität und kosmologische Komponenten. https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept03/Trodden/Trodden2_2.html

[4] Ingolf Lohmann: Charta einer maschinenprüfbaren Wissenschaft. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21515074. Kanonischer SHA-256: 7fb4e5c369b079e93ce409e9ca4f6830476a1b6dbd42543273d85164e111a631. Verwendet für Nachweisklassifikation und Provenienz, nicht als unabhängiger Physiknachweis.

Lizenz der neuen Textfassung: CC-BY-NC-ND-4.0. Die konkrete Implementierung besitzt ihren eigenen Lizenzhinweis. Die Darstellung ist eine Arbeitsfassung; ihre wissenschaftliche Neuheit ist nicht festgestellt.