



Extracciones especiales

Determinación	Tubo	Indicaciones especiales
Dimero D	Coagulograma tapa celeste	Centrifugar 10 min y separar el plasma en un tubo seco
Vitamina A	Suero	Centrifugar y separar el suero en un tubo negro para proteger de la luz
Vitamina B6	Plasma Edta	Centrifugar y separar el plasma en tubo negro para proteger de la luz
Vitamina C	Suero en tubo seco sin gel	Desproteínice inmediatamente de extraída la muestra, para ello transfiera 200 µL de suero o plasma EDTA a un Eppendorf que contiene 200 µL de desproteínizante. Agite vigorosamente (vortee) y mantenga 20 minutos a 4°C. Transcurrido ese tiempo, sin separar el sobrenadante ni centrifugar, congele a -20 y en tubo negro al abrigo de la luz.
Vitamina E	Suero en tubo seco sin gel	Centrifugar y separar en tubo negro
PTH paratohormona	Plasma EDTA	Centrifugar el plasma y separar en tubo seco
ACTH	Plasma EDTA	Centrifugar el plasma y separar en tubo seco
CD4 y Carga Viral	Edta 3 tubos	Mandar 2 tubos de hemograma y uno de los tubos centrifugarlo y separar el plasma en tubo seco.
Manganeso	Sangre heparina o edta	Mandar sangre entera, no separar.
HIV y hepatitis	Suero	Sacar 2 tubos para poder ratificar el resultado
Western blot	Suero	Separar muestra
Hidroxipireno, Acido TT muconico, metanol, metil hipúrico, floururo.	Orina ocasional	
Fibrinogeno	Coagulograma	Separar plasma y enviar en tubo seco