

# CAT(0) 立方複体とパーコレーション

CHOI, INHYEOK (チョイ・インヒョック)

ABSTRACT. 本論文では著者と Donggyun Seo が [CS25] で扱った群のケイリーグラフ上のパーコレーションを CAT(0) 立方複体の言語を通じて新たに解釈する。併わせて、群上のパーコレーションと CAT(0) 立方複体の幾何学の基礎について説明する。

(Abstract in English) In [CS25], the author and Donggyun Seo proved the existence of infinitely many infinite clusters in a random subgraph of certain Cayley graphs. We provide an alternative proof of this result for CAT(0) cubical groups in terms of halfspaces.

This paper is expository, aiming at an invitation to percolation on infinite groups and/or CAT(0) cubical geometry.

**キーワード.** パーコレーション、ケイリーグラフ、CAT(0) 立方複体

## 1. 初めに

幾何学的群論の主要な哲学の一つは、群が距離空間に等長写像として作用するとき、その作用の性質から群の幾何学的性質を読み取ることである。このために使われる距離空間として CAT(0) 立方複体 (CAT(0) cube complex) というものがある。本論文では CAT(0) 立方複体上の真正かつコンパクトで既約な作用 (proper, cocompact and irreducible action) をもつ群の幾何学を考察する。これに基づき、そのような群のケイリーグラフ上のパーコレーションが表すある性質を証明する。

この結果はより一般的な設定において既に知られていることを述べておく。具体的には、著者と Donggyun Seo は [CS25] で非円筒的双曲群 (acylindrically hyperbolic group) に対して同様の結果を証明した。本論文で扱う群は全て非円筒的双曲性をもつため、下記の定理 [1] は本質的に新しいものではない。しかしながら、定理 [1] を CAT(0) 立方複体の幾何学を用いて新たに証明することが目標である。すなわち、本論文の趣旨は、(1) 読者を CAT(0) 立方複体の幾何学へ招待すること、並びに (2) 双曲幾何学の言語で書かれた確率論的結果を CAT(0) 立方複体の枠組みで再解釈することにある。

まず幾何学的な設定を述べる。有限生成群  $G$  とその有限生成集合  $S$  が与えられたとき、 $G$  の元を頂点とし、 $S$  の元に関連されている元の対を辺で結ぼう。すなわち  $g^{-1}h \in S$  を満たす  $g, h \in G$  に対して辺  $\overline{gh}$  を結ぶのである。このように定義されるグラフ  $\Gamma = \text{Cay}(G, S)$  を  $S$  に関する  $G$  のケイリーグラフ (Cayley graph) と呼ぶ。

次に、確率過程を一つ導入する。0 と 1 の間の実数  $p$  を固定する。表が出る確率  $p$ 、裏が出る確率  $1-p$  の硬貨を  $\Gamma$  の各辺に一つずつを置こう。全ての硬貨を独立に投げ、表が出た辺だけ残し、裏が出た辺は消す。この操作によって得られる部分グラフを  $\Gamma[p]$  と記す。直感的には、 $\Gamma[p]$  は  $\Gamma$  のおよそ  $p$  割を保持したランダムな部分グラフとみなせる。この確率的グラフの連結成分

のうち、無限に大きい成分がいくつあるかを調べたい。これに関する本論文の主要な定理を以下に述べる。

**Theorem A.**  $CAT(0)$  立方複体  $X$  と有限生成群  $G$  を一つ考える。このとき  $G$  が  $X$  に真正かつコンパクトかつ既約に作用すると仮定する。さらに、 $G$  は整数群  $\mathbb{Z}$  と同型な有限指数部分群 (*finite-index subgroup*) を持たないとする。

このとき、 $G$  の任意の限生成集合  $S$  に対して、ある実数  $0 < p < 1$  が存在し、 $G$  のケイリーグラフ  $\Gamma = Cay(G, S)$  の  $p$ -ランダム部分グラフ  $\Gamma[p]$  の無限=非有界連結成分が無限に多い確率が1である。

今論じている確率過程をパーコレーション (percolation process) と呼ぶ。グラフ上のパーコレーションおよび  $CAT(0)$  立方複体に関する理論は極めて膨大であり、その全てを紹介することは不可能である。だが、定理の証明に必要な基礎だけはきちんと説明しよう。この内容はいずれも既知の結果であり、次の参考文献の一部を要約したものである。

- Geoffrey Grimmett, Percolation [BK89].
- Hugo Duminil-Copin, Introduction to Bernoulli percolation [DC18].
- Wolfgang Woess, Random walks on infinite graphs and groups [Woe00].
- Russell Lyons and Yuval Peres, Probability on trees and networks [LP16].
- Thomas Hutchcroft, Percolation on hyperbolic graphs [Hut19].
- Michah Sageev, Ends of group pairs and non-positively curved cube complexes [Sag95].
- Pierre-Emmanuel Caprace and Michah Sageev, Rank rigidity for  $CAT(0)$  cube complexes [CS11].
- Anthony Genevois, Algebraic properties of groups acting on median graphs [Gen24].

まずパーコレーションを二つの章にわたって説明する。第2章ではパーコレーションの理論を概説し、本論文における議論の背景を与える。第3章では  $CAT(0)$  立方複体上に作用する群の二つの幾何学的性質を述べ、これらを用いてパーコレーションに関する結果を導く。

続いて、 $CAT(0)$  立方複体の理論を述べる。第4章では  $CAT(0)$  立方複体と本質的に等しい対象である中点グラフ (median graph) を紹介する。第5章では中点グラフの幾何学において重要な概念である超平面 (hyperplane)、半空間 (halfspace) およびそれらの鎖 (chain) を導入する。その後、パーコレーションに関連する  $CAT(0)$  立方複体の幾何学的性質、例えば「手品補題<sup>1</sup>」(命題6.1) を第6章および第7章で証明する。第8章ではより詳細な  $CAT(0)$  立方複体の幾何学を展開する。

既存の文献に現れていない議論は、第6章および第7章に限られている。したがって、読者がもし望めば、第3.1節のみを読んだ後、これらの章に進んでも差し支えない。また、パーコレーションの理論と  $CAT(0)$  立方複体の幾何学は、互いに独立に読んでも問題はない。

## 2. 背景の紹介

本章では、今後考察する問題を設定し、関連する歴史的背景を概説するが、証明は一切与えない。内容としては、第2.1節のみを読めば、第4章以降を理解するのに困難はない。しかしながら、初めてパーコレーションに接する読者には、本章全体に軽く目を通しておくことを勧める。

<sup>1</sup>僕が名付けたものではありません。

2.1. **グラフと群.** 本稿における**グラフ (graph)** は頂点集合  $\mathcal{V}$  と辺集合

$$\mathcal{E} \subseteq \binom{\mathcal{V}}{2} := \{S \subseteq \mathcal{V} : \#S = 2\}$$

からなる概念である。この慣習では自分自身を結ぶ辺である自己ループや、複数の辺が同じ頂点対の間を結ぶ多重辺は許さない。

辺  $e = \{v, w\} \in \mathcal{E}$  に対し、 $v$  および  $w$  を  $e$  の**端点 (endpoint)** と呼び、 $e = \overline{vw}$  と表記する。また、二つの辺  $e, f \in \mathcal{E}$  が一つの端点を共有するとき、それらは**隣接している (adjacent)** と言う。二つの頂点  $v, w$  がある辺で繋がれているときにもそれらが隣接しているといい、 $v \sim w$  と書く。

頂点集合の部分集合  $A \subseteq \mathcal{V}(\Gamma)$  が与えられたとき、

$$\partial_{\mathcal{E}} A := \{\overline{xy} \in \mathcal{E}(\Gamma) : x \in A \text{ かつ } y \notin A\}$$

を  $A$  の**境界 (boundary)** と呼ぶ。この定義では辺を集めた一方、

$$\partial_{\mathcal{V}} A := \partial_{\mathcal{E}} A \cap A = \{x \in A : x \sim y \text{ を満たす } A \text{ の外にある頂点 } y \notin A \text{ が存在する}\}$$

もまた  $A$  の境界と呼ぶ。文脈上混乱の恐れがない場合には、両方とも単に  $\partial A$  と記す。

グラフ  $\Gamma = (\mathcal{V}(\Gamma), \mathcal{E}(\Gamma))$  の辺集合の部分集合  $\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E}(\Gamma)$  で作られたグラフ  $\Gamma' = (\mathcal{V}, \mathcal{E}')$  を  $\Gamma$  の**部分グラフ (subgraph)** と呼ぶ。このとき、次の表記を導入する：

$$\Gamma \setminus \Gamma' := (\mathcal{V}(\Gamma), \mathcal{E}(\Gamma) \setminus \mathcal{E}').$$

グラフ  $\Gamma$  の頂点列  $v_0, v_1, \dots, v_n$  に対し、 $e_1 := \overline{v_0 v_1}, \dots, e_n := \overline{v_{n-1} v_n}$  がいずれも  $\Gamma$  の辺であれば、これら頂点と辺からなるグラフ  $\Gamma' := (\{v_0, \dots, v_n\}, \{e_1, \dots, e_n\})$  を  $\Gamma$  上の長さ  $n$  の**経路 (path)** と呼ぶ。このとき、経路の長さを  $\text{len}(\Gamma') = n$  と定義する。

経路  $\Gamma'$  の始点と終点が一致する場合、 $\Gamma'$  を**回路 (circuit)** と呼ぶ。すなわち、頂点列  $v_1, \dots, v_n$  に対しても  $e_1 := \overline{v_n v_1}, \dots, e_n := \overline{v_{n-1} v_n}$  がいずれも  $\Gamma$  の辺であるとき、 $\Gamma' := (\{v_1, \dots, v_n\}, \{e_1, \dots, e_n\})$  を  $\Gamma$  上の長さ  $n$  の回路と呼ぶ。特に  $v_1, \dots, v_n$  が相異なる頂点であれば  $\Gamma'$  を長さ  $n$  の**サイクル (cycle)** もしくは  $n$ -サイクルと呼ぶ。

グラフ  $\Gamma$  の二つの部分集合  $A, B \subseteq \mathcal{V}(\Gamma)$  が  $\Gamma$  上のある経路で繋がっている場合、 $A \leftrightarrow_{\Gamma} B$  と書く。グラフ  $\Gamma$  が**連結 (connected)** であるとは、任意の頂点  $x, y \in \mathcal{V}(\Gamma)$  に対し  $x \leftrightarrow_{\Gamma} y$  であることをいう。グラフの各頂点および辺に対し、それを含む最大の連結部分グラフを一意に定めることができ、それをその頂点および辺の**連結成分 (connected component)** と呼ぶ。任意のグラフの頂点集合または辺集合は、連結成分によって分割される。

グラフ  $\Gamma$  が**二分グラフ (bipartiate graph)** であるとは、 $\Gamma$  の各辺がある  $A$  の頂点とある  $B$  の頂点を結ぶような  $\mathcal{V}(\Gamma)$  の分割  $A \sqcup B$  が存在することをいう。

**事実 2.1.** グラフ  $\Gamma$  が二分グラフであることと、 $\Gamma$  に奇数長さのサイクルが存在しないことは同値である。

連結グラフ  $\Gamma$  の頂点の間に自然な距離構造を与えることができる。二つの頂点  $x, y \in \mathcal{V}(\Gamma)$  に対し

$$d(x, y) := \min \{\text{len}(P) : P \text{ は } x \text{ と } y \text{ を結ぶ経路}\}$$

と定義すれば良い。このとき  $d(\cdot, \cdot)$  は三角不等式と非退化性 (nondegeneracy) を満たす。したがって  $d(\cdot, \cdot)$  は実際に距離構造をなし、これを組合わせ距離 (combinatorial metric)、 $l^1$ -距離またはグラフ距離 (graph metric) と呼ぶ。つまりグラフは自然に距離空間とみなせる。

頂点集合の部分集合  $A \subseteq \mathcal{V}(\Gamma)$  と正の実数  $k > 0$  に対し、

$$N_k(A) := \{y \in \mathcal{V}(\Gamma) : \text{ある } a \in A \text{ に対し } d_\Gamma(a, y) \leq k \text{ である}\}$$

を  $A$  の半径  $k$  の**近傍 (neighborhood)** と呼ぶ。

さて群の話題に移ろう。**群 (group)** とは合成および逆の操作が可能な演算が備わっている構造を指す。具体的には、 $id$  という特別な元を持つ集合  $G$  に二項演算  $\cdot : G^2 \rightarrow G$  が定義されており、以下の条件を満たすとき、 $(G, \cdot, id)$  を群と呼ぶ。

- (1) (結合法則) 任意の  $g, h, k \in G$  に対し  $(g \cdot h) \cdot k = g \cdot (h \cdot k)$  である。
- (2) (単位元の性質) 任意の  $g \in G$  に対し  $g \cdot id = id \cdot g = g$  である。
- (3) (逆元の存在性) 任意の  $g \in G$  に対し  $g^{-1} \in G$  が存在して  $g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = id$  を満たす。

もし  $id \in H \subseteq G$  に  $\cdot$  を制限したとき  $(H, \cdot, id)$  もまた群をなすなら、 $H$  を  $G$  の**部分群 (subgroup)** と呼び  $H \leq G$  のように記す。このとき、 $G$  は  $\{[gH] : g \in G\}$  という同値類によって分割されるが、この同値類の数を  $H$  の**指数 (index)** と呼ぶ。この指数が有限であれば  $H$  は  $G$  の有限指数部分群という。

群  $G$  の部分集合  $S$  が  $G$  の**生成集合 (generating set for  $G$ )** であるとは、 $S$  を含む  $G$  中の最小の部分群が  $G$  全体と一致することをいう。すなわち、各  $g \in G$  に対し、 $g = s_1^{\epsilon_1} \cdots s_n^{\epsilon_n}$  を満たす  $S$  の有限個の元  $s_1, \dots, s_n$  および  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{1, -1\}$  が存在することを意味する。このとき、 $g$  を上記のように表すために必要な  $S$  の元の個数の最小値を  $g$  の  **$S$ -単語ノルム ( $S$ -word norm)** といい、 $\|g\|_S$  と記す。最後に、有限生成集合を持つ群を**有限生成群 (finitely generated group)** と呼ぶ。

数学にはさまざまな群がある。自明群 (trivial group)  $1 = \{id\}$  や、 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  のような有限群 (finite group) がその一例である。最も簡単な無限群としては、整数群  $\mathbb{Z} = (\mathbb{Z}, +, 0)$  が挙げられる。このような群は、しばしば次のように構成される。ある数学的な構造  $X$  が与えられたとき、 $X$  から  $X$  への写像のうち、逆操作が可能で (例えば単射写像・位相同型写像・正則行列など) かつ  $X$  の構造を保つものをすべて集めると、その集合は自然に群をなす。例えば、整数群  $\mathbb{Z}$  は、数直線上のアフィン変換のうち、全単射であり、整数点全体の集合をそれ自身に移るものの集まりとみなすことができる。

実は、すべての群はあるグラフの対称性を集めたものと見るができる。生成集合  $S$  が与えられた群  $G$  を考えよう。初めに導入したように、 $G$  のすべての元を頂点とし、 $S$  の元によって関連付けられたすべての順序対を辺で結んだグラフ  $\Gamma = \text{Cay}(G, S)$  を、 **$S$  に関する  $G$  のケイリーグラフ (Cayley graph of  $G$  with respect to  $S$ )** と呼ぶ。このとき、グラフ距離は自然に  $S$ -単語ノルムによって与えられる。すなわち、 $d_\Gamma(g, h) := \|g^{-1}h\|_S$  である。生成集合  $S$  への依存性をより明確にするため、 $d_S(g, h)$  と記すこともある。このとき、生成されたグラフが**局所有限 (locally finite)** であるためには、すなわち有限の半径を持つすべての球が有限個の頂点のみを含むためには、 $S$  が有限集合であることが必要十分条件となる。

今後、留意すべき群が二つある。まず、 $d$  次元の整数格子群  $\mathbb{Z}^d$  は

$$\{\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_d) : v_i \in \mathbb{Z}\}$$

と定義される。この格子群の有限生成集合の一つとして  $\{\mathbf{e}_i = (\delta_{ij})_{j=1}^d : i = 1, \dots, d\}$  を考えよう。これら  $d$  個の「方向移動」を用いて他の移動を生成するとき、その順序は重要ではない。つまり、 $\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j = \mathbf{0}$  が成り立つ。実は、この等式さえ理解していれば、 $\mathbb{Z}^d$  におけるすべ

ての等式 (例えば  $(3, 1) = (2, 1) - (1, 3) + (2, 4)$  など) を導出することができる。深入りはしない  
が、これが

$$\mathbb{Z}^d \simeq \langle s_1, \dots, s_d \mid s_i s_j s_i^{-1} s_j^{-1} = id \rangle$$

と記述する理由である。このとき、右辺を  $\mathbb{Z}^d$  の表示 (presentation) と呼ぶ。

それでは、

$$F_d := \langle s_1, \dots, s_d \mid - \rangle$$

はどのような群を指すのだろうか。この群は  $s_1, \dots, s_d$  およびその逆元  $s_1^{-1} \dots s_d^{-1}$  を用いて書けるすべての単語の集合であり、ある文字とその逆元が隣り合ったときキャンセルできるという基本等式 ( $s_i s_i^{-1} = s_i^{-1} s_i = id$ ) 以外には、いかなる規則も持たない群である。この群をランク  $d$  の自由群 (free group of rank  $d$ ) と呼び、このとき  $\{s_1, \dots, s_d\}$  はこの群を自由に生成する (freely generate) という。ランク 2 の自由群のケイリーグラフがどのような形をしているか描いてみて、図1と比較せよ。




FIGURE 1. ランク 2 の自由群の標準ケイリーグラフ

一般に、群  $G$  の任意の元  $g, h \in G$  が  $gh = hg$ , すなわち  $ghg^{-1}h^{-1} = id$  を満たすとき、 $G$  を可換群 (abelian group) と呼ぶ。可換群を含むより広い群のクラスとして、べき零群 (nilpotent group) や可解群 (solvable group) などがあるが、それらの定義は一応省略する。

最後に、群の成長 (growth) を論じる。有限生成群  $G$  の有限生成集合  $S$  を固定したとき、ケイリーグラフ  $G = Cay(G, S)$  の半径  $R$  の球内には頂点がいくつ含まれているかを問うことができる。例えば、

$$\liminf_{R \rightarrow +\infty} \frac{\ln \#\{g \in G : \|g\|_S \leq R\}}{R} > 0?$$

のような質問を考えることである。もしこれに大した答えが「YES」なら、球内の要素数は半径に対して指数関数的に増加することである。実は、この問いの答えは  $S$  の選択に寄らない。すなわち、群  $G$  が与えられたとき、ある一つの有限生成集合に対して答えが「YES」であれば、他のどの有限生成集合を選んでも答えは「YES」となるのである。のような性質を持つ群を、指数関数的成長 (exponential growth) を持つと呼ぶ。例として、自由群は指数関数的に成長するが、整数格子群はそうではない。また、指数関数的に成長する部分群を持つすべての群は、それ

自身も指数関数的に成長する。(注意：部分群内での単語距離は、親となる群での単語距離とは大きく異なる可能性があることに留意せよ。)

2.2. **パーコレーション**. これからはパーコレーション (percolation) について述べる。背景として連結グラフ  $\Gamma = (\mathcal{V}(\Gamma), \mathcal{E}(\Gamma))$  を一つ固定し、その部分グラフ全体の空間

$$\Omega := \left\{ \Gamma' = (\mathcal{V}(\Gamma), \mathcal{E}') : \mathcal{E}' \subseteq \mathcal{E}(\Gamma) \right\}$$

を考える。各辺  $e \in \mathcal{E}(\Gamma)$  に対し、 $\Omega$  を分割する二つの集合  $\{\Gamma' \subseteq \Gamma : e \in \Gamma'\}$  と  $\{\Gamma' \subseteq \Gamma : e \notin \Gamma'\}$  を取ろう。これらをそれぞれ  $\{\omega : e \text{ が開いている}\}$  および  $\{\omega : e \text{ が閉まっている}\}$  と呼ぶ。すべての  $e \in \mathcal{E}(\Gamma)$  に対しそのような集合を集め、それらが生成する最小の  $\sigma$ -代数を  $\Omega$  に備えつける。

続いて、パラメータ  $0 \leq p \leq 1$  を固定しよう。各辺  $e \in \mathcal{E}(\Gamma)$  を独立に確率  $p$  で開き、確率  $1-p$  で閉じるとすることで確率測度  $\mathbb{P}_p$  を  $\Omega$  上に定める。直感的には、「全体グラフの  $(100p)\%$  に当たるランダムな部分グラフを考えることになる。この確率的な部分グラフを  $\Gamma[p]$  と書く。

物理的な比喩として、 $\Gamma$  の形状をした均質な結晶を構成する分子を考えよう。温度を徐々に上げると、結晶の各分子結合がある確率  $(= 1-p)$  で切断される。結晶がどのような形で碎けるかは確率的であり、この現象を模写したものが  $\Gamma[p]$  である。このとき、各分子結合が残るか切れるかは互いに独立であると仮定していることに注意されたい。このような数学的モデルは Simon R. Broadbent と John M. Hammersley によって [BH57] で初めて導入された。

上記のモデルでは  $\Gamma$  の各辺が残るかまたは消えるが、これをベルヌーイボンドパーコレーション (Bernoulli bond percolation process) と呼ぶ。各頂点が残るかまたは消えるサイトパーコレーション (site percolation process) もまた、物理的パーコレーションを記述するモデルの一つである。他にも、各辺に確率的な長さを与えることによって定まるグラフ距離の構造を探るファーストパッセージパーコレーション (first passage percolation) などがある。本論文ではベルヌーイボンドパーコレーションに焦点を当てる。パーコレーションについてより深い興味がある読者は、Geoffrey Grimmett の本 [Gri89] を参照されたい。

**参考 2.2.** 連結グラフ  $\Gamma$  の対象の群  $\text{Aut}(\Gamma)$  が  $\Gamma$  の任意の頂点の対  $v, w \in \Gamma$  を結びつけることができる時、すなわち  $v = g \cdot w$  を満たす  $g = g(v, w) \in \text{Aut}(\Gamma)$  が存在するとき、 $\Gamma$  は**頂点推移的** (*vertex-transitive*) だという。これはすなわち  $\mathcal{V}(\Gamma)$  における  $\text{Aut}(\Gamma)$ -軌道がただ一つであることを意味する。一般に、 $\mathcal{V}(\Gamma)$  における  $\text{Aut}(\Gamma)$ -軌道が有限個である場合、 $\Gamma$  を**準推移的** (*quasi-transitive*) と呼ぶ。

便宜上、今後はグラフの中でも 有限生成群のケイリーグラフ に限って話を進める。しかし、後で挙げる定理の多くは、ケイリーグラフよりも一般的なケースである頂点推移的、あるいは準推移的なグラフに対しても証明されている。詳細は原論文を参照されたい。

2.3. **パーコレーションの相転移**. まずは、平面格子  $\Gamma = \mathbb{Z}^2$  上のパーコレーションを見てみよう。このとき、パラメータ  $p$  が大きいほど確率的により多くの辺が生き残るため、 $p$  が 1 に近ければグラフ  $\Gamma$  がほぼそのまま残ると予想できる。これに対し、 $p$  が 0 に近ければ元のグラフの大部分が削除され、小さな断片のみが残るだろう。この相反する予想の尺度として、

「無限に大きい連結成分が発生するか？」

を聞いてみよう。平面格子グラフに関しては、以下のことが知られている。



- $p \leq 1/2$  の時は、 $\Gamma[p]$  に無限連結成分が発生する  $\mathbb{P}_p$ -確率が 0 である一方、
- $p > 1/2$  の時は、 $\Gamma[p]$  に無限連結成分が発生する  $\mathbb{P}_p$ -確率が 1 である。

これを鑑みて、パラメータ  $p$  が  $1/2$  に至るとき、平面格子上のパーコレーションは**相転移 (phase transition)** を起こすと言うことができる。このとき基準となる値  $1/2$  を臨界パラメータ (critical parameter) と呼び、 $p_c(\Gamma)$  と記す。すなわち、 $\Gamma = \mathbb{Z}^2$  に関して  $p_c(\Gamma) = 1/2$  である。

一般的なグラフ  $\Gamma$  でパーコレーションを行うと、無限連結成分が発生する確率が 0 でも 1 でもない値をとる可能性もある。しかし、これは極めて非均質なグラフでのみ起こり得る現象であり、群のケイリーグラフのような均質なグラフでは決して起こらない。簡潔な議論のため、これからは群のケイリーグラフ上でのパーコレーションのみを記述する。

ケイリーグラフ  $\Gamma = \text{Cay}(G, S)$  を一つ考えよう。 $\Gamma$  の形状はどの点から見ても同じなので (これが我々の望んでいた均質性である)、単位元  $id \in G$  を基点としよう。ランダム部分グラフ  $\Gamma[p]$  における  $id$  の連結成分を  $C_{id}$  と記し、この起点連結成分が無限となる確率を

$$\theta(p) := \mathbb{P}_p(\#C_{id} = +\infty)$$

と定義する。このとき、次が成り立つ。

**事実 2.3** (補題3.1参照).  $\theta(p)$  は  $p \in [0, 1]$  に対する単調増加関数である。

さらに、 $p$  が十分小さい正の実数である場合 (例えば  $0 < p \leq \frac{1}{\#2S}$  のとき)  $\theta(p) = 0$  が成り立つことを確認できる。つまり、 $\theta(p)$  は初期区間では値 0 にとどまるが、ある時点から 0 より大きい値を持つことになる。この時点  $p$  を  $\Gamma$  の**臨界パラメータ (critical parameter)** と定義する。形式的には

$$p_c(\Gamma) := \inf\{p \in [0, 1] : \theta(p; \Gamma) > 0\}$$

と定める。ケイリーグラフの均質性により、次の事実が成り立つ。

**事実 2.4** (補題3.4参照). あるケイリーグラフ  $\Gamma$  の臨界パラメータ  $p_c$  を考えよう。このとき

- 各  $0 \leq p < p_c$  に対し、 $\mathbb{P}_p(\Gamma[p] \text{ には無限連結成分が一つもない}) = 1$  であり、かつ
- 各  $p_c < p \leq 1$  に対し、 $\mathbb{P}_p(\Gamma[p] \text{ に無限連結成分が存在する}) = 1$  である。

要するに、臨界相転移は任意のケイリーグラフにおいて起こる。ここで加えたいことは、 $p_c$  が 1 となるグラフも多いことだ。例えば、図4に示した数直線グラフでは、左・右半直線上の辺が無限個切断されると、無限連結成分は生じない。このような事象は  $p < 1$  のとき確率 1 で起こる。したがって、 $p_c(\mathbb{Z}) = 1$  が成り立つ。この事実は数直線グラフの場合に限ることではなく、 $\mathbb{Z}$  のいかなるケイリーグラフに対して同様に成り立つ。一般に、 $\mathbb{Z}$  を有限指数部分群と持つ群のケイリーグラフに対して  $p_c = 1$  である。これらが  $p_c = 1$  を満たすグラフの全てであるかどうか、Itai Benjamini と Oded Schramm によって提起された予想である。

**予想 2.5.** [BS96] 整数群  $\mathbb{Z}$  を有限指数部分群として持たない有限生成群の任意のケイリーグラフ  $\Gamma$  に対して、 $p_c(\Gamma) < 1$  が成り立つ。

この予想は指数関数的に成長する群に対しては Russell Lyons によって、有限表現を持つ群に対しては Eric Babson と Itai Benjamini によって示された ([Lyo95], [BB99])。その特殊例として、自由群のケイリーグラフに対して  $p_c < 1$  であることは容易に分かる。自由群を部分群として持つ群のケイリーグラフに対しても同様に  $p_c < 1$  が成り立つ。

**事実 2.6.** ランク 2 の自由群を部分群として持つ有限生成群の任意のケイリーグラフ  $\Gamma$  に対して、 $p_c(\Gamma) < 1$  が成り立つ。

この事実は前述の結果よりは弱いですが、我々の目的のためには十分である。よって、事実 2.6 だけについて、後で証明を挙げる。

別の相転移を論じる前に、まずは臨界相転移をもう少し詳しく眺めてみよう。先ほど、 $\theta(p)$  の様子が  $p = p_c$  を境に変化すると述べたが、さて臨界点  $p = p_c$  における値はいくらだろうか。すなわち、 $\theta(p_c)$  は 0 か、または正の値を取るかを考えよう。言い換えれば、臨界値  $p = p_c$  において  $\Gamma[p]$  は無限連結成分を持つのか、という問いになる（「臨界点パーコレーションが起こるか」とも表現される）。前述した平面格子  $\mathbb{Z}^2$  の場合には、 $\theta(p_c) = \theta(1/2) = 0$  であることが Harry Kesten による有名な結果として知られている（[Kes80]）。Theodore Harris の論文 [Har60] も参照）。一方で、三次元整数格子  $\mathbb{Z}^3$  においては、 $\theta(p_c)$  が正なのか 0 なのかは現在でも重要な未解決問題である。次に、与えられたケイリーグラフ  $\Gamma$  とパラメータ  $0 \leq p \leq 1$  に対して、基点  $id$  の連結成分が平均的にどの程度大きいのかを考えることができる。これに対し

$$\chi_p := \mathbb{E}_p[\#C_{id}] = \sum_{g \in G} \mathbb{P}_p(id \leftrightarrow g) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \mathbb{P}_p[\#C_{id} = n] & \theta(p) = 0 \text{ の場合、} \\ +\infty & \theta(p) > 0 \text{ の場合} \end{cases}$$

で定義される量を**感受率 (susceptibility)**と呼ぶ。先に定義した  $\theta(p)$  と同様に、次が分かっている。

**事実 2.7** (補題 3.1 参照).  $\chi_p$  は  $p \in [0, 1]$  に対して単調増加関数である。

定義から明らかのように、 $p > p_c$  のとき  $\chi_p = +\infty$  である。また、 $p$  が十分小さい正の値であれば  $\chi_p < +\infty$  となることも容易に分かる。しかし、その中間でどのような値を取るかは自明ではない。実際、ほとんど確実に有限値を持つ確率変数であっても、その期待値が無限大になることはあり得るため、 $\theta(p) = 0$  だからといって直ちに  $\chi_p < +\infty$  が従うわけではない。この点、すなわち  $p < p_c$  に対して  $\chi_p < +\infty$  であることは、Michael Aizenman と David Barsky がまず  $d$  次元格子グラフの場合に示し、その後 Tonći Antunović と Ivan Veselić がケイリーグラフを含むより一般のグラフに対して証明した。

**事実 2.8.** [AB87], [AV08] / ケイリーグラフ  $\Gamma$  の臨界パラメータ  $p_c$  に対し、任意の  $0 \leq p < p_c$  について  $\chi_p$  は有限である。さらに、任意の  $p \nearrow p_c$  について  $\chi_p \nearrow +\infty$  となる。特に  $\chi_{p_c} = +\infty$  となる。

この結果には、Hugo Duminil-Copin と Vincent Tassion によるより現代的な証明 [DCT16] や、Hugo Vanneuville による別のアプローチ [Van25] が知られている。

さらに、(1)  $\chi_p$  が  $p \nearrow p_c$  のときどのような速度で発散するのか、(2)  $p \searrow p_c$  のとき  $\theta(p)$  がどのような速度で 0 に近づくのか、(3)  $p = p_c$  における  $C_{id}$  の大きさの確率分布がどのような形になるのか、といった問いを立てることもできる。これ以上深入りはしないが、臨界パラメータ付近における  $\Gamma[p]$  の基点連結成分の大きさや形状を理解することは、パーコレーション理論における根本的な課題である。

**2.4. 無限連結成分の個数.** これまで、パラメータ  $p$  がある領域 ( $p_c < p \leq 1$ ) にあるとき、 $\Gamma[p]$  には「ほぼ確実に」無限連結成分が現れるという話をしてきた。では、いくつの無限連結成分がで



きるのだろうか？1 個だろうか？2 個、あるいは 10 個だろうか？それとも無限個なのだろうか。そして、この個数は  $p$  の値によってどのように変化するのだろうか。

もし議論の対象をケイリーグラフに限定していなければ、これらの問いに答えるのは非常に困難である。しかしケイリーグラフについては、ある程度明確な回答が知られている。第一に、ケイリーグラフ  $\Gamma$  と  $p \in [0, 1]$  が与えられたとき、 $\Gamma[p]$  が持ちうる無限連結成分の個数はほぼ確実に一つの値に定まる。さらに、その個数は必ず 0 個、1 個、あるいは「無限個」のいずれかである。言い換えれば、次の事実が成り立つ。

**事実 2.9.** 有限生成群のケイリーグラフ  $\Gamma$  と各  $p \in [0, 1]$  に対して、 $N_\infty(\Gamma, p) \in \{0, 1, +\infty\}$  が存在し、

$$\mathbb{P}_p \{ \# \{ \Gamma[p] \text{ 内の無限連結成分} \} = N_\infty(\Gamma, p) \} = 1$$

となる。

この事実は、C. M. Newman と Lawrence S. Schulman によって [NS81] で証明された。ここで、次の定数を定義しよう。

$$p_u[\Gamma] := \inf \{ p \in [0, 1] : \text{ほぼ確実に } \Gamma[p] \text{ は無限連結成分をただ一つ持つ} \}.$$

この値を  $\Gamma$  の一意性閾値 (uniqueness threshold) と呼ぶ。定義から直ちに  $p_c \leq p_u$  であることがわかる。また、 $p_c < p < p_u$  を満たす  $p$  に対しては、 $\Gamma[p]$  はほぼ確実に無限連結成分を持つが、それは唯一ではない。したがって、この領域では  $N_\infty(\Gamma, p) = +\infty$  となるはずである。

さて、これから述べる事実は非自明である。この事実は Itai Benjamini と Oded Schramm が有名なサーベイ論文 [BS96] で予想し、後に Olle Häggström と Yuval Peres がケイリーグラフに対して [HP99]、Roberto H. Schonmann がより一般的なグラフに対して証明した [Sch99]。

**事実 2.10.** ケイリーグラフ  $\Gamma$  の一意性閾値  $p_u$  が与えられたとき、各  $p_u < p \leq 1$  に対して、

$$\mathbb{P}_p (\Gamma[p] \text{ に無限連結成分が一意に存在する} ) = 1$$

が成り立つ。(厳密に言えば、この事実自体は我々の論証に必ずしも必要ではない。)

つまり、 $(p_u, 1]$  の全区間において、 $\Gamma[p]$  はほぼ確実にただ一つの無限連結成分を持つのである。したがって、 $N_\infty$  は一般的に、図 2 に示されたような振る舞いを見せる。

このように見ると、 $N_\infty$  に関しては相転移が二度起こるのが最も一般的な絵となる。しかし、それは  $(0, p_c), (p_c, p_u)$  および  $(p_u, 1)$  がすべて非自明な区間であるときの話である。このうち  $0 < p_c$  は常に保証される。では、 $p_c < 1$  はどうだろうか？すべての群がこれを満たすわけではない。例えば、図 1 に描かれている 4 次正則樹木グラフ  $T_4$  では、 $p$  が 1 より少しでも小さければ  $\Gamma[p]$  において辺が時々消されるはずだが、辺が一つ消えるたびに全体グラフは二つに分断される。このように「ポキポキと折れやすい」グラフのランダム部分グラフでは、唯一の連結成分は決して期待できず、さらには無限連結成分もまた一意的ではなくなる。したがって  $p_u(T_4) = 1$  である。

あるグラフの有限個の辺を削除するだけでグラフを複数の連結成分に分断できる場合、そのグラフは「端 (はし) が複数ある (not one-ended)」と呼ばれる。一般に、このようなケイリーグラフは  $p_u = 1$  を持つことが比較的容易に確認できる。

それでは、残りのケイリーグラフについてはどうだろうか？前述の [BS96] において、Itai Benjamini と Oded Schramm は次のように問いかけた。




FIGURE 2. 無限連結成分の（ほぼ確実な）数の最も一般的な振る舞い

**問題.** 1 端のケイリーグラフに対して常に  $p_u < 1$  か？

この質問には未だ完全な回答は知られていない。しかし、端が一つのケイリーグラフを生成する群が、もし**有限表示 (finite presentation)** を持つのであれば、 $p_u < 1$  であることは知られている。これは Eric Babson と Itai Benjamini による結果である [BB99]。

一方で、 $p_c < p_u$  に関しては何が知られているだろうか？まず、先に述べた  $\mathbb{Z}^2$  の場合、 $N_\infty(p) = +\infty$  となる  $p$  は存在せず、また  $p_c = p_u = 1/2$  である。これは 2 次元に限った話ではない。より高い次元  $d$  を持つ  $\mathbb{Z}^d$  に対しても同様に  $p_c = p_u$  が成立する。この事実は Michael Aizenman、Harry Kesten および Charles M. Newman が 1987 年に証明した重要な結果である [AKN87]。

一般に、（無限）可換群 (abelian group) やべき零群 (nilpotent group) を含め、指数関数より遅く成長する群 (group with subexponential growth) のケイリーグラフでは、すべて同様の現象が現れる。これに密接に関連しているのが、ケイリーグラフの有限部分集合たちの「体積」に対する「表面積」の競合である。ここで概念を一つ導入しよう。

**定義 2.11.** あるケイリーグラフ  $\Gamma$  の **Cheeger 定数** は

$$\iota(\Gamma) := \inf \left\{ \frac{\#\partial_\varepsilon K}{\#K} = \frac{\#\{\overline{vw} \in \mathcal{E}(\Gamma) : v \in K, w \notin K\}}{\#K} : K \text{ は } \mathcal{V}(\Gamma) \text{ の有限部分集合} \right\}$$

のように定義される。グラフ  $\Gamma$  が **従順 (amenable)** であるとは、その Cheeger 定数が 0 であることを意味し、**非従順である (nonamenable)** とは、その Cheeger 定数が正であることを意味する。

ここで、Cheeger 定数の正確な値はそれほど重要ではない場合が多い。それよりも重要なのは、Cheeger 定数が 0 より大きいかな否かである。整数群  $\mathbb{Z}$  およびその直接積  $\mathbb{Z}^d$  を含め、すべての可換群、べき零群、および指数関数より遅く成長する群のケイリーグラフはアメナブルである。これらについて、次のことが知られている。

**命題 2.1** ([AKN87], [BK89], [GKN92]). すべての従順ケイリーグラフ  $\Gamma$  とすべての  $0 \leq p \leq 1$  に対して、ほぼ確実に  $\Gamma[p]$  は無限連結成分を高々一つ持つ。すなわち、 $N_\infty(p; \Gamma) = \infty$  となる  $p$  は存在しない。特に、 $p_c(\Gamma) = p_u(\Gamma)$  である。

この命題は、前述したようにまず  $\mathbb{Z}^d$  において Michael Aizenman, Harry Kesten, および Charles M. Newman が証明した。その後すぐに R. M. Burton および Michael S. Keane が別の証明を提示したが、Alberto Gandolfi, Michael S. Keane, および Charles M. Newman がその論証に従順なケイリーグラフへと拡張した。

それでは逆に、 $p_c < p_u$  となるグラフにはどのようなものがあるだろうか？ 前述の  $p_u = 1$  となる例、すなわち端が一つより多いグラフを除いた最初の例は、Geoffrey Grimmett と Charles M. Newman が扱った (正則  $d$  次樹木グラフ)  $\times \mathbb{Z}$  であり、これは自由群  $\times \mathbb{Z}$  の標準的なケイリーグラフである [GN90]。このグラフは、 $(0, p_c), (p_c, p_u), (p_u, 1)$  の三つの区間がすべて空集合ではない最初の例である。

この例の発見後、I. Benjamini と O. Schramm が提起した予想を紹介する。

**予想 2.12** ([BS96, Conjecture 6]). すべての非従順ケイリーグラフ  $\Gamma$  に対して  $p_c(\Gamma) < p_u(\Gamma)$  である。

これは、グラフの連結構造に関する組合せ論的な概念である従順性と、 $\Gamma[p]$  が無限に多くの無限連結成分を持つような  $p$  が存在する (!) という確率論的な性質が一致するという予想である。実は、任意のケイリーグラフ  $\Gamma$  に対して、 $N_\infty(p; \Gamma) = +\infty$  となる  $p$  が一つでも存在することと  $p_c(\Gamma) < p_u(\Gamma)$  は同値である。これは命題 2.1 に加え、 $\Gamma$  が非従順なとき、 $\Gamma[p_c]$  は (ほぼ確実に) 無限連結成分を一つも持たないという事実によるものである [BLPS99]。

**2.5. 予想 2.12 の現況と本論文の目標.** 予想 2.12 に関して多様なケイリーグラフが研究されてきた。Steven Lalley が、種数 (genus) の大きい曲面群の双曲平面上の平面ケイリーグラフ (planar Cayley graph) について  $p_c < p_u$  であることを証明した後 [Lal98]、予想の提唱者である I. Benjamini と O. Schramm は、双曲平面上に余コンパクトに描かれた任意のケイリーグラフに対して  $p_c < p_u$  を証明した [BS01]。

上記の二つの結果では、ケイリーグラフの平面性が重要な役割を果たした。しかし、ここで確認しておくべき点がある。ある意味で曲面群は非常に 2 次元的であるが、そのような曲面群であっても、平面敵ではないケイリーグラフをいくらかでも持ち得る。例えば、五角形の完全グラフ  $K_5$  を部分グラフとして持つケイリーグラフを構成することができる。曲面群のこのようなケイリーグラフに対しても  $p_c < p_u$  であるかは上記の結果から直ちに導かれるわけではない。

再び Benjamini と Schramm の質問に戻ろう。質問 および推測 2.12 は、グラフの確率論的な性質と、ある種の幾何学的な性質が同値であると主張しているが、この幾何学的な性質はグラフの微細な連結性には全く関心がなく、巨視的な形状のみを問題にする性質である。この点はこの質問および推測を一層興味深いものにする。例えば、平面性はグラフの巨視的構造と局所的構造の両方に依存する性質である。それに対し、グラフの端 (end) の数、あるいは従順性 (amenability) は (一見そうは見えないかもしれないが)、グラフの粗い形状のみに依存する性質であることが知られている。特に、ある群のケイリーグラフが多端であるか、あるいは非従順であれば、その群のいかなるケイリーグラフも同様であることが知られている。特殊な有限生成集

合を選んで、例え  $K_{100}$  を部分グラフに持つようにしたとしても、端の数や従順性は変えられないということだ。

したがって、予想 2.12 にアプローチする際、与えられた群の「特定の」ケイリーグラフではなく、すべてのケイリーグラフに対して回答できれば、より望ましいだろう。この観点と併せて知っておくべき事実が一つある。すべての非従順な群のそれぞれにおいて  $p_c(\Gamma) < p_u(\Gamma)$  を満足するケイリーグラフ  $\Gamma$  を少なくとも一つはあるというもので、これは Igor Pak と Tatiana Smirnova-Nagnibeda による結果である [PSN00]。このように特殊に構築されたケイリーグラフの  $p_c < p_u$  から、同じ群の他の任意のケイリーグラフの  $p_c < p_u$  を導き出せるかどうかは知られていない。

それでは、そのすべてのケイリーグラフが  $p_c < p_u$  を満足する群にはどのようなものがあるだろうか。これに関しては、Damien Gaboriau と Russell Lyons が扱った、1 次の  $l^2$ -Betti 数が消滅しない群のケイリーグラフがある [Gab05], [Lyo00], [Lyo13]。この概念の定義をここで導入するのは無理があるため、その例をいくつか挙げる。Gaboriau と Lyons が任意のケイリーグラフについて  $p_c < p_u$  を示した群の例には、以下のようなものがある。

- 自由軍、および 自由積 (free product);
- 種数 2 以上の曲面群;
- 従順ぐんに対して融合 (Amalgamate) した自由積。

一方、Gaboriau および Lyons が扱っていない群には以下のようなものがある。

- 自由群の直積;
- $SL(2, \mathbb{Z})(n, \mathbb{Z})$ ; 一般に、ランク  $n$  のリー群の中の格子 ( $n \geq 3$ )
- 双曲曲面の写像類群 (mapping class group)  $\text{Mod}(\Sigma_g)$ ;
- 自由群の外部自己同型群 (outer automorphism group)  $\text{Out}(F_N)$ ;
- 自由積ではない直角 Artin 群 (right-angled Artin group)

また、Kazhdan の性質 (T) を持つ群の中でも、上記の理論が適用される群の例はまだ発見されていない。

次に検討するのは、Thomas Hutchcroft が [Hut19] および [Hut20] で研究した群である。後者の論文では、ある特徴的な対称性を持つケイリーグラフに対して  $p_c < p_u$  を証明している。ここでいう特徴的な対称性とは、グラフ  $\Gamma$  の自己同型群  $\text{Aut}(\Gamma)$  に十分に大きな部分群  $H$  が存在することだが、 $H$  が  $\Gamma$  のすべての頂点間をほぼ自由に移動できる一方で、いくつかの頂点を偏向的に固定するという非対称性も持っているという意味である。深くは論じないが、この非対称性理論によって Hutchcroft は、すべての  $d \geq 3$  および  $k \geq 1$  に対して  $(T_d : d \text{ 次数正則樹木グラフ}) \times \mathbb{Z}^k$  の  $p_c < p_u$  を証明した。ただし、このような非対称性はグラフの局所的な構造に依存する性質であり、ある群の一つのケイリーグラフが満たすとしても、他のケイリーグラフで必ずしも満たすわけではない。

これに対し、前者の論文では特定の群のすべてのケイリーグラフについて論じている。それを今から述べる。

**定理 2.13.** [Hut19] 整数群  $\mathbb{Z}$  と同型な有限指数部分群を持たず、無限な Gromov 双曲群  $G$  のすべてのケイリーグラフ  $\Gamma$  について、 $p_c(\Gamma) < p_u(\Gamma)$  である。

**Gromov 双極性 (Gromov hyperbolicity)** は、 $d$  次元双曲空間  $\mathbb{H}^d$ 、 $K < -a^2$  の曲率を持つ単連結多様体、および樹木グラフをすべて包括する幾何学的群論の核心概念である。Gromov 双

曲群の定義も具体的には記さないが、 $\mathbb{H}^d$  に真正かつコンパクトに作用する群（すなわちコンパクト格子）を例として考えると分かりやすい。特に、閉双曲多様体の基本群や自由群はすべて Gromov 双曲的である。

Gromov 双曲性をさらに一般化した**非円筒的双曲性 (acylindrical hyperbolicity)** は、定義するのが少しややこしい。だが、この概念は Gromov 双曲群、双曲曲面の写像類群、自由群の外部自己同型群、自由積ではない直角 Artin 群をすべて含む概念と考えれば良い。このような群に対して、著者と Donggyun Seo は次を論じた。

**定理 2.14.** [CS25] 整数群  $\mathbb{Z}$  と同型な有限指数部分群を持たず、非円筒的双曲的な  $G$  のすべてのケイリーグラフ  $\Gamma$  について、 $p_c(\Gamma) < p_u(\Gamma)$  である。

本論文では、これから述べる CAT(0) 立方複合体あるいは中点グラフに作用する群について考察する。これらの群と Gromov 双曲群の間には密接な関係がある。まず、Gromov 双曲群という概念と、我々が考慮する CAT(0) 立方群の概念は、互いに包含関係にはない。しかし、両方に該当する重要な対象がある。それは 3 次元閉双曲多様体の基本群である。これらの群の中には曲面群と同型な部分群が歪むことなくうまく埋め込まれていることを Jeremy Kahn と Vladimir Marković が示した一方 [KM12]、このような曲面群をタイリングの材料として、群が自由に (freely) かつコンパクトに作用する CAT(0) キューブ複合体を構成できることを Nicolas Bergeron と Daniel T. Wise が証明した [BW12]。実際、すべての 3 次元閉双曲多様体は、円上の双曲曲面束を有限群で割ったものとして理解できるが、これを**仮想的ファイバー定理 (virtual fibering theorem)** という [Ago13]。Ian Agol がこれを証明するために肝要な材料として用いたのが、まさに Bergeron と Wise の CAT(0) 立方複合体であると言える。

CAT(0) 立方群の別の例としては、直角 Artin 群や**直角 Coxeter 群 (right-angled Coxeter group)** がある。これらの群は、定められた数種類の関係子 (relator) からなる有限表示を持っており、その表示に従って自然に Salvetti 複合体および Davis 複合体という CAT(0) 立方複合体を建設できる。また、これらの群はこれらの複合体に真正かつコンパクトに作用する。一般に直角アルティン群には、自由群  $F_n$  と同型な部分群や、整数直積群  $\mathbb{Z}^n$  と同型な部分群がいたるところに絡み合っているため、Gromov 双曲的ではない場合が多い。本論文では、このような群を双曲幾何学の代わりに CAT(0) 立方複体の幾何学によって理解しようと試みる。

### 3. パーコレーション 이론

이장에서는 정리 1의 증명을 몇 가지 단계로 세분화할 것이다. 증명에 필요한 기하학적인 관찰들을 먼저 3.1절에서 기술하겠다. 기하학적인 재료들만 있으면 확률론적 증을 통해 정리 1를 이끌어낼 수 있다는 것이 Thomas Hutchcroft 의 이론인데 [Hut19], 이 이론을 3.2절 및 3.3절에서 설명하겠다.

CAT(0) 큐브기하학을 깊이 파고들지 않고 군위의 퍼코레이션 이론만을 들여다보고 싶은 독자들은 이장까지만 읽으면 충분하다. 한편, 확률론 테크닉보다는 CAT(0) 큐브기하학에 관심이 있는 독자들은 3.1절만 읽은 뒤 다음 장으로 넘어가도 좋다.

**3.1. 우리가 증명해야 할 기하학적인 사실들.** 군  $G$  의 유한 생성 집합  $S$  에 대한 케일리 그래프  $\Gamma = \text{Cay}(G, S)$  를 하나 고정했을 때,  $G$  의 유한 부분 집합이  $\Gamma$  위에서 어떻게 배치되어 있는지에 관한 성질 두 개를 기술하겠다. 아직 우리는 CAT(0) 큐브기하학을 만나지 않았기에 길잡이 역할을 할 예시가 필요한데, 정수 격자군  $\mathbb{Z}^2$  보다는 자유군  $F_2 = \langle a, b \rangle$  을 상상하는 편이 도움이 될 것이다. 그러니 일단  $G = F_2$  및  $S = \{a, a^{-1}, b, b^{-1}\}$  로 두고 설명하겠다.