

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL SERVICE."
  },
  "body": {
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 1,
    "numOfRows": 10,
    "items": [
      {
        "ITEM_SEQ": "195500002",
        "ITEM_NAME": "종근당염산에페드린정",
        "ENTP_NAME": "(주)종근당",
        "ITEM_PERMIT_DATE": "19550117",
        "CNSGN_MANUF": null,
        "ETC_OTC_CODE": "전문의약품",
        "CLASS_NO": "[02220]진해거담제",
        "CHART": "본품은 백색의 정제다.",
        "BAR_CODE": "8806433032005",
        "MATERIAL_NAME": "총량 : 1정 중 80밀리그램|성분명 : 염산에페드린|분량 : 25|단위 : 밀리그램|규격 : KP|성분정보 : |비고 :",
        "EE_DOC_ID": "https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/cmn/pdfDownload/195500002/EE",
        "UD_DOC_ID": "https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/cmn/pdfDownload/195500002/UD",
        "NB_DOC_ID": "https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/cmn/pdfDownload/195500002/NB",
        "INSERT_FILE": "",
        "STORAGE_METHOD": "기밀용기에 넣어 건냉암소에 보관.",
        "VALID_TERM": "제조일로부터 36 개월",
        "REEXAM_TARGET": null,
        "REEXAM_DATE": null,
        "PACK_UNIT": "",
        "EDI_CODE": null,
        "DOC_TEXT": "",
        "PERMIT_KIND_NAME": "허가",
        "ENTP_NO": "1459",
        "MAKE_MATERIAL_FLAG": null,
        "NEWDRUG_CLASS_NAME": "",
        "INDUTY_TYPE": "의약품",
        "CANCEL_DATE": "20200101",
        "CANCEL_NAME": "유효기간만료",
        "CHANGE_DATE": "20151217",
        "NARCOTIC_KIND_CODE": null,
        "GBN_NAME": "효능효과변경, 2015-12-17/용법용량변경, 2015-12-17/사용상주의사항변경(부작용 포함), 2015-12-17/효능효과변경, 1995-01-01/용법용량변경, 1995-01-01/사용상주의사항변경(부작용포함), 1995-01-01",
        "TOTAL_CONTENT": "1정 중 80밀리그램",
        "EE_DOC_DATA": "<DOC title=\"효능효과\" type=\"EE\">\r\n <SECTION title=\"\">\r\n <ARTICLE title=\"1. 다음 질환에서의 기침 : 기관지천식, 감기, 급 &#8226;만성기관지염, 상기도염\" />\r\n <ARTICLE title=\"2. 비점막의 충혈·종창\" />\r\n </SECTION>\r\n</DOC>",
        "UD_DOC_DATA": "<DOC title=\"용법용량\" type=\"UD\">\r\n <SECTION title=\"\">\r\n <ARTICLE title=\"\">\r\n <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[성인 : 에페드린염산염으로서 1회 12.5 ~ 25 mg 1일 1 ~ 3회 경구투여한다.]]></PARAGRAPH>\r\n <PARAGRAPH tagName=\"p\"
```

```

textIndent="\\" marginLeft="\\"><![CDATA[증상에 따라 적절히 증감한다.]]>
</PARAGRAPH>\r\n    </ARTICLE>\r\n    </SECTION>\r\n</DOC>",
"NB_DOC_DATA": "<DOC title=\"사용상주의사항\" type=\"NB\">\r\n    <SECTION
title=\"\">\r\n    <ARTICLE title=\"1. 경고\">\r\n        <PARAGRAPH
tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[애플주사제는 용기 절단시 유
리파편이 혼입되어, 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중
하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것(유리애플주사제에 한함).]]>
</PARAGRAPH>\r\n    </ARTICLE>\r\n    <ARTICLE title=\"2. 다음 환자에는 투여하지
말 것.\">\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![
CDATA[1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자]]></PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[2) 고혈압 환
자]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\"
marginLeft=\"\"><![CDATA[3) 갑상샘종독증 환자]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH
tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[4) 녹내장 환자]]>
</PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\"
marginLeft=\"\"><![CDATA[5) 당뇨병 환자]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH
tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[6) 전립선비대증 환자]]>
</PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\"
marginLeft=\"\"><![CDATA[7) 크롬친화세포종 환자]]></PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[8) MAO억제제
를 투여중이거나 투여를 중지한 지 2주 이내인 환자]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH
tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[9) 허혈심장병 환자]]>
</PARAGRAPH>\r\n    </ARTICLE>\r\n    <ARTICLE title=\"3. 다음 환자에는 신중히 투
여할 것.\">\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\">
<![CDATA[1) 디기탈리스제제를 투여 받고 있는 환자]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH
tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[2) 심질환 환자]]>
</PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\"
marginLeft=\"\"><![CDATA[3) 소아]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH
tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[4) 갑상샘기능항진증, 폐쇄각
녹내장 및 신장애 환자]]></PARAGRAPH>\r\n    </ARTICLE>\r\n    <ARTICLE title=\"4.
이상반응\">\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\">
<![CDATA[1) 순환기계 : 심계항진, 빈맥, 전흉부 통증, 혈압상승, 심실성 부정맥이 나타날 수 있으
며, 분만중의 주사시에는 태아에 빈맥이 나타날 수 있다.]]></PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[2) 정신신경계
: 어지럼, 두통, 두중감, 진전, 신경과민, 불면, 발한, 갈증, 무력감, 근무력증 등이 나타날 수 있
다.]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\"
marginLeft=\"\"><![CDATA[3) 소화기계 : 구역, 구토, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.]]>
</PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\"
marginLeft=\"\"><![CDATA[4) 비뇨기계 : 배뇨장애가 나타날 수 있다.]]></PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[5) 과민반응 :
발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.]]></PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[6) 기타 : 구
갈이 나타날 수 있다.]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\"
textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[7) 고량투여 시 불안, 환각, 망상을 수반한 정
신증상이 나타날 수 있고 장기연용 시 의존성과 내성 발현이 보고되어 있으므로 이러한 경우에는 투여
를 중지한다.]]></PARAGRAPH>\r\n    </ARTICLE>\r\n    <ARTICLE title=\"5. 일반적
주의\">\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\" textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![
CDATA[1) 과도하게 투여를 계속하는 경우 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 주사의 경우에
는 특히 주의한다.]]></PARAGRAPH>\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\"
textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[2) 용법·용량에 맞게 투여하여도 효과가 나타
나지 않는 경우에는 이 약이 적당하지 않은 것으로 생각하고 투여를 중지한다. 특히 소아에 투여시에는
사용법을 정확히 지도하고 경과를 충분히 관찰한다.]]></PARAGRAPH>\r\n    </ARTICLE>\r\n
<ARTICLE title=\"6. 상호작용\">\r\n        <PARAGRAPH tagName=\"p\"
textIndent=\"\" marginLeft=\"\"><![CDATA[1) 갑상선제제(티록신, 리오티로닌 등)와 병용

```

```

투여 시 이 약의 작용이 증가될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.]]</PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![CDATA[2] 클로로포
름, 시클로프로판, 할로탄 등의 할로겐화 마취제와 병용투여 시 심실성 부정맥을 일으킬 수 있으므로
병용을 피한다.]]</PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![CDATA[3] 이 약을 에피네프린, 이소프로테레놀 등의 카테콜아민류와 병용하
면 부정맥 또는 심정지를 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않는다.]]</PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![CDATA[4] 테오필린과
병용으로 구역, 신경질, 불면이 증가될 수 있다.]]</PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH
tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![CDATA[5] 에르고타민은 혈관수축 및
혈압상승효과를 증가시키므로 에르고타민과 병용을 권장하지 않는다.]]</PARAGRAPH>\r\n
</ARTICLE>\r\n
<ARTICLE title="7. 임부 및 수유부에 대한 투여">\r\n
<PARAGRAPH tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![CDATA[1] 에페드린은
태반을 통과하고 태아의 심박수 및 심장박동 변동성을 증가시키므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이
있는 여성에서 이 약의 사용은 피해야 한다.]]</PARAGRAPH>\r\n
<PARAGRAPH
tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![CDATA[2] 이 약은 모유로 이행되므
로 수유중에는 투여하지 않는다. 수유 중 이 약을 투여 받은 수유부의 영아에서 과민성 및 수면형태 장
애가 보고되었다.]]</PARAGRAPH>\r\n
</ARTICLE>\r\n
<ARTICLE title="8. 고령
자에 대한 투여">\r\n
<PARAGRAPH tagName="p" textIndent=""
marginLeft="">![CDATA[일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의
한다.]]</PARAGRAPH>\r\n
</ARTICLE>\r\n
<ARTICLE title="9. 적용상의 주의
">\r\n
<PARAGRAPH tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![
CDATA[특수한 경우를 제외하고는 정맥주사 및 유제로 사용하지 않는다.]]</PARAGRAPH>\r\n
</ARTICLE>\r\n
<ARTICLE title="10. 저장상의 주의사항">\r\n
<PARAGRAPH
tagName="p" textIndent="" marginLeft="">![CDATA[차광하여 보관한다.]]>
</PARAGRAPH>\r\n
</ARTICLE>\r\n
</SECTION>\r\n</DOC>",
"PN_DOC_DATA": null,
"MAIN_ITEM_INGR": "염산에페드린",
"INGR_NAME": "옥수수전분/유당/탈크/스테아린산마그네슘"
}
}
}

```