

Sérum Antiacne

SC-04124_01

Formulado com:

- **PHYCOSACCHARIDE AC**, seborregulador, antiacne, anti-inflamatório e cicatrizante. Eficaz em diferentes tipos de lesão de acne, com redução de tamanho e o número;
- **SKINPERF LWG**, atua como um reservatório intracutâneo de AHAs com liberação contínua e prolongada, alta eficácia e mínima irritação. Possui ação esfoliante e anti-imperfeições para uma superfície cutânea totalmente renovada em 2 semanas. Eficácia na atenuação de cicatrizes de acne.

| | Matéria Prima | INCI Name | % |
|---|-----------------------------|---|-------|
| A | Água | Water | 92,70 |
| | EDTA | Disodium EDTA | 0,10 |
| B | Glicerina | Glycerin | 3,00 |
| | Goma Xantana | Xanthan gum | 0,60 |
| C | Phycosaccharide AC | Glycerin (and) Water (and) Hydrolyzed Algin (and) Zinc sulfate | 1,00 |
| | Skinperf LWG | Water (and) Glycolic acid (and) Lactic acid (and) Sodium magnesium silicate (and) Citric acid (and) Xanthan gum | 2,00 |
| D | Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | 0,60 |
| E | Sol. Hidróxido de Sódio 30% | Water (and) Sodium Hydroxide | q.s.p |

Modo de preparo

Pesar a Fase A e colocar em agitação (400 – 500 rpm).

Pesar a Fase B separadamente, adicionar sobre A e aquecer até 80 °C em agitação (700 – 800 rpm).

Resfriar (35 – 40 °C), e adicionar item a item a Fase C, mantendo a homogeneização.

Adicionar a Fase D, mantendo a homogeneização.

Se necessário, ajustar o pH entre 5,5 – 6,5 com a Fase E.