

Mode de Conduite Floreal

2024 - 2025

Interrogations Floreal

- Le Floreal perd très vite ses feuilles en cas de stress hydrique
 - du coup ses grappes sont assez sur-exposées au soleil pendant la maturation ce qui n'est pas recherché pour faire des vins blancs vrais vifs, conservant les arômes thiols
 - Est-ce que le rogner tôt permet de faire redémarrer des entrecoeurs de la base des rameaux, qui, idéalement, viendraient protéger les grappes au mois d'août une fois les feuilles principales tombées ?
- Le Floreal n'est pas très productif : peu de grappes par rameaux en taille courte
 - La taille longue (guyot) permet-elle de regagner des rendements ?
- Coulure observée sur Floreal vigoureux :
 - Le rognage précoce permet-il de limiter cette coulure ?



Défoliation
dramatique en
cas de stress
hydrique



Surexposition
des grappes
pendant
maturation



Coulure





Standard

Guyot

Rogné

Mode de conduite standard



GUYOT



Rogné précocement (15 mai 2025) au moment du 1^{er} relevage

Entre les deux fils de relevage



Rappel conclusions 2024

- Modalité Guyot = intéressant pour homogénéité de rendement, permet + de rendement en zones faibles.
- Modalité Rogné précocement = intéressant en **zone vigoureuse**
 - effet protecteur des grappes : les entrecoeurs du haut redémarrent et retombent à partir du 1^{er} niveau de relevage
 - ➔ « effet casquette »
- Modalité Rogné précocement = pas intéressant en **zone faible**
 - Et même moins intéressant, car il n'y a pas de compensation de la surface foliaire perdue en haut du feuillage, et les feuilles du bas tombent dès les premiers stress hydriques modérés à forts
 - ➔ MOINS DE SURFACE FOLIAIRE

Mi-août, à récolte

Mode de conduite standard

« Casquette »



Grappes
exposées



VIG+



Mode de conduite standard




Rogné précocement



Floreal Rogné en zone faible =
Pas + de feuilles, défolié quand
même

Rogné précocement





Floreal Rogné en zone vig +
→ Casquette de feuilles

GUYOT



Récolte



	Rendement (kg/cep)	écart-type
Guyot	2,09	0,32
Normal	1,63	0,42
Rogné	1,54	0,91
Guyot	1,43	0,17
Normal	1,57	0,05
Rogné	1,59	0,48



En 2025 pas de différences

Nombre de grappes par cep



		Nb grappes / cep	écart-type
2024	Guyot	15,55	0,55
	Normal	12,75	3,46
	Rogné	11,33	4,93
2025	Guyot	13,04	1,32
	Normal	14,85	3,29
	Rogné	13,40	2,98



Guyot = + homogène

Poids des grappes


		Poids d'une grappe (g)	écart-type
2024	Guyot	134	18
	Normal	129	13
	Rogné	128	33
2025	Guyot	109	3
	Normal	110	21
	Rogné	117	17



En 2025 grappes 1 peu + grosses modalité rognée (- coulure ?)


Coulure

Essais mode de conduite Floreal 2024
Coulure



VIG+


Essais mode de conduite Floreal 2025
Coulure




VIG+

% défoliation

Essais mode de conduite Floreal 2024
% défoliation août



Essais mode de conduite Floreal 2025
% défoliation mi-juillet



Conclusion

- Rogner le Floreal ?
 - ➔ OUI ssi en zone vigoureuse
 - ➔ NON si parcelle contraignante
- Floreal en guyot ?
 - ➔ OUI pour gagner des rendements sur parcelle hétérogène