

Nombre Comercial: Ibupirac

Ingrediente Activo: - Ibuprofeno **Indicaciones:** - Alivio del dolor, inflamación y fiebre **Dosis Recomendada:** - Adultos: 200-400 mg cada 4-6 horas según necesidad - Niños: Depende del peso; consultar dosificación pediátrica **Contraindicaciones:** - Úlcera péptica activa, insuficiencia renal grave, alergia al ibuprofeno **Efectos Secundarios:** - Náuseas, dolor abdominal, cefalea, mareos **Interacciones Medicamentosas:** - Puede aumentar efectos de anticoagulantes, reducir efectividad de antihipertensivos **Formas de Presentación:** - Tabletas, cápsulas, suspensión oral **Observaciones Adicionales:** - No usar junto con otros AINEs sin consultar a un médico

Nombre Comercial: Actron

Ingrediente Activo: - Ibuprofeno **Indicaciones:** - Alivio del dolor moderado, fiebre, inflamación **Dosis Recomendada:** - Adultos: 200-400 mg cada 4-6 horas - Niños: Dosis basada en peso **Contraindicaciones:** - Hipersensibilidad al ibuprofeno, problemas gastrointestinales severos **Efectos Secundarios:** - Irritación gástrica, diarrea, fatiga **Interacciones Medicamentosas:** - Interacción con diuréticos y antihipertensivos **Formas de Presentación:** - Cápsulas, tabletas **Observaciones Adicionales:** - Evitar el consumo excesivo de alcohol durante el tratamiento

Nombre Comercial: Perifar

Ingrediente Activo: - Ibuprofeno **Indicaciones:** - Dolor, fiebre, inflamación **Dosis Recomendada:** - Adultos: 400 mg cada 4-6 horas según necesidad - Niños: Consultar con el pediatra **Contraindicaciones:** - Alergia al ibuprofeno, úlcera gástrica, asma inducida por AINEs **Efectos Secundarios:** - Dolores de cabeza, mareos, malestar estomacal **Interacciones Medicamentosas:** - Efectos aumentados con anticoagulantes, problemas con medicamentos para la presión arterial **Formas de Presentación:** - Tabletas, suspensión oral **Observaciones Adicionales:** - Tomar con alimentos para reducir la irritación estomacal

Nombre Comercial: Aspirinetas

Ingrediente Activo: - Ácido acetilsalicílico (Aspirina) **Indicaciones:** - Alivio del dolor leve a moderado, fiebre, prevención de eventos cardiovasculares **Dosis Recomendada:** - Adultos: 500-1000 mg cada 4-6 horas - Niños: Dosis basada en peso (consultar pediatra) **Contraindicaciones:** - Enfermedades gastrointestinales activas, alergia al ácido acetilsalicílico, niños con síndrome de Reye **Efectos Secundarios:** - Irritación gástrica, sangrado, reacciones alérgicas **Interacciones Medicamentosas:** - Potencia efectos de anticoagulantes, interfiere con algunos antihipertensivos **Formas de Presentación:** - Tabletas, grageas **Observaciones Adicionales:** - Usar con precaución en pacientes con antecedentes de úlceras o problemas de coagulación

Nombre Comercial: Amoxidal

Ingrediente Activo: - Amoxicilina **Indicaciones:** - Infecciones bacterianas como infecciones respiratorias, urinarias, de piel **Dosis Recomendada:** - Adultos: 500 mg cada 8 horas - Niños: Dosis ajustada al peso **Contraindicaciones:** - Alergia a las penicilinas **Efectos Secundarios:** - Diarrea, náuseas, erupciones cutáneas **Interacciones Medicamentosas:** - Efectividad reducida por antibióticos bacteriostáticos **Formas de Presentación:** - Cápsulas, suspensión oral **Observaciones Adicionales:** - Tomar con agua, no con jugos de frutas debido a interacciones

Nombre Comercial: Trimox

Ingrediente Activo: - Amoxicilina **Indicaciones:** - Tratamiento de infecciones bacterianas como otitis media, faringitis, sinusitis **Dosis Recomendada:** - Adultos: 500 mg cada 8 horas - Niños: Dosis según peso corporal **Contraindicaciones:** - Hipersensibilidad a penicilinas o cefalosporinas **Efectos Secundarios:** - Alteraciones gastrointestinales, reacciones alérgicas **Interacciones Medicamentosas:** - Puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales **Formas de Presentación:** - Tabletas, suspensión **Observaciones Adicionales:** - Asegurarse de completar el ciclo completo de tratamiento

Nombre Comercial: Claritin

Ingrediente Activo: - Loratadina **Indicaciones:** - Alergias, alivio de los síntomas de rinitis alérgica, urticaria **Dosis Recomendada:** - Adultos: 10 mg una vez al día - Niños: 5 mg una vez al día (niños menores de 12 años) **Contraindicaciones:** - Hipersensibilidad a loratadina o a cualquier componente del producto **Efectos Secundarios:** - Dolor de cabeza, somnolencia, fatiga **Interacciones Medicamentosas:** - Posible interacción con inhibidores de la CYP3A4 y CYP2D6 **Formas de Presentación:** - Tabletas, jarabe **Observaciones Adicionales:** - No produce somnolencia en la mayoría de los pacientes

Nombre Comercial: Loralerg

Ingrediente Activo: - Loratadina **Indicaciones:** - Alivio de síntomas alérgicos como estornudos, picazón, ojos llorosos **Dosis Recomendada:** - Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mg diarios - Niños de 2 a 12 años: Dependiendo del peso **Contraindicaciones:** - Alergia a loratadina **Efectos Secundarios:** - Boca seca, cefalea, somnolencia **Interacciones Medicamentosas:** - Puede interactuar con algunos antifúngicos y antibióticos **Formas de Presentación:** - Tabletas, solución oral **Observaciones Adicionales:** - Considerar ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática

Nombre Comercial: Omeprasec

Ingrediente Activo: - Omeprazol **Indicaciones:** - Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), úlceras, y condiciones asociadas con exceso de ácido estomacal **Dosis Recomendada:** - Adultos: 20 mg una vez al día - Niños: Según prescripción médica **Contraindicaciones:** - Hipersensibilidad al omeprazol **Efectos Secundarios:** - Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, flatulencia **Interacciones Medicamentosas:** - Puede afectar la absorción de medicamentos como el clopidogrel **Formas de Presentación:** - Cápsulas, tabletas de liberación retardada **Observaciones Adicionales:** - No suspender abruptamente, puede causar rebote de ácido

Nombre Comercial: Ulcozol

Ingrediente Activo: - Omeprazol **Indicaciones:** - Úlceras pépticas, ERGE, síndrome de Zollinger-Ellison **Dosis Recomendada:** - Adultos: 20 mg diarios, ajustable según la condición - Niños: Ajuste según indicación médica **Contraindicaciones:** - Alergia a componentes del medicamento **Efectos Secundarios:** - Mareos, alteraciones del sueño, trastornos gastrointestinales **Interacciones Medicamentosas:** - Interacción con medicamentos para la tiroides y anticoagulantes **Formas de Presentación:** - Cápsulas, suspensión oral **Observaciones Adicionales:** - Se recomienda tomar 30 minutos antes de las comidas

Nombre Comercial: Glucofage

Ingrediente Activo: - Metformina **Indicaciones:** - Tratamiento de la diabetes tipo 2, especialmente en pacientes con sobrepeso **Dosis Recomendada:** - Adultos: Inicio con 500 mg, ajustable hasta 2000 mg diarios - Niños: Según criterio médico **Contraindicaciones:** - Insuficiencia renal o hepática, acidosis metabólica **Efectos Secundarios:** - Malestar gastrointestinal, disminución de vitamina B12 **Interacciones Medicamentosas:** - Riesgo de acidosis láctica con consumo de alcohol y otros medicamentos **Formas de Presentación:** - Tabletas, tabletas de liberación prolongada **Observaciones Adicionales:** - Monitorizar función renal regularmente

Nombre Comercial: Dabex

Ingrediente Activo: - Metformina **Indicaciones:** - Control de la glucemia en diabetes tipo 2 **Dosis Recomendada:** - Adultos: 500 mg dos veces al día, puede incrementarse - Niños: Ajuste según indicación médica **Contraindicaciones:** - Insuficiencia renal, enfermedades hepáticas **Efectos Secundarios:** - Náuseas, pérdida de apetito, diarrea **Interacciones Medicamentosas:** - Aumento de efectos hipoglicemiantes con otros antidiabéticos **Formas de Presentación:** - Tabletas **Observaciones Adicionales:** - No usar en pacientes con deshidratación severa

Nombre Comercial: Cozaar

Ingrediente Activo: - Losartán **Indicaciones:** - Hipertensión arterial, protección renal en pacientes diabéticos **Dosis Recomendada:** - Adultos: 50 mg una vez al día, puede ajustarse a 100 mg - Niños: Según indicación médica **Contraindicaciones:** - Hipersensibilidad a losartán, embarazo **Efectos Secundarios:** - Mareos, fatiga, hipotensión **Interacciones Medicamentosas:** - Potencial interacción con diuréticos ahorradores de potasio **Formas de Presentación:** - Tabletas **Observaciones Adicionales:** - Evaluar función renal regularmente durante el tratamiento

Nombre Comercial: Losacor

Ingrediente Activo: - Losartán **Indicaciones:** - Tratamiento de la hipertensión, reducción del riesgo cardiovascular **Dosis Recomendada:** - Adultos: 50-100 mg diarios - Niños: Ajuste por pediatra **Contraindicaciones:** - Contraindicado en pacientes con alergias al losartán **Efectos Secundarios:** - Cansancio, dolor de cabeza, disminución de la presión arterial **Interacciones Medicamentosas:** - Interferencia con medicamentos que aumentan los niveles de potasio **Formas de Presentación:** - Tabletas **Observaciones Adicionales:** - Monitorizar la presión arterial regularmente

Nombre Comercial: Lipitor

Ingrediente Activo: - Atorvastatina **Indicaciones:** - Reducción del colesterol y los triglicéridos, prevención de enfermedades cardiovasculares **Dosis Recomendada:** - Adultos: 10-80 mg una vez al día - Niños: No recomendado para menores de 10 años **Contraindicaciones:** - Enfermedad hepática activa, embarazo, lactancia **Efectos Secundarios:** - Dolor muscular, aumento de enzimas hepáticas, fatiga **Interacciones Medicamentosas:** - Aumento del riesgo de miopatía con otros medicamentos reductores de lípidos **Formas de Presentación:** - Tabletas **Observaciones Adicionales:** - Monitorear función hepática antes y durante el tratamiento

Nombre Comercial: Atorlip

Ingrediente Activo: - Atorvastatina **Indicaciones:** - Manejo del colesterol alto y prevención de complicaciones cardíacas **Dosis Recomendada:** - Adultos: 10-40 mg diarios, ajustables según respuesta y recomendación médica - Niños: Uso cauteloso en adolescentes según indicación médica **Contraindicaciones:** - Hipersensibilidad a la atorvastatina, enfermedad hepática severa **Efectos Secundarios:** - Cefalea, náuseas, posibles dolores musculares **Interacciones Medicamentosas:** - Interacciones con ciclosporina, algunos antibióticos y antifúngicos **Formas de Presentación:** - Tabletas **Observaciones Adicionales:** - Evitar el consumo excesivo de alcohol durante el tratamiento

Nombre Comercial: Rivotril

Ingrediente Activo: - Clonazepam **Indicaciones:** - Tratamiento de trastornos convulsivos, trastornos de pánico **Dosis Recomendada:** - Adultos: 1.5 mg al día en dosis divididas, ajustable según necesidad y tolerancia - Niños: Ajuste de dosis según edad y peso **Contraindicaciones:** - Hipersensibilidad a benzodiazepinas, enfermedad respiratoria severa, glaucoma agudo **Efectos Secundarios:** - Somnolencia, disminución de la coordinación, depresión **Interacciones Medicamentosas:** - Potenciación de efectos con alcohol y otros depresores del SNC **Formas de Presentación:** - Tabletas, gotas orales **Observaciones Adicionales:** - Uso con precaución en pacientes con historia de dependencia a sustancias

Nombre Comercial: Klonopin

Ingrediente Activo: - Clonazepam **Indicaciones:** - Control de trastornos convulsivos, ansiedad **Dosis Recomendada:** - Adultos: Inicio con 0.25 mg dos veces al día, puede incrementarse - Niños: Dosificación individualizada **Contraindicaciones:** - Pacientes con trastornos respiratorios severos, glaucoma agudo **Efectos Secundarios:** - Ataxia, somnolencia, cambios en el estado de ánimo **Interacciones Medicamentosas:** - Efectos aumentados por el alcohol y medicamentos que afectan el SNC **Formas de Presentación:** - Tabletas, solución oral **Observaciones Adicionales:** - Riesgo de dependencia y síndrome de abstinencia con uso prolongado