Titolo a piena pagina della sezione 1

COLONNA SINISTRA 1. La chetosi da digiuno e autolimitata perche i corpi chetonici stimolano la secrezione insulinica e sopprimono direttamente la lipolisi, chiudendo il circuito di controllo.

COLONNA DESTRA 1. Nella chetoacidosi diabetica questo feedback manca: il combustibile abbonda e il difetto e l'insulina, quindi l'accumulo di chetoacidi procede senza freno.

Titolo a piena pagina della sezione 2

COLONNA SINISTRA 2. La chetosi da digiuno e autolimitata perche i corpi chetonici stimolano la secrezione insulinica e sopprimono direttamente la lipolisi, chiudendo il circuito di controllo.

COLONNA DESTRA 2. Nella chetoacidosi diabetica questo feedback manca: il combustibile abbonda e il difetto e l'insulina, quindi l'accumulo di chetoacidi procede senza freno.

Forma	BHB : acetoacetato	Glicemia
Digiuno	~1:1	normale-bassa
DKA	3-4:1	>250 mg/dL
Alcolica	7-10:1	ipoglicemia comune

Titolo a piena pagina della sezione 3

COLONNA SINISTRA 3. La chetosi da digiuno e autolimitata perche i corpi chetonici stimolano la secrezione insulinica e sopprimono direttamente la lipolisi, chiudendo il circuito di controllo.

COLONNA DESTRA 3. Nella chetoacidosi diabetica questo feedback manca: il combustibile abbonda e il difetto e l'insulina, quindi l'accumulo di chetoacidi procede senza freno.

Titolo a piena pagina della sezione 4

COLONNA SINISTRA 4. La chetosi da digiuno e autolimitata perche i corpi chetonici stimolano la secrezione insulinica e sopprimono direttamente la lipolisi, chiudendo il circuito di controllo.

COLONNA DESTRA 4. Nella chetoacidosi diabetica questo feedback manca: il combustibile abbonda e il difetto e l'insulina, quindi l'accumulo di chetoacidi procede senza freno.

Titolo a piena pagina della sezione 5

COLONNA SINISTRA 5. La chetosi da digiuno è autolimitata perche i corpi chetonici stimolano la secrezione insulinica e sopprimono direttamente la lipolisi, chiudendo il circuito di controllo.

COLONNA DESTRA 5. Nella chetoacidosi diabetica questo feedback manca: il combustibile abbonda e il difetto è l'insulina, quindi l'accumulo di chetoacidi procede senza freno.

Forma	Chetosi da digiuno	DKA	Alcolica	SGLT2i
Meccanismo chiave	risposta fisiologica al mancato apporto	carenza insulinica assoluta o relativa	NADH dal metabolismo dell etanolo	glicosuria forzata e turnover ATP alterato
Severita acidosi	lieve, HCO3 raramente <18	severa, HCO3 spesso <10	severa, HCO3 spesso <15	moderata-severa
Glicemia	normale-bassa	alta, tipicamente >250 mg/dL	bassa, ipoglicemia comune	normale, se alta di solito <250
BHB : acetoacetato	circa 1:1 (fino a 3:1)	3-4:1	7-10:1 o piu	tipicamente >3:1