

Стохастическая оптимизация в равновесных и минимаксных задачах

И. Н. Игнашин

Московский физико-технический институт

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Грабовой А. В.

Научный консультант: Ярмошик Д. В.

2025

Stochastic Origin Frank–Wolfe

- ▶ Постановка задачи равновесного распределения потоков
- ▶ Стохастический оракул линейной минимизации
- ▶ Улучшенная теорема сходимости

ALSO: невыпукло–сильно вогнутая постановка

- ▶ Min–max формулировка
- ▶ Сильная вогнутость по весам
- ▶ Теоретические гарантии

Мотивация и постановка задачи

Рассматривается классическая задача поиска **равновесного распределения потоков** в транспортной сети.

Обозначения:

- ▶ $\mathcal{E}$ — рёбра транспортного графа,
- ▶ OD — множество пар источник–сток,
- ▶ $\mathcal{P}_{i,j}$ — множество путей между (i,j) ,
- ▶ x_p — поток по пути p ,
- ▶ $f_e = \sum_p x_p \delta_{e \in p}$ — поток по ребру,
- ▶ $\tau_e(f_e)$ — функция времени проезда.

Принцип Вардропы: каждый агент выбирает маршрут с минимальными индивидуальными затратами.

Эквивалентная оптимизационная задача

Поиск равновесия эквивалентен решению выпуклой задачи Бекмана:

$$\min_{f=\Theta x, x \in X} \Psi(f) = \sum_{e \in \mathcal{E}} \int_0^{f_e} \tau_e(z) dz$$

где

$$X = \left\{ x \geq 0 : \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,j}} x_p = d_{i,j}, \quad \forall (i,j) \in OD \right\}.$$

Следствие: задача решается методом Frank–Wolfe, где линейный оракул соответствует поиску кратчайших путей.

Stochastic Origin Frank–Wolfe

Рассматривается выпуклая задача Бекмана для транспортного равновесия, решаемая методом Frank–Wolfe с линейным оракулом, соответствующим решению задач кратчайшего пути для всех пар $(i, j) \in OD$.

Stochastic Origin FW: на каждой итерации алгоритма случайно сэмплируется подмножество корреспонденций $Q \subset OD$, для которых выполняется линейная минимизация, в то время как потоки для $OD \setminus Q$ остаются неизменными.

В результате получается **несмещённый стохастический линейный оракул**, существенно снижающий вычислительную сложность одной итерации при сохранении сходимости метода.

Сходимость Stochastic Origin Frank–Wolfe

Теорема (Stochastic Origin Frank–Wolfe)

Пусть функции задержек $\tau_e(\cdot)$ монотонны и липшицевы, а $\Psi(f) = \sum_{e \in \mathcal{E}} \int_0^{f_e} \tau_e(z) dz$ — выпуклый функционал Бекмана. Пусть на каждой итерации алгоритма Stochastic Origin Frank–Wolfe случайно сэмплируется подмножество корреспонденций равномерно из OD . Тогда для математического ожидания субоптимальности

$$\Delta_k := \mathbb{E}[\Psi(F(x^k))] - \Psi(F(x^*))$$

при выборе шага

$$\gamma_k = \frac{2}{k + 2|OD|}$$

выполняется оценка

$$\Delta_k \leq \frac{2|OD|}{k + 2|OD|} \left(C_{\Psi}^{\otimes} + \Psi(F(x^0)) - \Psi(F(x^*)) \right),$$

где $C_{\Psi}^{\otimes}$ — константа гладкости.

Следствие: алгоритм обладает сходимостью порядка $\mathcal{O}(1/k)$ при существенно меньшей стоимости одной итерации.

Min-max постановка

Рассматривается задача вида:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \max_{\pi \in \mathcal{U}} h(\theta, \pi),$$

где

$$h(\theta, \pi) = \sum_{i=1}^c \pi_i \left(\frac{c}{n} \sum_{j=1}^{n_i} f_{i,j}(\theta) \right) + \frac{\tau}{2} \|\theta\|_2^2 - \lambda \text{KL}[\pi \| \hat{\pi}].$$

Свойства:

- ▶ функция $h(\theta, \pi)$ может быть невыпуклой по θ ;
- ▶ функция $h(\theta, \pi)$ является λ -сильно вогнутой по π за счёт KL-регуляризации.

Алгоритм ALSO: две ключевые операции

Рассматривается $\Phi(\theta) = \max_{\pi \in D_\pi} h(\theta, \pi)$. ALSO чередует:

- ▶ стохастический адаптивный шаг по θ (Adam) по градиенту $\nabla_\theta h(\theta^k, \pi^k)$;
- ▶ mirror/prox-обновление по π с KL-геометрией (шаг по $\nabla_\pi h$ и KL-регуляризатору).

$$\theta^{k+1} = \theta^k - \gamma_\theta \text{Adam}\left(g_\theta^k; \beta_1, \beta_2, \varepsilon\right), \quad g_\theta^k \approx \nabla_\theta h(\theta^k, \pi^k).$$

$$\pi^{k+1} = \arg \min_{\pi \in D_\pi} \left\{ \gamma_\pi \left\langle g_\pi^k + \lambda \log \frac{\pi}{\hat{\pi}}, \pi \right\rangle + \text{KL}[\pi \| \pi^k] \right\}, \quad g_\pi^k \approx \nabla_\pi h(\theta^k, \pi^k).$$

Замечание (для слайда): optimistic-коррекция (α) и weight decay (τ) — опциональные детали реализации; в частности, вариант $\alpha = 0$ соответствует “descent-ascent” версии.

Основная теорема сходимости ALSO: постановка и итоговая оценка

Theorem 4.5 (в статье): ε -стационарность по θ

Пусть выполнены Assumptions 4.1–4.3. Тогда для задачи (4) метод ALSO (Algorithm 1) при подходящем выборе гиперпараметров достигает ε -стационарности

$$\mathbb{E} \|\nabla \Phi(\theta^t)\|_2^2 \leq \varepsilon^2$$

за

$$T = O\left(\frac{L^4}{\lambda^4 \varepsilon^2} \cdot \max\{\Delta_\Phi \cdot (K + \sigma), D_0\}\right) \quad \text{итераций.}$$

Обозначения (минимально): $\Delta_\Phi = \Phi(\theta^0) - \min_\theta \Phi(\theta)$,
 $D_0 = \text{KL}(\pi^*(\theta^0) \|\pi^0)$, L, K — константы гладкости/гетерогенности в статье,
 σ — дисперсия стохастического оракула, $B = O(\sigma^2/\varepsilon^2)$.

Следствие: при $B = O(1/\varepsilon^2)$ суммарная стохастическая сложность становится $O(1/\varepsilon^4)$.

Результаты, выносимые на защиту

1. **Stochastic Origin Frank–Wolfe (SOFW)** для транспортного равновесия. Получена теоретическая оценка сходимости для алгоритма Stochastic Origin Frank–Wolfe, рассматриваемого как частный случай batched-версии Block-Coordinate Frank–Wolfe.
2. **ALSO** для невыпукло–сильно вогнутых DRO/min–max задач. Получена теоретическая оценка сходимости метода ALSO для невыпукло– μ -сильно вогнутой минимаксной постановки, усиливающая ранее известные результаты для случая простой вогнутости.

Апробация / статус

- ▶ ALSO: принято на NeurIPS Workshop OPT/OPT-ML 2025.
- ▶ SOFW: Выступление на конференции TFN-2025 (Traffic Flows on Networks, Sirius). Публикация в *Journal of Mathematical Sciences, Series B*.