

第 5 章 伪球面和双曲平面

Wayne Zheng

2025 年 6 月 1 日

贝尔特拉米 (Beltrami) 是意大利数学家, 对双曲几何有重要贡献。他也发现了拉格朗日力学中的贝尔特拉米等式。他 also 知道局部的高斯-博内定理。

1 利用变分原理证明广义斯涅尔定律

贝尔特拉米等式。考虑作用量

$$S = \int L(u, u', x) dx$$

使函数 $u(x)$ 取到极值。这里 x 是描述系统演化的独立参数 (类比于时间 t), u 可以看作是广义坐标。可以定义广义动量 $p = \partial L / \partial u'$ 。此时变分原理导出的拉格朗日方程简化为

$$\frac{dp}{dx} - \frac{\partial L}{\partial u} = 0.$$

哈密顿量 $H = u'p - L$ 。利用拉格朗日方程, 则可以得到贝尔特拉米等式:

$$\frac{dH}{dx} = \left(pu'' + \frac{dp}{dx} u' \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial u} u' + \frac{\partial L}{\partial u'} u'' + \frac{\partial L}{\partial x} \right) = -\frac{\partial L}{\partial x}.$$

这是诺特定理的一个特例。

考虑光在介质中的传播, 坐标是 (x, y) , 路径可以表示成曲线 $y = y(x)$ 。不妨进一步假设折射率只是纵坐标的函数 $n = n(y)$ 。则光从 x_A 到 x_B 的作用量为

$$\begin{aligned} S &= \int_{x_A}^{x_B} \frac{ds}{v} = \int_{x_A}^{x_B} \frac{1}{v(y)} \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_{x_A}^{x_B} n(y) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx \equiv \int_{x_A}^{x_B} L dx. \end{aligned} \tag{1}$$

拉氏量 $L = n(y) \sqrt{1 + y'^2}$ 。哈密顿量

$$H = y'p - L = -\frac{n(y)}{\sqrt{1 + y'^2}}. \tag{2}$$

根据贝尔特拉米等式, 易得 $dH/dx = 0$, 即 $H = -C$ 是一个常数, 也就意味着系统沿着 x 方向具有连续的平移不变性, 从而对应有一个守恒量, 这个守恒量

$$\frac{n(y)}{\sqrt{1 + y'^2}} = n(y) \frac{dx}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = n(y) \sin \theta = C \tag{3}$$

给出了连续介质的斯涅尔定律, θ 是光线与入射平面的法线的夹角。这与几何方法得到的斯涅尔定律一致。

下面讨论两个例子。