

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0319

Paginas del documento: 6

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Correlación entre la grasa visceral y la grasa por región corporal utilizando DXA, una cohorte de estudio de 2018 a 2023 en Medellín

Correlation between visceral fat and fat by body region using DXA, a study cohort from 2018 to 2023 in Medellin

Correlação entre gordura visceral e gordura por região corporal usando DXA, um estudo de coorte de 2018 a 2023 em Medellín

Luis Felipe Bedoya-Bedoya^{1*}, Andrea Corrales-Hernández², Meggie Carolina Neira-Rueda³, Katherine Franco-Hoyos⁴, Santiago Gómez-Velasquez⁵.

Introducción: La obesidad es una enfermedad crónica con comorbilidades asociadas, caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal, un aspecto clave es su distribución entre tejido subcutáneo y especialmente tejido visceral, lo cual representa un grave problema de salud pública a nivel mundial. La evidencia actual considera el DXA como método criterio para la evaluación de la composición corporal.

Objetivo: Determinar si existe correlación entre la grasa por regiones corporales y tejido adiposo visceral.

Métodos: Estudio de tipo cuantitativo, de corte transversal con fuente de información secundaria procedente de registros de consultas con valoraciones por DXA entre 2018-2023 en Medellín. Se utilizó análisis de correlación y método de regre-

ción fuerte con el área tejido adiposo visceral (VAT) ($Rho=0,766$ en mujeres y $Rho=0,850$ en hombres). En el grupo de las mujeres las variables IMC, masa-grasa tronco/masa-grasa total y % de grasa en región androide explican la variabilidad del área VAT en un 68,3%. En los hombres, las variables y % de grasa en región androide y androide/ginoide explican el 76% de la variabilidad en el área VAT.

Conclusiones: Los resultados de este estudio destacan el % de grasa en región androide como un predictor en los modelos de regresión lineal para ambos grupos (mujeres y hombres).

Palabras clave: grasa intraabdominal, absorciometría de rayos X, composición corporal, distribución de la grasa corporal, adulto.

Keywords: Intra-abdominal fat; dual-energy X-ray absorptiometry; body composition; body fat distribution; adult.

Palavras-chave: gordura intra-abdominal, absorciometria de fóton, composição corporal, distribuição da gordura corporal, saúde do adulto.

¹ Nutricionista dietista; magíster en nutrición deportiva; docente-investigador, Universidad CES.

² Estudiante Nutrición y Dietética, Universidad CES.

³ Estudiante Nutrición y Dietética, Universidad CES.

⁴ Nutricionista dietista; magíster en nutrición deportiva; docente-investigador, Universidad CES.

⁵ Ingeniero de alimentos; magíster en salud pública; especialista en estadística; doctorando en epidemiología y estadística; docente-investigador, Universidad CES.

Relación entre la ingesta de líquidos y el estado de hidratación en patinadores de carrera durante un entrenamiento

*Relationship between fluid intake and hydration status
in speed skaters during a training session*

*Relação entre a ingestão de líquidos e o estado de hidratação em patinadores de
velocidade durante um treino*

Brigitt K. Berdugo-Alomias^{1*}, Tatiana González-Correa¹, Valeria González-Mondragón¹,
Valentina Hurtado-Truque¹, Erleney Rincón-Quintero¹.

Introducción: mantener un estado óptimo de hidratación es fundamental en deportes de alta intensidad como el patinaje de carrera, donde las pérdidas de líquidos y electrolitos durante el entrenamiento pueden comprometer el rendimiento y la salud del atleta.

Objetivo: analizar la relación entre el tipo de bebida, la ingesta de líquidos y el estado de hidratación en un grupo de patinadores de carrera durante una sesión de entrenamiento.

Métodos: se llevó a cabo un estudio cuantitativo, transversal y descriptivo con una muestra de 20 patinadores (50 % hombres y 50 % mujeres), con una edad promedio de $19,65 \pm 3,2$ años. El estado de hidratación se evaluó mediante la gravedad específica de la orina (GEO) utilizando un refractómetro manual. Asimismo, se estimó la tasa de sudoración y la pérdida de peso corporal después del entrenamiento. Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de correlación de Spearman.

Resultados: el 75 % de los participantes inició y finalizó el entrenamiento en estado de euhidratación. El consumo fue de

solo agua con una cantidad promedio de $593,4 \pm 316,2$ ml y la pérdida de peso por sudoración fue de $0,54 \pm 0,6$ %. En las mujeres se observó una correlación negativa moderada entre el volumen ingerido y la pérdida de peso, mientras que en los hombres se evidenció una correlación positiva entre la tasa de sudoración y la pérdida de peso.

Conclusión: bajo condiciones de esfuerzo moderado y con consumo de agua, los deportistas podrían mantener un balance hídrico adecuado. Asimismo, se destacan la existencia de patrones diferenciados de hidratación según el sexo.

Palabras clave: sudoración; bebidas deportivas; atletas; cambios en el peso corporal; estado de hidratación del organismo.

Keywords: sweating; sport drinks; athletes; body weight change; organism hydration status.

Palavras-chave: sudorese, bebidas esportivas, atletas, alterações do peso corporal, estado de hidratação do organismo.

Alternativas caseras de procesamiento para modificar la textura de los alimentos: caracterización y composición nutricional

Home-based processing alternatives for modifying food texture: characterization and nutritional composition

Alternativas caseiras de processamento para modificar a textura dos alimentos: caracterização e composição nutricional

Ruby Alejandra Villamil^{1*}, Cindy Natalia Sepúlveda-Valbuena¹, Andrés Giraldo-Toro¹.

Introducción: las características de la textura de los alimentos modificados mecánicamente deben ser estudiadas para verificar la funcionalidad y viabilidad tanto tecnológica como fisiológica. Sin embargo, se sabe que las operaciones de procesamiento de alimentos pueden alterar la calidad nutricional de los alimentos por las diferentes variables fisicoquímicas involucradas, como el tiempo, temperatura, pH y actividad de agua durante el proceso de modificación de textura.

Objetivo: caracterizar la textura y composición nutricional de los alimentos al ser modificados tras operaciones mecánicas a escala casera.

Métodos: este estudio seleccionará los cinco alimentos más consumidos de cada uno de los siguientes grupos (frutas, verduras, raíces/tubérculos/plátanos, cereales, carnes/leguminosas) según la ENSIN 2015. Estos alimentos deben ser susceptibles a modificaciones de textura mediante procesos mecánicos (trozar, moler, licuar, diluir) y térmicos (vapor, hervir, freír) para formar parte de un menú. Se prepararán 25 muestras con diferentes

texturas, las cuales serán clasificadas utilizando la escala IDDSI (Iniciativa Internacional de Estandarización de la Dieta para la Disfagia) mediante pruebas específicas para cada alimento y su transformación. Para esto se seguirá un diseño completamente al azar $y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$, donde H_0 : las operaciones no generan variación en la textura alimento y H_1 : las operaciones generan variación en la textura del alimento.

Resultados esperados: aportar conocimiento sobre la técnica, textura y características nutricionales de alimentos modificados mecánicamente para facilitar una alimentación segura y agradable a quienes lo necesitan, especialmente a nivel casero.

Palabras clave: manipulación de alimentos; composición de alimentos; viscosidad.

Keywords: food handling; food composition; viscosity.

Palavras-chave: manipulação de alimentos, composição de alimentos, viscosidade.

Efectos de la implementación de la dieta cetogénica sobre los factores médico-nutricionales en pacientes con epilepsia refractaria

Effects of implementing the ketogenic diet on medical and nutritional factors in patients with refractory epilepsy

Efeitos da implementação da dieta cetogénica sobre fatores médico-nutricionais em pacientes com epilepsia refratária

Laura Victoria Guio^{1*}, Natalia Sepúlveda-Valbuena², Ruby Alejandra Villamil-Parra³.

Introducción: la epilepsia refractaria afecta a cerca del 30,00% de los pacientes con epilepsia, quienes no logran control adecuado con medicamentos anticonvulsivos. Esta condición compromete gravemente su calidad de vida, desarrollo neurológico y estado nutricional. La dieta cetogénica (DC), caracterizada por un alto contenido de grasas y bajo en carbohidratos, ha mostrado ser una intervención prometedora para reducir la frecuencia de crisis epilépticas.

Objetivo: evaluar los efectos de la DC sobre la frecuencia de crisis, estado nutricional, parámetros bioquímicos, calidad de vida y patrón alimentario en pacientes pediátricos con epilepsia refractaria.

Hipótesis: la implementación de la DC mejora el control de las crisis epilépticas y promueve un estado nutricional adecuado.

Métodos: estudio descriptivo longitudinal retrospectivo en pacientes de 0 a 18 años atendidos en la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI). Se evaluarán variables clínicas, bio-

químicas (perfil lipídico, transaminasas, cuerpos cetónicos), antropométricas y de calidad de vida (QOLIE-31), con seguimiento a los 6 y 12 meses del inicio de la intervención.

Resultados esperados: observar una disminución significativa en la frecuencia de crisis, mejoría en la calidad de vida y adaptación metabólica positiva, con modificaciones en los biomarcadores analizados. Esta investigación busca aportar evidencia sobre la seguridad y eficacia de la DC como terapia complementaria en epilepsia pediátrica refractaria.

Palabras clave: dieta cetogénica, epilepsia refractaria, calidad de vida, crecimiento.

Keywords: diet ketogenic; drug-resistant epilepsy; quality of life; growth.

Palavras-chave: dieta cetogênica, epilepsia resistente a medicamentos, qualidade de vida, crescimento.

¹ Epileptóloga de la Fundación Hospital de la Misericordia. Educerebrix.

² Nutricionista dietista, MSc, PhD. Docente, Pontificia Universidad Javeriana.

³ Nutricionista dietista, MSc, PhD. Docente, Pontificia Universidad Javeriana.

Validez y confiabilidad de los criterios GLIM en pacientes colombianos sometidos a cirugía cardíaca

Validity and reliability of GLIM criteria in Colombian patients undergoing cardiac surgery

Validade e confiabilidade dos critérios GLIM em pacientes colombianos submetidos a cirurgia cardíaca

Mateo Londoño-Pereira^{1*}, Maite Catalina Agudelo-Cifuentes², Nora Múnera³, Sara Paredes³, Maritza Londoño³, Melissa Arango³, Mónica Yepes³.

Introducción: la desnutrición es una condición frecuente en pacientes sometidos a cirugía cardíaca que se asocia con desenlaces clínicos adversos. No obstante, no existen criterios validados unificados para el diagnóstico nutricional de esta población.

Objetivo: determinar la validez de criterio y la confiabilidad interevaluador de los criterios GLIM para el diagnóstico de desnutrición y la predicción de desenlaces.

Métodos: estudio observacional, analítico y longitudinal en adultos programados para cirugía cardíaca. La validez concurrente se estableció con la Valoración Global Subjetiva y la validez predictiva se determinó con el reingreso hospitalario a 30 días. La confiabilidad se estableció con dos evaluadores. Se siguieron las pautas, análisis y puntos de corte propuestos por la guía de validación de GLIM para definir la validez y la confiabilidad. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo en R y Jamovi.

Resultados: se demostró la confiabilidad interevaluador de GLIM con una concordancia casi perfecta (Kappa 0,94, IC 95% 0,88-0,99, p <0,001) y la validez predictiva de la desnutrición para el reingreso hospitalario (RRa 2,59, IC 95% 1,09 –7,02, p

0,04). Además, la masa muscular se asoció de manera inversa con los días de estancia (β -0,47 IC 95% -0,89 a -0,05, p 0,03). No se alcanzaron los umbrales para la validación concurrente (sensibilidad 88,0 %, IC 95% 68,8-97,5%; especificidad 76,9 %, IC 95% 56,4-91,0%). **Conclusión:** los criterios GLIM son confiables para el diagnóstico de la desnutrición y tienen validez predictiva para desenlaces relevantes en pacientes de cirugía cardíaca, respaldando su utilidad y aplicabilidad clínica.

Palabras clave: desnutrición proteico-calórica, estudio de validación, procedimientos quirúrgicos cardíacos, recuperación mejorada después de cirugía, reproducibilidad de los resultados.

Keywords: protein-energy malnutrition; validation study; cardiac surgical procedures; enhanced recovery after surgery; reproducibility of results.

Palavras-chave: desnutrição proteico-calórica, estudo de validação, procedimentos cirúrgicos cardíacos, recuperação pós-cirúrgica melhorada, reprodutibilidade dos testes.

¹ Centro Latinoamericano de Nutrición (CELAN). Chía, Colombia.

² Facultad de Enfermería, Universidad CES. Medellín, Colombia.

³ Departamento de Nutrición Clínica, Clínica Las Américas AUNA. Medellín, Colombia.