

# Déduction naturelle

OPTION INFORMATIQUE - TP n° 4.5 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

- lire un séquent
- décrire les règles d'introduction et d'élimination
- justifier les principaux raisonnements de la logique classique
- construire un arbre de preuve démontrant une formule simple

## A Utilisation des règles d'inférence

Prouver les séquents suivants :

A1.  $\vdash p \rightarrow p$

**Solution :**

$$\frac{\overline{p \vdash p}^{\text{ax}}}{\vdash p \rightarrow p} \rightarrow_i$$

A2.  $p, \neg p \vdash \perp$

**Solution :**

$$\frac{\overline{p, \neg p \vdash p}^{\text{ax}} \quad \overline{p, \neg p \vdash \neg p}^{\text{ax}}}{p, \neg p \vdash \perp} \neg_e$$

A3.  $p, q \vdash p \wedge q$

**Solution :**

$$\frac{\overline{p, q \vdash p}^{\text{ax}} \quad \overline{p, q \vdash q}^{\text{ax}}}{p, q \vdash p \wedge q} \wedge_i$$

A4.  $p \wedge q \vdash q \wedge p$

**Solution :**

$$\frac{\frac{\overline{p \wedge q \vdash p \wedge q} \text{ ax}}{p \wedge q \vdash q} \wedge_e \quad \frac{\overline{p \wedge q \vdash p \wedge q} \text{ ax}}{p \wedge q \vdash p} \wedge_e}{p \wedge q \vdash q \wedge p} \wedge_i$$

A5.  $p \vee q \vdash q \vee p$ **Solution :**

$$\frac{\overline{p \vee q \vdash p \vee q} \text{ ax} \quad \frac{\overline{p \vee q, p \vdash p} \text{ ax}}{p \vee q, p \vdash q \vee p} \vee_i \quad \frac{\overline{p \vee q, q \vdash q} \text{ ax}}{p \vee q, q \vdash q \vee p} \vee_i}{p \vee q \vdash q \vee p} \vee_e$$

A6.  $q \vdash p \rightarrow q$ **Solution :**

$$\frac{\overline{q, p \vdash q} \text{ ax}}{q \vdash p \rightarrow q} \rightarrow_i$$

A7.  $p \wedge q \vdash p \rightarrow q$ **Solution :**

$$\frac{\frac{\overline{p \wedge q, p \vdash p \wedge q} \text{ ax}}{p \wedge q, p \vdash q} \wedge_e}{p \wedge q \vdash p \rightarrow q} \rightarrow_i$$

A8.  $p, q \wedge r \vdash p \wedge q$ **Solution :**

$$\frac{\overline{p, q \wedge r \vdash p} \text{ ax} \quad \frac{\overline{p, q \wedge r \vdash q \wedge r} \text{ ax}}{p, q \wedge r \vdash q} \wedge_e}{p, q \wedge r \vdash p \wedge q} \wedge_i$$

A9.  $p \wedge q, r \wedge s \vdash p \wedge s$ **Solution :**

$$\frac{\frac{\overline{p \wedge q, r \wedge s \vdash p \wedge q} \text{ ax}}{p \wedge q, r \wedge s \vdash p} \wedge_e \quad \frac{\overline{p \wedge q, r \wedge s \vdash r \wedge s} \text{ ax}}{p \wedge q, r \wedge s \vdash s} \wedge_e}{p \wedge q, r \wedge s \vdash p \wedge s} \wedge_i$$



B4.  $a \rightarrow (b \rightarrow c) \vdash (a \wedge b) \rightarrow c$ **Solution :**

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash a \wedge b}{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash b} \text{ax} \quad \frac{\frac{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash a \wedge b}{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash a} \text{ax} \quad \frac{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash a \rightarrow (b \rightarrow c)}{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash b \rightarrow c} \text{ax}}{\frac{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash b}{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash b \rightarrow c} \wedge_e} \rightarrow_e \\
\frac{a \rightarrow (b \rightarrow c), a \wedge b \vdash b \rightarrow c}{a \rightarrow (b \rightarrow c) \vdash (a \wedge b) \rightarrow c} \rightarrow_i
\end{array}$$

B5.  $(a \wedge b) \rightarrow c \vdash a \rightarrow (b \rightarrow c)$ **Solution :** On pose  $\Gamma = (a \wedge b) \rightarrow c, a, b$ .

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Gamma \vdash a}{\Gamma \vdash a \wedge b} \text{ax} \quad \frac{\Gamma \vdash b}{\Gamma \vdash a \wedge b} \text{ax}}{\Gamma \vdash a \wedge b} \wedge_i \quad \frac{\Gamma \vdash (a \wedge b) \rightarrow c}{\Gamma \vdash a \wedge b \rightarrow c} \text{ax} \\
\frac{(a \wedge b) \rightarrow c, a, b \vdash c}{(a \wedge b) \rightarrow c, a \vdash b \rightarrow c} \rightarrow_i \\
\frac{(a \wedge b) \rightarrow c, a \vdash b \rightarrow c}{(a \wedge b) \rightarrow c \vdash a \rightarrow (b \rightarrow c)} \rightarrow_i
\end{array}$$

B6.  $a \rightarrow (b \rightarrow c), b \rightarrow a \vdash b \rightarrow c$ **Solution :** On pose  $\Gamma = a \rightarrow (b \rightarrow c), b \rightarrow a, b$ .

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Gamma \vdash b}{\Gamma \vdash a} \text{ax} \quad \frac{\Gamma \vdash b \rightarrow a}{\Gamma \vdash a} \rightarrow_e \quad \frac{\Gamma \vdash a \rightarrow (b \rightarrow c)}{\Gamma \vdash b \rightarrow c} \text{ax}}{\Gamma \vdash b \rightarrow c} \rightarrow_e \quad \frac{\Gamma \vdash b}{\Gamma \vdash b} \text{ax} \\
\frac{\Gamma \vdash b \rightarrow c}{a \rightarrow (b \rightarrow c), b \rightarrow a \vdash b \rightarrow c} \rightarrow_i
\end{array}$$

B7.  $p \rightarrow (q \vee r), \neg q, \neg r \vdash \neg p$ **Solution :** On pose  $\Gamma = p \rightarrow (q \vee r), \neg q, \neg r$ .

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Gamma, p \vdash p \rightarrow (q \vee r)}{\Gamma, p \vdash q \vee r} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p \vdash p}{\Gamma, p \vdash p} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p, q \vdash q}{\Gamma, p, q \vdash \perp} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p, q \vdash \neg q}{\Gamma, p, q \vdash \perp} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p, r \vdash r}{\Gamma, p, r \vdash \perp} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p, r \vdash \neg r}{\Gamma, p, r \vdash \perp} \text{ax}}{\Gamma, p \vdash \perp} \vee_e \\
\frac{\Gamma, p \vdash \perp}{p \rightarrow (q \vee r), \neg q, \neg r \vdash \neg p} \neg_i
\end{array}$$

B8.  $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, \neg r \vdash \neg q$

**Solution :** On pose  $\Gamma = p \rightarrow (q \rightarrow r), p, \neg r$ .

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma, q \vdash p}{\Gamma, q \vdash p} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, q \vdash p \rightarrow (q \rightarrow r)}{\Gamma, q \vdash q \rightarrow r} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, q \vdash q \rightarrow r}{\Gamma, q \vdash q} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, q \vdash q}{\Gamma, q \vdash r} \text{ax}}{\frac{\Gamma, q \vdash r}{\Gamma, q \vdash \perp} \neg_e} \neg_i \quad \frac{\Gamma, q \vdash \perp}{p \rightarrow (q \rightarrow r), p, \neg r \vdash \neg q} \neg_i$$

## C Preuves plus complexes

Prouver les séquents suivants :

C1.  $q \rightarrow r, \neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow r$

**Solution :** On pose  $\Gamma = q \rightarrow r, \neg q \rightarrow \neg p, p$ .

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash q \rightarrow r}{\Gamma \vdash q \rightarrow r} \text{te} \quad \frac{\Gamma, q \vdash q \rightarrow r}{\Gamma, q \vdash r} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, q \vdash r}{\Gamma, q \vdash q} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \neg q \vdash \neg q \rightarrow \neg p}{\Gamma, \neg q \vdash \neg p} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \neg q \vdash \neg p}{\Gamma, \neg q \vdash \neg q} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \neg q \vdash \neg q}{\Gamma, \neg q \vdash \perp} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \neg q \vdash \perp}{\Gamma, \neg q \vdash r} \perp_e \quad \frac{\Gamma, \neg q \vdash r}{\Gamma, \neg q \vdash r} \vee_e \quad \frac{\Gamma \vdash r}{q \rightarrow r, \neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow r} \rightarrow_i$$

C2.  $(p \wedge q) \rightarrow r \vdash (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$

**Solution :** On pose  $\Gamma = (p \wedge q) \rightarrow r$  et  $\psi = (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash p \wedge q}{\Gamma \vdash p \wedge q} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p, q \vdash p}{\Gamma, p, q \vdash p \wedge q} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p, q \vdash p \wedge q}{\Gamma, p, q \vdash r} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, p, q \vdash r}{\Gamma, p \vdash q \rightarrow r} \rightarrow_i \quad \frac{\Gamma, p \vdash q \rightarrow r}{\Gamma, p \vdash \psi} \vee_i \quad \frac{\Gamma, \neg p \vdash p \rightarrow r}{\Gamma, \neg p \vdash \psi} \vee_i \quad \frac{\Gamma, \neg p \vdash \psi}{\Gamma \vdash \psi} \vee_e \quad \frac{\Gamma \vdash p \rightarrow r}{\Gamma \vdash p \rightarrow r} \text{te} \quad \frac{\Gamma \vdash p \rightarrow r}{\Gamma \vdash (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)} \vee_e$$