



La CNMC pide revisar la colegiación obligatoria en el nuevo Código Deontológico de la Psicología, un estudio de la URJC valida la terapia con perros para la ansiedad adolescente y la APA alerta sobre el uso de chatbots en terapia: claves del 31 de agosto de 2026

LUNES 31 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

La CNMC recomienda revisar la colegiación obligatoria y aclarar conceptos en el nuevo Código Deontológico de la Psicología, aún en tramitación. Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos encuentra que la terapia con perros reduce la ansiedad en adolescentes con trastornos alimentarios. La revista "Psychosocial Intervention", del Colegio de Madrid, publica un estudio que vincula el apoyo social con menores desigualdades socioeconómicas en la salud mental de supervivientes de cáncer. La encuesta de la APA sobre chatbots revela que más de tres cuartas partes de los psicólogos estadounidenses ven pacientes que hablan de IA en terapia. Y un estudio de la Universidad de Columbia, publicado en Nature Medicine, halla que la neurogénesis se detiene en el hipocampo de personas con depresión mayor.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

La CNMC sugiere mejoras al nuevo Código Deontológico de la Psicología

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado, el 26 de agosto de 2026, un informe (INF/CNMC/130/26) en el que analiza la propuesta de nuevo Código Deontológico de la Psicología, que sustituirá al vigente desde 1987, reformado en 2010, 2014 y 2015. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos remitió el proyecto a la CNMC junto con la documentación del trámite de consulta e información pública y el informe de evaluación de proporcionalidad elaborado al efecto. La CNMC valora si las previsiones del Código son necesarias, proporcionadas y justificadas por razones de interés general, conforme al test de proporcionalidad previsto en la normativa europea y española. El organismo considera que la mayoría de las disposiciones regulan principios éticos de la profesión sin afectar directamente a su acceso o ejercicio, pero formula tres recomendaciones: invitar al legislador a clarificar la necesidad de colegiación para ejercer la psicología y revisar si está justificada en todas sus ramas; extender el análisis de proporcionalidad a todas las especialidades, dado que el Código será de obligado cumplimiento para todos los profesionales; y clarificar conceptos y previsiones del texto para facilitar su aplicación y reducir incertidumbres interpretativas. El informe tiene carácter consultivo, no vincula a la CNMC, y el Consejo General de la Psicología continúa con la tramitación del nuevo Código.

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

El apoyo social amortigua las desigualdades socioeconómicas en la salud mental de supervivientes de cáncer, según un estudio

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha difundido, el 27 de agosto de 2026, los contenidos del volumen 35 de su revista "Psychosocial Intervention", que incluye la investigación "El efecto amortiguador del estrés del apoyo social sobre las disparidades socioeconómicas en la salud mental entre los supervivientes de cáncer". El estudio utilizó datos de dos grandes encuestas realizadas en España en 2017 y 2023, con más de 2.000 personas supervivientes de cáncer como participantes, y analizó tres indicadores: el malestar psicológico (entendido como estrés percibido y baja autoestima), el bienestar psicológico positivo y la presencia de síntomas depresivos. El

hallazgo principal es que el impacto del nivel socioeconómico en la salud mental depende directamente de cuánto apoyo social percibe la persona: quienes recibieron menos apoyo social mostraron peor bienestar psicológico con independencia de su nivel socioeconómico, mientras que entre quienes contaban con un apoyo social alto las desigualdades socioeconómicas en salud mental se redujeron sustancialmente o desaparecieron por completo. Los participantes con nivel socioeconómico bajo y apoyo social medio presentaron el triple de riesgo de depresión no atendida en comparación con el grupo más favorecido económicamente, pero un apoyo social alto neutralizó esta disparidad al facilitar la gestión emocional de las personas con menos recursos. La revista, editada por el Colegio, ha adoptado este año un modelo de publicación continua.

Fuente: Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM), revista Psychosocial Intervention

CLÍNICA · NACIONAL

Un estudio de la URJC halla que la terapia con perros reduce la ansiedad en adolescentes con trastornos alimentarios

Una investigación impulsada por la Oficina de Intervenciones Asistidas con Animales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en colaboración con el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, y publicada en la revista Actas Españolas de Psiquiatría, ha evaluado el efecto de la terapia asistida con perros en 30 pacientes adolescentes, todas ellas mujeres, con trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia. Las participantes recibieron un programa de sesiones semanales de 50 minutos con perros, además de su tratamiento habitual, y los resultados se compararon con un grupo de control que continuó únicamente con la atención clínica estándar. Las adolescentes que participaron en las sesiones con perros lograron una reducción significativa en los niveles de ansiedad frente a las que no tuvieron contacto con los animales, y también mejoraron en aspectos como la desconfianza interpersonal y el miedo a madurar. Según Luis-Lucio Lobato Rincón, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del proyecto, los perros ayudan a crear un ambiente menos estresante que facilita que las adolescentes expresen sus sentimientos y reduzcan el miedo a ser juzgadas. El estudio señala que aún se requiere más investigación para

confirmar estos beneficios a largo plazo, aunque considera que incluir la terapia con perros en equipos multidisciplinares puede marcar una diferencia en la recuperación. El trabajo ha sido financiado por la Oficina de Intervenciones Asistidas con Animales de la URJC, en colaboración con el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la universidad.

Fuente: Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Noticias internacionales

CLÍNICA · INTERNACIONAL

Más de tres cuartas partes de los psicólogos estadounidenses afirman que sus pacientes hablan de IA en terapia

Según informa el medio Earth.com, la Encuesta sobre Chatbots y Salud Mental 2026 de la American Psychological Association (APA), realizada entre más de 1.200 psicólogos con licencia en Estados Unidos y distribuida en abril de 2026, señala que más de tres cuartas partes de los profesionales afirman que sus pacientes han mencionado el uso de inteligencia artificial en las sesiones de terapia. Según los datos recogidos, un 39 % de los psicólogos ha mantenido conversaciones con pacientes que utilizaron IA para autodiagnosticarse, alrededor de un tercio señaló que sus pacientes recurren a chatbots para reforzar la autodisciplina, las afirmaciones positivas o los recordatorios conductuales, y una proporción similar indicó que los pacientes usan la IA como apoyo al tratamiento o como un profesional de salud mental adicional. Un 36 % de los psicólogos reportó que sus pacientes desarrollaban cierto grado de dependencia hacia un chatbot, y un 15 % señaló la aparición de pensamiento distorsionado o delirios. En cuanto a las opiniones profesionales, un 93 % manifestó preocupación por el uso de esta tecnología en determinados pacientes, un 94 % considera que los chatbots actuales no pueden tratar problemas de salud mental con el nivel de matiz necesario, y un 89 % cree que pueden fomentar involuntariamente conductas autolesivas. Solo una cuarta parte de los psicólogos cree que los pacientes llegarán a preferir los chatbots frente a los profesionales humanos. El consejero delegado de la APA, Arthur C. Evans Jr., advirtió de que estos chatbots son "de apoyo en exceso" y

carecen de la capacidad de matiz o de alerta ante señales de riesgo que sí tienen los profesionales humanos.

Fuente: Earth.com, con datos de la Chatbots and Mental Health Survey de la American Psychological Association (APA)

Publicaciones científicas recientes

Peng, M. S., Jiang, J., Polizzi, L., Shi, T., Ramkumar, R., Anosike, V. O., Guasoni, G., Wamalwa, A. M., Mariani, M. B., Sissoko, C. A., Tartt, A. N., Fulmore, C., Rosoklija, G. B., Huang, Y., Arango, V., McDonald, S. T., Bitoljanu, N., Mann, J. J., Nguyen, P. T., Dwork, A. J., Brown, L. M., Hen, R., Galfalvy, H., & Dupont, M. B. (2026). Dysregulated adult hippocampal neurogenesis in major depressive disorders. *Nature Medicine*.

DOI: [10.1038/s41591-026-04571-8](https://doi.org/10.1038/s41591-026-04571-8)

Hallazgo: Un equipo de la Universidad de Columbia, liderado por la profesora de psiquiatría Maura Dupont, ha encontrado la primera evidencia de que la neurogénesis, el proceso de generación de nuevas neuronas, se detiene en el hipocampo de personas adultas con trastorno depresivo mayor. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron cerca de medio millón de células cerebrales obtenidas de personas con depresión y de un grupo control, recogidas poco después del fallecimiento de cada donante, y midieron mediante técnicas de análisis molecular de reciente desarrollo la actividad de cada gen en las células individuales. El estudio se centró en el hipocampo, una región implicada en la memoria episódica y en la respuesta emocional, y una de las pocas zonas del cerebro adulto que sigue generando nuevas neuronas. Los resultados muestran alteraciones moleculares que van más allá de la neurogénesis, con cambios en genes implicados en la formación de conexiones entre neuronas, la comunicación entre células cerebrales, el suministro de energía celular y el transporte de materiales dentro de las células, así como signos de inflamación y estrés celular en el circuito trisináptico del hipocampo.

Implicación clínica: Los autores sugieren que estos hallazgos podrían abrir la puerta a nuevos tratamientos dirigidos a distintas formas biológicas de la depresión, y plantean que el trastorno podría llegar a clasificarse según sus características moleculares, de forma similar a como se clasifican los distintos

tipos de cáncer. Los investigadores señalan que aún no se conoce el mecanismo completo, en particular en humanos, y apuntan que reactivar la neurogénesis podría ser una vía para tratar la depresión en algunas personas mediante la reorganización del circuito del hipocampo.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Chatbots de inteligencia artificial conversacional en el ámbito de la salud mental:** Aplicaciones de inteligencia artificial conversacional a las que recurren cada vez más pacientes para buscar apoyo emocional, autodiagnóstico o compañía, disponibles de forma gratuita o de bajo coste y sin listas de espera. Según los datos de la encuesta de la APA recogidos en este informe, los psicólogos advierten de que estas herramientas no sustituyen la atención profesional, ya que no cuentan con la misma capacidad de matiz clínico ni de detección de señales de alarma que un profesional humano.

Prioridades del día

Preguntar por el uso de IA conversacional en consulta

A la luz de los datos recogidos en la encuesta de la APA, puede ser útil incorporar en la anamnesis y el seguimiento una pregunta explícita sobre si la persona usuaria utiliza chatbots de IA para gestionar su malestar, con el fin de valorar posibles dependencias o creencias distorsionadas derivadas de su uso.

Incorporar la perspectiva del apego y la regulación emocional por sexo en adolescentes

De acuerdo con el estudio publicado en "Psychosocial Intervention", puede ser relevante diferenciar por sexo las estrategias de intervención en adolescentes, dado que el estudio encontró patrones distintos en la relación entre el apego

parental, la regulación emocional y la autoeficacia académica según fueran chicos o chicas.

Valorar el apoyo social como factor protector en pacientes con enfermedades crónicas

Puede ser oportuno explorar la red de apoyo social percibido en personas supervivientes de cáncer u otras enfermedades crónicas, ya que el estudio citado encontró que un apoyo social alto redujo sustancialmente las desigualdades socioeconómicas en la salud mental de este colectivo.

