



Psicología frente a la automatización, récord de bajas laborales por salud mental y espectro psicótico: claves del 6 de junio de 2026

SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

Un análisis publicado por la APA en su revista Monitor on Psychology confirma que la psicología clínica presenta el nivel más bajo de automatización de todas las especialidades psicológicas (12%) y el mayor porcentaje de contacto humano (88%), lo que la posiciona como una de las profesiones menos vulnerables a la sustitución tecnológica. En paralelo, datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo muestran que en 2024 se registraron 671.618 bajas laborales por problemas de salud mental en España, la cifra más alta desde 2016, con un aumento del 490% en seis años. A nivel internacional, un metaanálisis publicado en Nature Mental Health que abarca 96 estudios y más de 9.400 participantes identifica alteraciones comunes en la sustancia blanca del cuerpo calloso en el espectro de la psicosis, abriendo la vía a biomarcadores transdiagnósticos compartidos entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Noticias nacionales

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

La psicología clínica, entre las profesiones con menor riesgo de automatización según análisis de la APA

Un artículo publicado en la revista APA Monitor on Psychology, difundido por Infocop el 5 de junio de 2026, presenta datos cuantitativos sobre el grado de automatización de distintas ramas de la psicología. La psicología clínica y de la salud registra el nivel más bajo de automatización de todas las especialidades analizadas, con un 12%, frente al 22% de la neuropsicología clínica o el 24% de la docencia en psicología. La repetitividad de tareas en psicología clínica alcanza solo el 21%, la más baja de la disciplina, y el porcentaje de contacto con otras personas es del 88%, superando a otras profesiones como la economía (63%) o la sociología (66%). El análisis subraya que las habilidades relacionales, la escucha activa y la toma de decisiones clínicas contextualizadas son precisamente las más difíciles de reemplazar por sistemas automatizados, aunque señala que determinadas tareas administrativas y de registro sí podrían verse apoyadas por herramientas tecnológicas, liberando tiempo para la intervención directa.

Fuente: Infocop — Consejo General de la Psicología de España, citando APA Monitor on Psychology

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Récord histórico de bajas laborales por salud mental en España: 671.618 casos en 2024 y un aumento del 490% en seis años

Según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) recogidos por medios de información general en mayo de 2026, España registró 671.618 bajas laborales por problemas de salud mental en 2024, la cifra más alta desde 2016. En seis años los diagnósticos de estrés grave han crecido un 230% y los trastornos de ansiedad laboral un 120%. Los trastornos mentales son ya la segunda causa de baja laboral en el país, solo por detrás de los problemas musculoesqueléticos. El perfil más afectado son personas de entre 25 y 34 años y mujeres con contratos temporales y doble carga laboral y doméstica. El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 del Ministerio de Sanidad contempla 39 millones de euros para reforzar recursos humanos y crear casas de crisis, aunque los profesionales del sector lo describen como insuficiente ante la magnitud del problema. España mantiene una ratio de seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la red pública, frente a los 18 de media en los países de la OCDE.

Fuente: Según informa Moncloa, citando datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) e informe UGT 2025

Noticias internacionales

NEUROCIENCIA · INTERNACIONAL

Sustancia blanca del cuerpo calloso como biomarcador transdiagnóstico en el espectro psicótico

Un metaanálisis publicado en la revista *Nature Mental Health*, liderado por equipos de la Universidad de Florencia, el Hospital Universitario de Ginebra y la Escuela Politécnica Federal de Lausana, identificó alteraciones estructurales comunes en la sustancia blanca del cuerpo calloso tanto en personas con esquizofrenia como con trastorno bipolar. El análisis abarcó 96 estudios realizados en los últimos treinta años, con 4.424 participantes con trastornos del espectro psicótico y 5.004 controles sanos. Los resultados muestran reducciones en la anisotropía fraccional del cuerpo calloso y aumentos en la difusividad media en las fibras corticoespinales en ambos grupos, de forma consistente tras controlar edad y sexo. Según los autores, los resultados sugieren que el espectro de la psicosis podría compartir una vulnerabilidad biológica común y que las futuras intervenciones podrían orientarse a abordar estas interrupciones de la conectividad. Los investigadores anuncian la continuidad del trabajo con estudios longitudinales para determinar si estas alteraciones preceden a los primeros síntomas clínicos.

Fuente: Según informa Infobae, citando el artículo publicado en *Nature Mental Health*

Publicaciones científicas recientes

Saccaro, L. F., et al. (2025). A systematic review and meta-analysis of transdiagnostic impairments in white matter integrity across the psychosis continuum. *Nature Mental Health*.
<https://doi.org/10.1038/s44220-025-00573-6>

DOI: [10.1038/s44220-025-00573-6](https://doi.org/10.1038/s44220-025-00573-6)

Hallazgo: Metaanálisis de 96 estudios (4.424 pacientes con trastornos del espectro psicótico y 5.004 controles) confirma reducciones de anisotropía fraccional en el cuerpo calloso y aumentos de difusividad media en proyecciones corticoespinales, compartidas entre esquizofrenia y trastorno bipolar y consistentes tras controlar edad y sexo.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que las alteraciones de la sustancia blanca del cuerpo calloso podrían constituir un biomarcador transdiagnóstico del espectro psicótico, lo que puede orientar el diseño de intervenciones dirigidas a mejorar la conectividad cerebral con independencia del diagnóstico específico, aunque se requieren estudios longitudinales para determinar si estas alteraciones preceden a la aparición clínica de los trastornos.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Instrumentos de cribado del desgaste profesional en equipos sanitarios:** Ante el incremento sostenido de bajas laborales por salud mental, puede ser relevante incorporar en la práctica supervisora el uso de escalas validadas para la evaluación del burnout y el estrés laboral crónico en profesionales de la salud. Existen instrumentos de cribado disponibles en el ámbito clínico español que permiten identificar de forma temprana niveles elevados de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, facilitando la derivación o la intervención psicológica antes de que el cuadro se cronifique.

Prioridades del día

Incorporar la dimensión laboral en la evaluación psicológica inicial

Dado el incremento sostenido de bajas por salud mental vinculadas a condiciones laborales, puede ser relevante incluir de forma sistemática en la anamnesis preguntas sobre carga de trabajo, grado de autonomía, incertidumbre laboral y doble jornada, especialmente en población joven y en mujeres, perfiles con mayor concentración de bajas según los datos del INSST.

Esta información puede orientar el enfoque y los objetivos terapéuticos desde las primeras sesiones.

Revisar los criterios diagnósticos diferenciales en el espectro psicótico

Los hallazgos del metaanálisis publicado en Nature Mental Health sugieren que puede ser oportuno revisar la conceptualización clínica de la esquizofrenia y el trastorno bipolar como entidades estrictamente separadas. Aunque el diagnóstico diferencial sigue siendo clínicamente relevante, los solapamientos biológicos identificados en la conectividad del cuerpo calloso pueden ser útiles para explorar enfoques terapéuticos que aborden vulnerabilidades comunes, con independencia del diagnóstico de partida.

El análisis de la APA sobre automatización puede ser útil para fundamentar argumentos en favor de la incorporación de psicólogos clínicos en el sistema público de salud y en entornos laborales. El hecho de que la psicología clínica presente el menor índice de automatización (12%) y el mayor nivel de contacto humano (88%) de toda la disciplina refuerza la posición de la profesión en los debates sobre la reorganización del trabajo sanitario en un contexto de expansión de la inteligencia artificial.