



Publicada la convocatoria PIR 2026-2027 con 293 plazas de Psicología Clínica, Cataluña refuerza el apoyo psicológico en las aulas y un estudio vincula los agonistas GLP-1 con menor riesgo de empeoramiento en depresión y ansiedad: claves del 1 de septiembre de 2026

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El Ministerio de Sanidad ha publicado la convocatoria PIR 2026-2027, con 293 plazas de Psicología Clínica y examen el 23 de enero de 2027. Cataluña incorpora 28 psicólogos de apoyo al profesorado y refuerza otras medidas para el nuevo curso escolar. Un estudio publicado en Clinical and Health encuentra mejores tasas de abstinencia al dejar de fumar entre personas jóvenes que combinan terapia psicológica con una aplicación móvil. Un análisis de cohorte sueco publicado en The Lancet Psychiatry asocia el uso de semaglutida con un menor riesgo de empeoramiento en depresión, ansiedad y trastorno por uso de sustancias. La Organización Mundial de la Salud recuerda que uno de cada siete adolescentes en el mundo padece un trastorno mental.

Noticias nacionales

Publicada la convocatoria PIR 2026-2027 con 293 plazas de Psicología Clínica

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden SND/854/2026, de 4 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas 2026 para el acceso en 2027 a plazas de formación sanitaria especializada, entre ellas las de Psicología Clínica (PIR). Según recoge Infocop, medio editado por el Consejo General de la Psicología de España, el plazo de solicitudes ha comenzado el 1 de septiembre y finaliza el 14 de ese mismo mes. El examen se celebrará el 23 de enero de 2027 en 26 localidades del territorio nacional, con 200 preguntas más 10 de reserva, cuatro opciones de respuesta y corrección con resta de un punto por cada error. La convocatoria incluye un total de 12.850 plazas de formación sanitaria especializada, de las que 293 corresponden a Psicología Clínica: 269 de titularidad pública y 24 privada, con 29 reservadas al turno de personas con discapacidad. Son 13 plazas más que en la convocatoria anterior. Cataluña concentra la mayor oferta autonómica, con 53 plazas, seguida de Andalucía y Madrid, con 48 cada una. Entre las novedades, se incorporan equipos pasivos capaces de detectar dispositivos electrónicos ocultos durante el examen, como medida de prevención del fraude tecnológico. El Consejo General de la Psicología, el Defensor del Pueblo y la OCU han reclamado en distintas ocasiones seguir incrementando las plazas de Psicología Clínica, al considerar que la oferta actual, pese a su crecimiento sostenido, sigue siendo insuficiente frente al aumento de la demanda de atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Cataluña incorpora 28 psicólogos de apoyo al profesorado en el nuevo curso escolar

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha anunciado, según ha informado el diario ElNacional.cat, un conjunto de novedades para el curso escolar 2026-2027, que arranca el 8 de septiembre para más de 1,6 millones de

alumnos y unos 85.000 docentes. Entre las medidas dirigidas al bienestar del profesorado, se incorporarán al sistema 28 psicólogos que ofrecerán apoyo a los docentes para prevenir situaciones de desgaste profesional, en paralelo a la puesta en marcha de protocolos de desconexión digital para proteger el descanso fuera del horario laboral. El curso también incorpora refuerzos generales: 2.141 aulas de acogida para alumnado recién llegado, unas 500 más que el curso anterior, con un máximo de 18 alumnos por docente, y un incremento de plantilla de unos 1.103 docentes adicionales. Además, a partir de este septiembre, una parte de los centros catalanes –el 50 % este curso y la totalidad a partir de 2027-2028– contará con profesionales sanitarios de apoyo al alumnado que requiera cuidados de salud. El curso incorpora asimismo un documento de orientación actualizado sobre el uso de la inteligencia artificial en las aulas, que restringe el uso autónomo de herramientas de IA de propósito general al alumnado menor de catorce años y exige autorización explícita para el resto. Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre los sindicatos docentes y el Departament d'Educació en marzo y mayo de este año.

Fuente: Elnacional.cat

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OMS recuerda que uno de cada siete adolescentes en el mundo padece un trastorno mental

La Organización Mundial de la Salud mantiene actualizada su nota descriptiva sobre la salud mental de los adolescentes, revisada por última vez el 1 de septiembre de 2025. Según los datos que recoge, en todo el mundo, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años (el 14,3 %) padece algún trastorno mental, lo que representa el 15 % de la carga mundial de morbilidad de ese grupo de edad, y la mayoría de estos casos no reciben el reconocimiento ni el tratamiento que requieren. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento figuran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en la adolescencia, y el suicidio es la tercera causa

de muerte entre las personas de 15 a 29 años. La OMS calcula que un 4,1 % de los adolescentes de 10 a 14 años y un 5,3 % de los de 15 a 19 sufre trastorno de ansiedad, mientras que la depresión afecta al 1,3 % y al 3,4 % de esos mismos grupos de edad, respectivamente. La organización subraya que cuando un trastorno de salud mental en la adolescencia no se trata, sus consecuencias se extienden a la edad adulta y limitan las posibilidades de la persona de llevar una vida plena. Entre sus líneas de trabajo, la OMS destaca la iniciativa conjunta con Unicef Ayudar a los Adolescentes a Prosperar, orientada a fortalecer los programas y las políticas de salud mental dirigidos a este grupo de población.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Publicaciones científicas recientes

Taipale, H., y colaboradores (2026). Association between GLP-1 receptor agonist use and worsening mental illness in people with depression and anxiety in Sweden: a national cohort study. The Lancet Psychiatry.

DOI: [10.1016/S2215-0366\(26\)00014-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(26)00014-3)

Hallazgo: El estudio, publicado en The Lancet Psychiatry y firmado por Heidi Taipale y su equipo, analizó una cohorte nacional sueca de 95.490 personas con diagnóstico previo de depresión o ansiedad, comparando periodos de tratamiento y de no tratamiento dentro de cada persona (diseño intraindividual). Los resultados muestran que el uso de semaglutida se asoció a un 42 % menos de riesgo de empeoramiento de la salud mental en conjunto, con una reducción del 44 % en el riesgo de empeoramiento de la depresión, del 38 % en ansiedad y del 47 % en trastorno por uso de sustancias. La liraglutida se asoció únicamente a un menor riesgo de empeoramiento de la depresión. El empeoramiento se midió a través de hospitalización psiquiátrica, baja laboral, autolesión y muerte por suicidio.

Implicación clínica: Los propios autores y los expertos consultados por el Science Media Centre subrayan que se trata de un estudio observacional realizado en un único país, sin datos sobre etnia ni sobre gravedad de los síntomas, por lo que los resultados sugieren una posible asociación de seguridad y no permiten establecer causalidad. Los especialistas señalan que serán necesarios ensayos clínicos aleatorizados en población psiquiátrica para

confirmar si estos hallazgos se traducen en un beneficio clínico real, y advierten de que el título del estudio podría inducir a una lectura equivocada, ya que el resultado principal es una menor probabilidad de empeoramiento, no una mejora directa de los síntomas.

Suárez-Castro, D., López-Durán, A., Martínez-Vispo, C., Barroso-Hurtado, M., y Becoña, E. (2026). Abstinence outcomes according to age of a blended smoking cessation treatment with an app. *Clinical and Health*, 37, Artículo e260722.

DOI: [10.5093/clh2026a8](https://doi.org/10.5093/clh2026a8)

Hallazgo: El estudio, publicado en la revista *Clinical and Health*, editada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, analizó a 154 personas fumadoras divididas en dos grupos de edad (18 a 44 años y 45 años o más), todas ellas participantes en un tratamiento psicológico cognitivo-conductual grupal de ocho sesiones semanales complementado con una aplicación móvil de apoyo. Al finalizar el tratamiento, el 74,30 % de las personas de 18 a 44 años permanecía sin fumar, frente al 58,80 % del grupo de mayor edad; a los seis meses, las tasas de abstinencia fueron del 41,90 % y del 26,30 %, respectivamente. Los análisis mostraron que la edad fue un predictor significativo de la abstinencia a lo largo del tiempo. Antes de iniciar el tratamiento, el grupo más joven ya fumaba menos cigarrillos al día y mostraba menor dependencia de la nicotina. La satisfacción con el programa fue elevada en ambos grupos, aunque significativamente mayor entre los participantes más jóvenes.

Implicación clínica: Los autores plantean que la incorporación de la aplicación móvil como complemento del tratamiento psicológico podría explicar por qué, a diferencia de estudios previos que encontraban mejores resultados en personas fumadoras de más edad, en este caso el grupo más joven obtuvo mejores tasas de abstinencia. Concluyen que este tipo de herramientas digitales podría constituir una estrategia útil para favorecer la abstinencia en la población fumadora más joven, aunque advierten de que son necesarias nuevas investigaciones para precisar el papel específico de la aplicación en estos resultados.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Aplicaciones móviles de apoyo a tratamientos psicológicos:** Herramientas digitales complementarias a la intervención presencial que permiten registrar conductas y síntomas, consultar materiales de las sesiones y acceder a recursos de seguimiento entre citas. Un estudio reciente en el ámbito del tratamiento para dejar de fumar ha encontrado mejores tasas de abstinencia cuando este tipo de aplicaciones se combina con terapia cognitivo-conductual grupal, especialmente en personas fumadoras más jóvenes.

Prioridades del día

Herramientas digitales como complemento terapéutico

A la luz del estudio publicado en Clinical and Health, puede ser útil explorar la incorporación de aplicaciones de seguimiento (registro de conductas, materiales de consulta, recordatorios) como complemento a los tratamientos grupales, sobre todo con población joven, donde parecen mostrar mayor impacto en la adherencia.

Psicología en el entorno educativo

Puede ser relevante seguir de cerca cómo se están incorporando perfiles de psicología a los equipos docentes y de orientación en otras comunidades autónomas, a raíz de la experiencia de Cataluña para el curso 2026-2027, orientada a prevenir el desgaste del profesorado.

Orientación hacia la especialidad de Psicología Clínica

De cara a quienes se están formando o preparando el PIR, puede ser oportuno tener en cuenta el aumento de plazas para 2027 (293) y los plazos de

solicitud, del 1 al 14 de septiembre, aunque el propio sector considera que la oferta sigue siendo insuficiente frente a la demanda asistencial.

