Un estudio con 40.732 personas sitúa el abandono de la psicoterapia en las primeras sesiones, otro con 4.714 adolescentes asocia la presión académica con más depresión y autolesiones y el COP Andalucía Occidental convoca el premio Psicología y Carnaval: claves del 14 de octubre de 2026

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio publicado en JAMA Network Open, con registros sanitarios de 40.732 personas con depresión, sitúa la mayoría de los abandonos de la psicoterapia en las primeras sesiones. Una cohorte británica de 4.714 adolescentes, publicada en The Lancet Child & Adolescent Health, asocia la presión académica a los 15 años con más síntomas depresivos y más autolesiones en los años posteriores. Un análisis de 6,1 millones de personas en Nature Medicine documenta que las mujeres declaran más dolor que los hombres en las 11 regiones corporales estudiadas. El COP Andalucía Occidental convoca la segunda edición de su premio Psicología y Carnaval, con una modalidad nueva para agrupaciones de cantera.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El COP Andalucía Occidental convoca la segunda edición de su premio Psicología y Carnaval con una modalidad nueva de cantera

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO), a través de su Delegación de Cádiz y de la Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (FUNCOP), ha convocado la segunda edición de su premio Psicología y Carnaval, según informa Infocop el 14 de octubre de 2026. El galardón reconoce coplas en las que la Psicología tenga un papel destacado y que contribuyan a reflexionar sobre su valor social y profesional, con especial atención a las letras que pongan en valor la disciplina como ciencia y profesión en relación con personas o colectivos vulnerables. Esta edición incorpora una novedad: junto a la modalidad de agrupaciones de adultos se abre una modalidad de agrupaciones de cantera, infantiles o juveniles, que deben participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla de Cádiz 2027. Se admiten tangos, pasodobles o cuplés, con un máximo de dos letras por agrupación, y la candidatura se presenta mediante un formulario online que exige el texto, información sobre la agrupación, la autoría y la representación legal. No se fija una fecha concreta de cierre: el plazo permanece abierto hasta 24 horas después de que finalice la fase del COAC 2027 en la que actúe la agrupación. El jurado valorará la creatividad, la visualización de la Psicología y la técnica musical. La dotación es de 3.000 euros para la agrupación de adultos y de 500 euros para la de cantera.

Fuente: Infocop

Noticias internacionales

CLÍNICA · INTERNACIONAL

La mayoría de los abandonos de la psicoterapia en depresión se produce en las primeras sesiones, según un estudio en JAMA Network Open

Infocop recoge un estudio publicado en JAMA Network Open (Giber y colaboradores, 2026) que analiza el abandono de la psicoterapia en entornos

comunitarios. La muestra la componen 40.732 personas con depresión, de entre 18 y 80 años, que habían recibido al menos una sesión de psicoterapia individual, y los datos proceden de registros sanitarios electrónicos. Los autores definen el abandono, de forma conservadora, como asistir de una a tres sesiones en un mes y no volver a psicoterapia durante los cinco meses siguientes. Con ese criterio abandonaron 11.571 personas, el 28,4 % de la muestra. Entre quienes abandonaron, el 60,9 % lo hizo tras la primera sesión, el 29,3 % tras la segunda y el 9,7 % tras la tercera. Las evaluaciones diagnósticas psiquiátricas previas o simultáneas, la psicoterapia grupal y determinados contactos breves con servicios de salud mental se asociaron con menor abandono. Entre los factores de mayor riesgo figuran un trastorno mental debido a una condición fisiológica conocida y las visitas a urgencias, aunque los autores advierten de que no deben interpretarse como causas directas. También se observaron diferencias según raza y origen étnico. La capacidad predictiva de los dos modelos desarrollados es modesta, aunque superior al azar. Entre las limitaciones, no hay datos sobre el tipo de psicoterapia, la formación de los profesionales ni la gravedad de los síntomas, y al usarse un único sistema de registros no se puede saber si algunas personas continuaron en otros centros. Los autores plantean evaluar brevemente el riesgo de abandono al inicio del tratamiento y reducir barreras como el coste, el acceso y el estigma.

Fuente: Infocop, sobre Giber et al. (2026), JAMA Network Open

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La presión por el rendimiento escolar a los 15 años se asocia con más síntomas depresivos y autolesiones en una cohorte británica

Según informa Infocop, un estudio longitudinal prospectivo publicado en The Lancet Child & Adolescent Health (Guo y colaboradores, 2026) vincula la presión académica en la adolescencia con peor salud mental en los años siguientes. Utiliza datos de la cohorte británica ALSPAC, formada por jóvenes nacidos en 1991 y 1992, con una muestra de 4.714 adolescentes, el 57,8 % chicas y el 42,2 % chicos. La presión académica se midió a los 15 años con tres preguntas sobre preocupaciones por el trabajo escolar, presión percibida de la familia e importancia concedida a las notas de los exámenes nacionales

británicos (GCSE), combinadas en una puntuación de 0 a 9. Los síntomas depresivos se evaluaron con el Short Mood and Feelings Questionnaire en cinco momentos entre los 16,5 y los 22,5 años, y la autolesión deliberada en el último año, en cuatro momentos entre los 16,5 y los 24 años. En los modelos completamente ajustados, cada punto adicional de presión académica se asoció con un aumento de 0,43 puntos en la puntuación de síntomas depresivos y con un incremento del 8 % en las probabilidades de autolesión. La asociación con los síntomas depresivos fue más intensa en los años inmediatamente posteriores, aunque se mantuvo varios años después. Los autores proponen como posibles mecanismos el estrés escolar, el aislamiento social, el perfeccionismo, la menor autoestima, la menor actividad física y los problemas de sueño, y hablan de relaciones que podrían darse, sin afirmar causalidad. Entre las implicaciones que recoge la noticia figuran intervenciones escolares integrales, programas de aprendizaje socioemocional y la revisión de las evaluaciones de alto impacto.

Fuente: Infocop, sobre Guo et al. (2026), The Lancet Child & Adolescent Health

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un análisis de 6,1 millones de personas en 118 países documenta más dolor en las mujeres que en los hombres en todas las regiones corporales

Infocop recoge un estudio publicado en Nature Medicine (Fillingim y colaboradores, 2026), liderado por la Universidad McGill, que construye curvas de referencia del dolor a lo largo de la vida. Analiza datos de 6.125.459 personas de entre 5 y más de 100 años, procedentes de 902 fuentes poblacionales de 118 países y territorios, recogidos entre 1990 y 2025, con un 55 % de mujeres. Se trabajó con dolor autoinformado en 11 regiones anatómicas, además de dolor en alguna parte del cuerpo, dolor de alta intensidad y dolor generalizado. Las mujeres presentaron mayor prevalencia en las 11 regiones: la probabilidad relativa fue un 83 % superior en dolor facial, un 74 % en dolor de cabeza, un 60 % en dolor abdominal, un 52 % en dolor de alta intensidad y un 50 % en dolor generalizado. El dolor de espalda fue el más frecuente, con una prevalencia global cercana al 40 %. El dolor en alguna parte del cuerpo pasa de alrededor del 30 % a los 5 años a alrededor del 70 % a los 100 años o más. A partir de los 40 años, el dolor aumenta más rápido en países con menor índice de desarrollo

humano. El tabaquismo, la obesidad y los bajos ingresos se asociaron con más dolor, y el 18,3 % de la carga mundial en las regiones analizadas se atribuye estadísticamente a estos tres factores. Entre las limitaciones, los datos son mayoritariamente transversales, los instrumentos de medida difieren y el estudio no establece causas ni el peso relativo de los factores biológicos, psicológicos o sociales.

Fuente: Infocop, sobre Fillingim et al. (2026), Nature Medicine

Publicaciones científicas recientes

Guo, X., Mueller, M. A., Armitage, J. M., Bonell, C., Ford, T. J., John, A., ... Lewis, G. (2026). The association between academic pressure and adolescent depressive symptoms and self-harm: A longitudinal, prospective study in England. The Lancet Child & Adolescent Health, 10(4), 265-272. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(25)00342-6

DOI: 10.1016/S2352-4642(25)00342-6

Hallazgo: En 4.714 adolescentes de la cohorte ALSPAC, cada punto adicional de presión académica a los 15 años se asoció con 0,43 puntos más en la escala de síntomas depresivos y con un 8 % más de probabilidades de autolesión entre los 16,5 y los 24 años. Se trata de un diseño observacional con medidas de autoinforme.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que la presión académica podría ser un factor a tener en cuenta en la evaluación de adolescentes con síntomas depresivos o conductas autolesivas, sin que el estudio permita afirmar una relación causal. Los autores señalan como líneas de actuación las intervenciones escolares integrales y el aprendizaje socioemocional.

Fillingim, M., Tanguay-Sabourin, C., Neuert, L., Zare, A., Norman, J., Guglietti, G. V., ... Vachon-Presseau, E. (2026). Global and regional reference curves for pain across the lifespan in 6.1 million individuals in 118 countries. Nature Medicine, 1-9. https://doi.org/10.1038/s41591-026-04696-w

DOI: 10.1038/s41591-026-04696-w

Hallazgo: Con datos autoinformados de 6.125.459 personas de 118 países y territorios, las mujeres presentaron mayor prevalencia de dolor que los hombres en las 11 regiones anatómicas analizadas. El dolor de espalda fue el

más frecuente, con una prevalencia cercana al 40 %, y el 18,3 % de la carga mundial en las regiones analizadas se atribuye estadísticamente al tabaquismo, la obesidad y los bajos ingresos.

Implicación clínica: Los resultados pueden orientar una evaluación del dolor que tenga en cuenta el sexo, la edad y las condiciones socioeconómicas. Los datos son mayoritariamente transversales y el estudio no establece las causas, por lo que no permite determinar el peso de los factores biológicos, psicológicos o sociales.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Evaluación breve del riesgo de abandono al inicio de la psicoterapia:** Los autores del estudio publicado en JAMA Network Open proponen valorar de forma breve el riesgo de abandono al comienzo del tratamiento, aprovechando datos que ya suelen constar en los registros sanitarios, para orientar las recomendaciones y favorecer la continuidad. La propuesta se basa en modelos de capacidad predictiva modesta, por lo que su utilidad clínica requeriría validación adicional.

Prioridades del día

Explorar el riesgo de abandono desde las primeras sesiones

Puede ser útil revisar, al inicio del tratamiento, factores asociados a la continuidad, ya que el estudio sitúa la mayoría de los abandonos tras la primera o la segunda sesión. Se trata de asociaciones con capacidad predictiva modesta.

Incluir la presión académica en la valoración de adolescentes

Puede ser relevante preguntar por las exigencias escolares y familiares en adolescentes con síntomas depresivos o autolesiones, teniendo presente que el estudio es observacional y no permite afirmar causalidad.

Tener en cuenta el sexo y la edad en la evaluación del dolor

Puede ser oportuno considerar estas variables, junto con las condiciones socioeconómicas, al valorar el dolor en consulta, dado que los datos son mayoritariamente transversales y no establecen causas.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — miércoles 14 de octubre de 2026