



Ecoansiedad, autolesiones en menores y cooperación europea en salud mental infanto-juvenil: claves del 4 de junio de 2026

JUEVES 4 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio publicado en Atención Primaria confirma el impacto creciente del cambio climático en la salud mental de la población, con fenómenos como la ecoansiedad, el duelo ecológico y la solastalgia ya presentes en la práctica clínica. Un metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics alerta de un incremento anual sostenido del 2,5% en autolesiones autoinformadas y del 3,5% en visitas médicas por autolesiones en menores de 25 años, con especial impacto en chicas. En el plano institucional, la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) y UNICEF han formalizado un Memorando de Entendimiento para reforzar la cooperación en materia de salud mental infanto-juvenil en Europa. Estas tres noticias configuran un escenario en el que la psicología clínica tiene un papel cada vez más relevante en la detección temprana, la intervención y el diseño de políticas de salud pública.

Noticias nacionales

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

El cambio climático deja una huella psicológica creciente: ecoansiedad, duelo ecológico y depresión climática ya son realidades clínicas

Un estudio publicado en la revista Atención Primaria analiza el impacto del cambio climático en la salud mental de la población, identificando fenómenos como la ecoansiedad, el estrés postraumático tras desastres naturales, el duelo ecológico, la depresión climática y la solastalgia. La investigación subraya que estas manifestaciones no son anecdóticas, sino estructurales, y que afectan con especial intensidad a jóvenes, comunidades vulnerables y personas expuestas a fenómenos climáticos extremos. Un estudio internacional citado en el artículo, realizado en 2021 en jóvenes de 10 países, reveló que el 59% de las personas encuestadas se sentían muy o extremadamente preocupadas por el cambio climático, hasta el punto de que esta preocupación afectaba negativamente a su vida cotidiana. El trabajo destaca el papel de la atención primaria en la identificación precoz de estos impactos psicológicos, y propone integrar los factores de riesgo climáticos en la evaluación de pacientes vulnerables. La participación en actividades de restauración ecológica y el acceso a entornos naturales se señalan como estrategias que pueden contribuir a reducir la ecoansiedad y fortalecer la resiliencia.

NORMATIVA · NACIONAL

EFPA y UNICEF firman un memorando de entendimiento para reforzar la salud mental infanto-juvenil en Europa

Según informa la EFPA, la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos y UNICEF han firmado un Memorando de Entendimiento con el objetivo de fortalecer la cooperación conjunta en materia de salud mental infantil, adolescente y juvenil en toda Europa. El acuerdo establece un compromiso compartido para promover la prevención y la promoción de la salud mental, apoyar la identificación temprana de las dificultades psicológicas y el acceso al apoyo psicológico y social, e impulsar el desarrollo de políticas basadas en la evidencia científica. El Memorando subraya la necesidad de integrar las consideraciones de salud mental en todas las áreas de las políticas públicas, promoviendo acciones coordinadas y transversales que aborden los determinantes sociales, digitales y comunitarios que influyen en el bienestar psicológico de niños, adolescentes y jóvenes. Como antecedente reciente de esta colaboración, ambas organizaciones organizaron conjuntamente un

seminario web sobre salud mental juvenil y digitalización en el marco de la Semana Europea de la Salud Mental 2026.

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Aumentan las autolesiones en niños y adolescentes en países de altos ingresos, con mayor impacto en chicas

Un metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics, basado en 42 estudios sobre autolesiones en niños y jóvenes de 12 países de alto nivel económico durante un período de 25 años (2000-2024), alerta de un incremento sostenido de las conductas autolesivas en población menor de 25 años. Los datos, correspondientes a más de 200 millones de menores, revelan un aumento anual del 2,5% en las autolesiones autoinformadas y del 3,5% en las visitas médicas por autolesiones reportadas. El incremento es especialmente pronunciado en niñas, con una subida media anual del 3,6% frente al 1,2% en niños. Entre los factores señalados por los autores destacan el aumento del malestar emocional en adolescentes, la presión social, el impacto del entorno digital y las dificultades en el acceso a recursos de salud mental. Los investigadores enfatizan la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención e intervención, con un papel clave de la psicología tanto en la detección precoz como en el tratamiento de estas conductas.

Publicaciones científicas recientes

Tejera, M. E. T., Pérez, M. C. A., Domínguez, M. G., & Beltrá, M. N. (2026). El impacto silencioso del cambio climático en nuestra salud mental: ansiedad y estrés en un mundo en transformación. Atención Primaria, 58(1).

DOI: [10.1016/j.aprim.2025.103386](https://doi.org/10.1016/j.aprim.2025.103386)

Hallazgo: La revisión analiza el impacto del cambio climático en la salud mental, identificando fenómenos como la ecoansiedad, el estrés

postraumático, el duelo ecológico, la depresión climática y la solastalgia. Señala que la exposición prenatal e infantil a contaminantes como PM2,5 se asocia con alteraciones en la microestructura de la sustancia blanca cerebral y mayor vulnerabilidad a trastornos mentales en etapas posteriores.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que puede ser oportuno explorar los factores de riesgo climáticos y ambientales en la evaluación de pacientes con ansiedad crónica, depresión o estrés, especialmente en zonas afectadas por eventos climáticos extremos. La intervención desde un enfoque de salud planetaria puede orientar estrategias de resiliencia individual y comunitaria.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Protocolos de detección temprana de conductas autolesivas en entornos educativos y clínicos:** El creciente incremento de autolesiones en población infantojuvenil refuerza la utilidad de contar con protocolos de cribado y detección precoz adaptados a entornos educativos y servicios de psicología clínica. Estos instrumentos, cuando están basados en la evidencia, permiten identificar señales de riesgo, facilitar la derivación y articular una respuesta coordinada entre los distintos actores implicados en la atención a menores.

Prioridades del día

Ecoansiedad en consulta: identificar el impacto ambiental como factor de malestar

Ante la evidencia publicada sobre el impacto del cambio climático en la salud mental, puede ser útil explorar si los pacientes con ansiedad crónica, insomnio o sintomatología depresiva refieren preocupaciones relacionadas con la crisis climática o con la exposición a eventos naturales extremos. Incorporar esta dimensión en la anamnesis puede orientar mejor el caso y facilitar intervenciones más ajustadas al contexto de cada persona.

Detección precoz de autolesiones en menores: señales de alerta y protocolo de actuación

Los datos del metaanálisis de JAMA Pediatrics refuerzan la pertinencia de revisar los protocolos de evaluación en consulta con población infantojuvenil. Puede ser relevante incorporar preguntas específicas sobre conductas autolesivas de forma sistemática, adaptar el lenguaje a cada franja de edad y establecer criterios claros de derivación y coordinación con los centros educativos u otros servicios de salud.

El acuerdo EFPA-UNICEF puede ser oportuno revisarlo como referencia para fortalecer la articulación entre psicología clínica, servicios sociales y entornos educativos en el trabajo con infancia y adolescencia. Conocer los marcos de cooperación europeos en desarrollo puede orientar la actualización de protocolos locales y la participación en iniciativas de formación o investigación vinculadas a estos acuerdos.