



Inversión histórica en salud mental, terapia digital para sanitarios y riesgos de las apps de bienestar psicológico

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

El Gobierno ha anunciado una partida de 56 millones de euros para 2026 destinada a reforzar la presencia de psicólogos en atención primaria y a financiar campañas de prevención del suicidio, la mayor cifra comprometida hasta la fecha aunque su ejecución dependerá de cada comunidad autónoma. Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) publicado en abril demuestra que una intervención psicológica web autoguiada mejora la salud mental del personal sanitario, identificando la resiliencia como el mecanismo de cambio más consistente. En paralelo, el Consejo General de la Psicología ha difundido un análisis de la APA que alerta sobre el mercado de aplicaciones de salud mental: solo 5 de cada 116 apps revisadas para la depresión alcanzaron una puntuación aceptable en privacidad, y menos del 4% de las apps para la ansiedad han sido validadas en ensayos clínicos. La semana arranca con un panorama que combina avance en financiación pública con advertencias sobre la calidad y la seguridad de las herramientas digitales que llegan directamente al usuario.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El Gobierno destina 56 millones a psicólogos en centros de salud y prevención del suicidio

El Ministerio de Sanidad ha anunciado una inversión de 56 millones de euros para 2026, la mayor partida hasta la fecha en salud mental. Los fondos se repartirán entre la incorporación de psicólogos clínicos a los centros de atención primaria y campañas de sensibilización y prevención del suicidio dirigidas especialmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. La distribución final de los recursos dependerá de las decisiones de cada comunidad autónoma. El propio ministerio reconoce que las listas de espera para una primera consulta de psicología clínica en la sanidad pública superan los seis meses en varias comunidades, y el objetivo declarado es reducir ese plazo a la mitad en dos años. En términos absolutos, la partida equivale a unos 1,20 euros por habitante, lo que sitúa la medida como un paso significativo pero todavía alejado de los ratios europeos de profesionales por población.

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

Una intervención psicológica online reduce el burnout en profesionales sanitarios al fortalecer la resiliencia

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y del Hospital Regional de Málaga han publicado los resultados de un estudio con 357 profesionales sanitarios de Málaga y Aragón. El trabajo analiza los mecanismos internos de un programa de intervención psicológica web autoguiada que integra mindfulness, compasión y aceptación. La principal conclusión es que la resiliencia actúa como el mediador más robusto y consistente para reducir el estrés percibido, la ansiedad y la depresión en este colectivo. Los datos indican que los componentes específicos del mindfulness —observar las sensaciones, describirlas y no reaccionar impulsivamente— son los que generan mayor cambio terapéutico real, más allá de la práctica genérica. Los autores destacan que el formato digital no es simplemente una alternativa de acceso fácil, sino un canal eficaz para promover procesos psicológicos positivos y duraderos en entornos de alta presión. Más de la mitad de los médicos y el 44% de las enfermeras en España presentan al menos una dimensión del burnout, lo que da dimensión a la relevancia clínica del hallazgo.

El Consejo General de la Psicología alerta sobre la falta de rigor y privacidad en las apps de salud mental

El Consejo General de la Psicología ha trasladado al sector los hallazgos de un análisis reciente publicado por la Asociación Americana de Psicología (APA) en Monitor on Psychology. El informe revela que solo 5 de 116 aplicaciones para la depresión revisadas alcanzaron una puntuación aceptable en transparencia de privacidad, mientras que más de la mitad carecía de política de privacidad identificable. Menos del 4% de las apps para la ansiedad han sido validadas mediante ensayos clínicos controlados. El número total de aplicaciones de este tipo disponibles en el mercado supera las 10.000, según un estudio de Springer Nature. La APA advierte que la mayoría se clasifica como productos de bienestar general, lo que las sitúa fuera del control regulatorio que sí se exige a las terapias digitales certificadas. Los profesionales deben considerar el entorno digital de sus pacientes como parte de la evaluación clínica, analizando qué herramientas utilizan y si estas refuerzan o dificultan la alianza terapéutica y el contacto social real.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Guía APA para evaluación de aplicaciones de salud mental:** La Asociación Americana de Psicología ha publicado una guía paso a paso para que los profesionales evalúen la fiabilidad de las herramientas digitales de salud mental antes de recomendarlas a sus pacientes. La guía analiza criterios de valor clínico, seguridad y privacidad, y permite identificar señales de alerta como la ausencia de política de protección de datos, la falta de respaldo empírico y los diseños orientados a incentivar el uso excesivo.
- **Plataformas de intervención psicológica web autoguiada validadas para profesionales sanitarios:** El estudio del IBIMA valida el uso de intervenciones web autoguiadas que integran terapias de tercera generación —mindfulness, compasión y aceptación— como canal eficaz para la prevención y tratamiento del burnout en

entornos sanitarios de alta presión. Su formato escalable y de acceso flexible las convierte en una opción con potencial de implementación en el sistema de salud.

Prioridades del día

Revisar las herramientas digitales que recomendamos o que usan nuestros pacientes

Ante la alerta de la APA sobre la falta de privacidad y evidencia en la mayoría de las apps de salud mental disponibles, conviene hacer un mapa de las herramientas digitales que están utilizando los pacientes fuera de sesión. Aplicar criterios básicos de revisión —política de privacidad identificable, respaldo empírico, ausencia de diseño adictivo— antes de validar cualquier recurso digital.

Incorporar la evaluación del burnout en la práctica con profesionales sanitarios

Los datos del IBIMA confirman que más de la mitad de los médicos y el 44% de las enfermeras presentan al menos una dimensión de burnout. Si trabajamos con personal sanitario —ya sea en intervención individual, grupal o en programas de empresa— este momento es oportuno para incorporar screenings de burnout y considerar intervenciones basadas en resiliencia y mindfulness con respaldo empírico.

La inversión anunciada por el Ministerio prevé cambios en la presencia de psicólogos en los centros de salud, aunque su concreción depende de cada comunidad autónoma. Es el momento de revisar los circuitos de derivación

locales y anticipar posibles cambios en el flujo de pacientes procedentes de la sanidad pública hacia la práctica privada.