



La OMS sitúa en el 45% el riesgo de demencia que podría prevenirse, Canarias certifica casi 30.000 pacientes atendidos por psicología en atención primaria y un estudio identifica el apego evitativo como reto de la alianza terapéutica: claves del 6 de septiembre de 2026

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

La Organización Mundial de la Salud actualiza sus directrices sobre reducción del riesgo de demencia y cifra en el 45% la proporción de casos que podría prevenirse o retrasarse mediante factores modificables como el tabaco, el sedentarismo o la hipertensión. En Canarias, los profesionales de psicología de atención primaria certifican casi 30.000 pacientes atendidos en año y medio de programa. Un metaanálisis publicado en Nature Mental Health confirma que las intervenciones conductuales superan a los fármacos en los síntomas nucleares del autismo, mientras que un estudio español identifica el apego evitativo como uno de los principales retos para construir una alianza terapéutica sólida. Un análisis de la revista de la APA, por último, explora cómo el argot juvenil refleja la construcción de la identidad en la era digital.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Los psicólogos de atención primaria en Canarias atienden a casi 30.000 pacientes en año y medio

La Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha informado de que los profesionales de psicología que trabajan en los centros de salud del archipiélago realizaron un total de 50.357 consultas y atendieron a 29.720 pacientes entre 2025 y julio de 2026. El programa, denominado Atención Psicológica en Atención Primaria, se puso en marcha en 2022 dentro de la Estrategia +AP para reforzar este nivel asistencial, y cuenta actualmente con 53 profesionales de psicología repartidos por todo el archipiélago. Los principales motivos de consulta son los trastornos de ansiedad, seguidos de los trastornos adaptativos y la depresión de intensidad leve o moderada. Además de la atención individual, estos profesionales desarrollan intervenciones grupales centradas en sintomatología ansioso-depresiva, trastornos adaptativos y trastornos por somatización, así como actividades comunitarias de prevención y promoción de la salud mental dirigidas a la comunidad educativa, personas cuidadoras, población infantil y personas mayores, entre otros colectivos. El objetivo declarado del Servicio Canario de la Salud es implantar este modelo en todas las zonas básicas de salud del archipiélago para garantizar la equidad en el acceso a la atención psicológica, aunque su despliegue completo dependerá de la planificación progresiva de cada zona. El propio servicio valora la incorporación de este perfil profesional a atención primaria como necesaria y satisfactoria, tanto para el resto del equipo asistencial como para las personas usuarias.

Fuente: Gobierno de Canarias (Servicio Canario de la Salud)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

El argot juvenil revela cómo construyen su identidad los adolescentes en la era digital, según un análisis de la APA

Un artículo publicado en *Monitor on Psychology*, la revista oficial de la American Psychological Association (APA), y recogido por Infocop, plantea que el uso del argot entre adolescentes va mucho más allá de una moda lingüística pasajera y constituye una herramienta clave para la construcción de la identidad. El texto, firmado por la periodista Zara Abrams, toma como ejemplo la rápida expansión del término *six-seven*, popularizado a finales de 2024 a partir de una canción y viralizado después en plataformas como TikTok, especialmente entre la generación nacida entre 2010 y 2024. Desde una perspectiva psicológica, el argot funciona como un código social que distingue entre grupos de pertenencia y grupos externos, en línea con la teoría de la identidad social, y contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la teoría de la mente y la flexibilidad para cambiar de registro lingüístico según el contexto. El análisis también señala que las plataformas digitales actúan como entornos de refuerzo social, donde las interacciones positivas amplifican la difusión de determinados términos, y subraya que, para jóvenes LGBTQIA+, el argot puede ofrecer un lenguaje que permite abordar experiencias sensibles sin exponerse directamente. Los autores recomiendan que los profesionales de la psicología clínica y educativa muestren interés genuino por el lenguaje que emplean los y las menores, ya que esto puede facilitar la construcción de un vínculo terapéutico más sólido.

Fuente: *Monitor on Psychology* (American Psychological Association), recogido por Infocop

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un metaanálisis de 149 ensayos halla que las intervenciones conductuales superan a los fármacos en los síntomas nucleares del autismo

Un equipo de investigadores de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, encabezado por Yunhao Gu, Mia Fox y Di Zhao, ha publicado en la revista *Nature Mental Health* una revisión sistemática y metaanálisis que compara la eficacia de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos sobre los síntomas nucleares del trastorno del espectro autista. El equipo revisó las bases de datos PubMed, Embase, PsycINFO y Cochrane hasta abril de 2025 y

combinó los datos de 149 ensayos controlados aleatorizados, con un total de 9.011 participantes: 69 estudios no farmacológicos (2.889 participantes) y 217 estudios farmacológicos o de suplementos dietéticos (6.122 participantes). El resultado principal, la mejora estandarizada en los síntomas nucleares, mostró un tamaño del efecto significativamente mayor en las intervenciones no farmacológicas ($g = 0,70$) que en los tratamientos farmacológicos ($g = 0,20$), con una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos ($p < 0,0001$). El análisis de moderadores indicó que las muestras más pequeñas, los estudios de menor duración, los contextos no occidentales, las medidas evaluadas por clínicos y las publicaciones más antiguas se asociaron a tamaños del efecto mayores, lo que sugiere que el diseño de cada estudio influye de forma considerable en los resultados obtenidos. Los propios autores concluyen que estos hallazgos respaldan una mayor eficacia de las intervenciones conductuales y psicosociales sobre los síntomas nucleares del autismo, aunque señalan la necesidad de ensayos clínicos más rigurosos y mejor controlados para confirmarlo.

Fuente: Nature Mental Health

Publicaciones científicas recientes

Bárez, N. B., Saúl, L. A., & Corbella, S. (2026). Predictors of therapeutic alliance: Patient attachment and the personal style of the therapist. *Clinical and Health*, 37, e260719.

<https://doi.org/10.5093/clh2026a5>

DOI: [10.5093/clh2026a5](https://doi.org/10.5093/clh2026a5)

Hallazgo: El estudio analizó a 264 pacientes y 28 terapeutas de cuatro centros privados de la Comunidad de Madrid, diferenciando una fase inicial (las cinco primeras sesiones) y una fase avanzada (a partir de la sexta sesión) del proceso terapéutico. El apego evitativo del paciente fue uno de los predictores más consistentes de una alianza terapéutica más débil, tanto al inicio como en fases avanzadas del tratamiento. En la fase inicial, un mayor deterioro del funcionamiento general y una mayor sintomatología también se relacionaron con alianzas más débiles. En las fases avanzadas, la función atencional del terapeuta —su capacidad de mantenerse receptivo y ajustado a las necesidades cambiantes del paciente— fue el predictor que más contribuyó a

explicar la calidad global de la alianza, mientras que la función expresiva del terapeuta, es decir, su capacidad de mostrar empatía y cercanía, se relacionó específicamente con el componente emocional del vínculo.

Implicación clínica: Los autores sugieren que podría ser útil adaptar las intervenciones iniciales al perfil de apego de cada paciente, ofreciendo aproximaciones graduales y poco intrusivas en el plano emocional a quienes presentan un apego evitativo. También plantean que los propios terapeutas podrían beneficiarse de revisar su función atencional y expresiva a lo largo del proceso, dado que ambas se asociaron con una alianza terapéutica más sólida en las fases más avanzadas del tratamiento.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Escalas validadas de apego adulto para la valoración de la alianza terapéutica:** Instrumentos estandarizados que permiten valorar el estilo de apego de la persona usuaria en las primeras sesiones, con el fin de anticipar posibles dificultades en la construcción del vínculo terapéutico y adaptar el ritmo de la intervención a cada perfil.
- **Plataformas de estimulación cognitiva digital validadas para uso clínico:** Herramientas digitales que permiten diseñar programas de entrenamiento cognitivo y estimulación social ajustados a personas adultas con cognición normal o deterioro cognitivo leve, en línea con las recomendaciones que la OMS ha actualizado para la reducción del riesgo de demencia.

Prioridades del día

Valorar el estilo de apego en las primeras sesiones

Puede ser útil incorporar una valoración breve del estilo de apego de cada paciente al inicio del proceso terapéutico, ya que el apego evitativo se ha asociado a una alianza terapéutica más débil tanto al comienzo como en fases avanzadas del tratamiento.

Revisar la propia función atencional y expresiva como terapeuta

Puede ser relevante que cada profesional reflexione sobre su capacidad de mantenerse atento a las necesidades cambiantes de la persona usuaria y de expresar cercanía emocional, dos factores que el estudio de Clinical and Health relacionó con una alianza terapéutica más sólida.

Incorporar el entrenamiento cognitivo en la intervención con personas mayores

Puede ser oportuno valorar la inclusión de entrenamiento cognitivo y actividades de participación social en los planes de intervención con personas mayores sin deterioro o con deterioro cognitivo leve, siguiendo las directrices que la OMS ha actualizado en este ámbito.