Un estudio en JAMA Psychiatry asocia la violencia sexual previa con más síntomas de TEPT tras un nuevo trauma, la APA reclama mejorar la atención psicológica en la menopausia y el COP Madrid activa dispositivos por los incendios: claves del 16 de octubre de 2026

VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio en JAMA Psychiatry con 2.423 personas atendidas en urgencias asocia la violencia sexual previa con más síntomas de TEPT durante un año de seguimiento. La APA, en un informe aprobado en agosto de 2026, reclama una atención integral y personalizada durante la menopausia. El COP Madrid detalla los dispositivos de atención psicológica activados tras los incendios de la Sierra Oeste. Un informe del Centre for Mental Health repasa los beneficios y las barreras de investigar la salud mental desde varias disciplinas.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El COP Madrid activa dispositivos de atención psicológica por los incendios de la Sierra Oeste

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COP Madrid) ha detallado, según informa Infocop, los dispositivos de atención psicológica que ha activado junto con la Comunidad de Madrid tras los incendios registrados en distintos municipios de la Sierra Oeste durante julio y agosto. Dos de ellos fueron activados por SUMMA 112, de la Consejería de Sanidad, y por las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. En ellos, más de 40 profesionales de la Psicología atendieron, a nivel individual y familiar, a personas desplazadas y afectadas en albergues temporales, centros de acogida, puntos de reunión y otros espacios habilitados. El objetivo de esa atención eran los primeros auxilios psicológicos: reducir el impacto emocional inicial, estabilizar, detectar a las personas más vulnerables, identificar necesidades y conectar con recursos de apoyo. Además, a petición de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se mantuvo la atención en residencias que habían sido evacuadas. Allí se realizaron intervenciones presenciales con personas mayores, con sesiones grupales tempranas de psicoeducación y apoyo emocional coordinadas con la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia. Con el personal de las residencias se trabajó sobre la experiencia vivida y se ofrecieron pautas de autocuidado y apoyo mutuo. La noticia no detalla el número de personas atendidas, las fechas exactas ni cómo se solicita la atención.

Fuente: Infocop, 16 de octubre de 2026

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio en JAMA Psychiatry asocia la violencia sexual previa con más síntomas de TEPT tras un nuevo trauma

Un estudio publicado en JAMA Psychiatry, que Infocop recoge el 16 de octubre, analiza cómo influyen los antecedentes de violencia sexual en la respuesta a un nuevo trauma. Con datos del estudio longitudinal AURORA, incluye a 2.423 personas de 18 a 75 años atendidas en urgencias de centros de Estados Unidos

por una lesión traumática reciente, en el 75 % de los casos un accidente de tráfico. De ellas, 1.270 (52 %) referían violencia sexual previa, ya fuera abuso sexual infantil, agresión sexual en la edad adulta o ambas. Los síntomas de TEPT se evaluaron con la PCL-5 a las 2 y 8 semanas y a los 3, 6 y 12 meses. El grupo con antecedentes mostró en torno a 5 puntos más de media en la PCL-5 durante todo el seguimiento, incluso tras controlar los traumas no sexuales previos. A las 2 semanas superaba el umbral de probable TEPT el 57,3 % frente al 35,8 % del grupo sin antecedentes, y a los 12 meses el 39,5 % frente al 20,1 %. Los autores recuerdan que la PCL-5 no sustituye una evaluación clínica y que se desconoce si los participantes recibieron tratamiento de salud mental durante el seguimiento.

Fuente: Infocop, 16 de octubre de 2026

CLÍNICA · INTERNACIONAL

La APA reclama una atención psicológica integral y personalizada durante la menopausia

La American Psychological Association (APA) ha aprobado, en su Consejo de Representantes de agosto de 2026, el informe Women's Health and Well-Being During Midlife and Menopause, con recomendaciones para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica y de salud mental. Infocop lo recoge el 16 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Menopausia, que se conmemora el 18 de octubre. La APA plantea que la menopausia no debe considerarse una condición patológica, sino un acontecimiento natural de la vida que puede acompañarse de dificultades físicas y psicológicas importantes. Reclama una atención integral, personalizada y basada en la evidencia, con integración entre atención primaria, especialidades médicas y salud mental, y una evaluación que considere factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Entre los tratamientos psicológicos menciona la terapia cognitivo-conductual, la activación conductual, la psicoterapia interpersonal, el mindfulness y los tratamientos centrados en el trauma. Como datos de contexto, cita que, según algunas estimaciones, hasta la mitad de las mujeres podría presentar síntomas de depresión o ansiedad en la mediana edad, y que en 2022 menos de un tercio de las estadounidenses de 45 a 64 años que creían necesitar tratamiento recibió servicios de salud mental. El propio documento aclara que

no se basa en revisiones sistemáticas formales y que sus recomendaciones no son obligatorias.

Fuente: Infocop, 16 de octubre de 2026 (informe original: APA)

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un informe del Centre for Mental Health analiza los beneficios y las barreras de investigar la salud mental desde varias disciplinas

El Centre for Mental Health publicó en julio de 2026, por encargo del National Institute for Health and Care Research (NIHR), el informe Inquiry into interdisciplinary mental health research: Lessons from eight case studies, que Infocop recoge el 16 de octubre. Es un estudio cualitativo de casos con revisión previa de la literatura: se seleccionaron ocho proyectos que incluían al menos tres disciplinas y una participación relevante de personas con experiencia vivida, y se realizaron 32 entrevistas semiestructuradas de unos 90 minutos a investigadores, profesionales y personas expertas por experiencia. La Psicología estuvo presente en seis proyectos, la Psiquiatría en tres y la Antropología en tres. Entre los beneficios, el informe señala que este enfoque permite abordar problemas difíciles de tratar desde una sola disciplina. Entre las barreras, cita las diferencias de lenguaje, métodos y criterios de evidencia, las jerarquías entre disciplinas y unos sistemas universitarios de promoción y financiación organizados en torno a disciplinas tradicionales. Los autores advierten de que los ocho casos no son una muestra representativa, por lo que los patrones son ilustrativos y no generalizables estadísticamente. Entre sus recomendaciones para los financiadores figuran la coproducción real y una financiación específica para la investigación interdisciplinar.

Fuente: Infocop, 16 de octubre de 2026 (informe original: Centre for Mental Health)

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Primeros auxilios psicológicos en emergencias:** Intervención de apoyo inmediato que, según recoge Infocop, busca reducir el impacto emocional inicial, estabilizar, detectar a las personas más vulnerables, identificar necesidades y conectar con recursos de apoyo. El COP Madrid la ha aplicado con personas

desplazadas por los incendios en albergues temporales, centros de acogida y puntos de reunión.

– **Cuestionario PCL-5 de síntomas de TEPT:** Instrumento de autoinforme basado en el DSM-5 que el estudio de JAMA Psychiatry utilizó para seguir los síntomas a lo largo de un año. Los propios autores recuerdan que no sustituye a una evaluación clínica para diagnosticar TEPT.

– **Terapia cognitivo-conductual para el insomnio en la menopausia:** El informe de la APA menciona la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) y los protocolos CBT-MENO y MENOS para los síntomas vasomotores entre las opciones psicológicas para esta etapa. El propio documento aclara que sus recomendaciones no son obligatorias ni sustituyen el juicio profesional.

Prioridades del día

Preguntar con sensibilidad por la violencia sexual previa tras un trauma reciente

Puede ser útil incluir, con el cuidado necesario, una pregunta sobre violencia sexual previa en la valoración tras un trauma reciente, ya que el estudio de JAMA Psychiatry observa más síntomas de TEPT durante un año en quienes la refieren. Se trata de una asociación observada con la PCL-5, que no equivale a un diagnóstico clínico.

Valorar la menopausia desde una perspectiva integral

Puede ser relevante incorporar en la evaluación de mujeres en la mediana edad factores biológicos, psicológicos y socioculturales, tal como plantea la APA en un informe cuyas recomendaciones no son obligatorias y que no se basa en revisiones sistemáticas formales.

Revisar la preparación para intervenir en emergencias

Puede ser oportuno revisar si la formación y los protocolos propios contemplan los primeros auxilios psicológicos y el apoyo a profesionales de

> residencias tras eventos como los incendios de la Sierra Oeste, atendiendo al modelo de intervención que describe el COP Madrid.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — viernes 16 de octubre de 2026