

Sanidad aprueba 293 plazas de Psicología Clínica para el PIR 2027, un estudio de la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud analiza el funcionamiento sexual en mujeres con sensibilización central y una investigación de Stanford muestra que el habla infantil predice problemas de salud mental futuros: claves del 13 de agosto de 2026



JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El Ministerio de Sanidad ha aprobado, mediante la Orden SND/854/2026 publicada en el BOE, una oferta de 293 plazas de Psicología Clínica dentro de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada para el acceso en 2027, trece más que en la convocatoria anterior. La Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, editada por el Consejo General de la Psicología, ha publicado un estudio sobre el funcionamiento sexual en mujeres con síndromes de sensibilización central y su relación con el dolor y el estrés postraumático. Y una investigación de la Universidad de Stanford, publicada en Nature Mental Health, muestra que la forma en que hablan los niños y niñas al describir situaciones de estrés predice el desarrollo de problemas de salud mental hasta seis años después.

NORMATIVA · NACIONAL

Sanidad aprueba 293 plazas de Psicología Clínica en la convocatoria PIR para el acceso en 2027

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la oferta de plazas que se incorpora a la Orden SND/854/2026, de 4 de agosto, por la que se convocan las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) que permitirán el acceso en 2027 a un total de 12.850 plazas para las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. De ellas, 293 corresponden a la especialidad de Psicología Clínica (PIR), trece plazas más que en la convocatoria anterior. Según informa Infocop, el Ministerio destaca que esta oferta es la mayor aprobada hasta la fecha y supone un incremento total de 484 plazas respecto a la convocatoria previa, un 3,9 % más; además, desde 2018 el Sistema Nacional de Salud ha incrementado su capacidad formativa en 4.448 plazas, un 53 % más que entonces. La propuesta se elaboró a partir de las necesidades planteadas por las comunidades autónomas y contó con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El 10 % de las plazas se reserva para el turno de personas con discapacidad. Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027, con inicio del examen a las 14:00 horas (13:00 en Canarias), en 26 localidades de todo el territorio nacional. El ejercicio constará de 200 preguntas más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta cada una, y una duración de cuatro horas y media. La calificación final resultará en un 90 % de la prueba y un 10 % de los méritos académicos acreditados. La convocatoria incorpora además nuevas medidas de detección de fraude tecnológico, con equipos pasivos capaces de identificar dispositivos electrónicos ocultos sin interceptar comunicaciones ni tratar datos personales.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología), sobre la Orden SND/854/2026 del Ministerio de Sanidad

CLÍNICA · NACIONAL

Un estudio de la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud analiza el funcionamiento sexual en mujeres con síndromes de sensibilización central

La Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, revista oficial de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP) y de la Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud (SUIPS), editada por el Consejo General de la Psicología de España, ha publicado en su segundo número de 2026 el estudio «Funcionamiento sexual en mujeres con síndromes de sensibilización central: el papel del dolor y el estrés postraumático», firmado por María Pilar Martínez, Carmen Huertas-Gómez, Elena Miró, Raúl Quevedo-Blasco y Ana Isabel Sánchez. El trabajo parte de que las personas con síndromes de sensibilización central (CSS, que incluyen cuadros como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica) presentan un deterioro marcado en múltiples ámbitos de vida, incluida la sexualidad, aunque la evidencia empírica sobre su relación con el trauma seguía siendo limitada. Para explorar esta relación, las autoras realizaron una encuesta online en población general con 1.238 personas participantes, en la que examinaron el funcionamiento sexual, el trauma y sus secuelas, y diversas variables de salud, estado psicológico y de pareja. El análisis comparó tres grupos de mujeres: aquellas con síndromes de sensibilización central (n=179), mujeres con otras condiciones médicas (n=137) y mujeres sin problemas de salud relevantes (n=508). La revista está indexada en la Core Collection de Web of Science (ESCI), Scopus y REDIB, y publica artículos bibliométricos, empíricos y revisiones meta-analíticas sobre Psicología y Ciencias de la Salud dirigidos a investigadores, académicos y profesionales de la comunidad iberoamericana.

Fuente: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud / Consejo General de la Psicología (vía Infocop)

Prioridades del día

Difundir la convocatoria PIR 2027 entre las personas interesadas en la especialidad

Puede ser útil informar a estudiantes de Psicología o personas en formación sobre los plazos clave de esta convocatoria: solicitud del 1 al 14 de septiembre

de 2026 y examen el 23 de enero de 2027, dado el aumento de plazas respecto a años anteriores.

Incorporar la valoración del dolor y el trauma en mujeres con síndromes de sensibilización central

Puede ser relevante tener presente, al atender a pacientes con fibromialgia u otros síndromes de sensibilización central, que el funcionamiento sexual y el estrés postraumático pueden estar interrelacionados, según sugiere este estudio con una muestra amplia y grupos de comparación.

Seguir con cautela el desarrollo de herramientas de análisis del lenguaje como apoyo a la detección temprana

Puede ser oportuno mantenerse informado sobre este tipo de líneas de investigación emergentes basadas en procesamiento del lenguaje natural, sin perder de vista que los propios autores las presentan como una prueba de concepto pendiente de validación, y que en ningún caso sustituyen la valoración clínica individualizada.