



La OMS actualiza su ficha sobre depresión con cerca de 322 millones de personas afectadas, un estudio en Nature Medicine estima pérdidas de unos 12 billones de dólares hasta 2050 y el COP Madrid analiza la desinformación: claves del 2 de octubre de 2026

VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

La Organización Mundial de la Salud ha actualizado su ficha informativa sobre depresión con datos de 2023: cerca de 322 millones de personas viven con este trastorno y solo alrededor de una de cada tres recibe tratamiento de salud mental en los países de ingresos altos. Un estudio publicado en Nature Medicine estima que la depresión podría suponer unas pérdidas acumuladas de 12,435 billones de dólares entre 2025 y 2050. Infocop recoge ambos trabajos con motivo del Día Europeo de la Depresión, que se celebra el 4 de octubre. Además, el COP Madrid ha analizado en una jornada cómo la desinformación afecta a la convivencia y a la cohesión social.

Noticias nacionales

Una jornada del COP Madrid analiza la desinformación como amenaza para la convivencia y la cohesión social

Infocop informa de la jornada «Desinformación, fake news y convivencia: una mirada desde la Psicología», celebrada en la sede del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COP Madrid) para analizar, con voces expertas, cómo los contextos de desinformación polarizan a la población y afectan a la convivencia. La actividad forma parte del proyecto de divulgación científica «Psicología que Transforma» y se enmarca en las áreas de «Psicología y Convivencia» y «Psicología, IA e Innovación». La periodista Carla Pina, directora del medio de verificación INFOVERITAS, ofreció pautas para detectar contenidos falsos: revisar la fuente, comprobar la fecha de publicación y desconfiar de los mensajes sensacionalistas o que despiertan emociones como el miedo o la ira. M.^ª Paz García-Vera, catedrática de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que los automatismos cognitivos ahorran tiempo y energía, pero aumentan la vulnerabilidad a la persuasión y a la desinformación, sobre todo cuando los mensajes se personalizan. David Aguado, de la Universidad Autónoma de Madrid, presentó un estudio del Instituto de Ingeniería del Conocimiento sobre los determinantes individuales de esa vulnerabilidad, en el que la vulnerabilidad a la influencia social tiene un papel relevante en la difusión acrítica de información. Rocío Lana, de la Complutense, abordó propuestas de intervención psicosocial y recordó que la desinformación se asocia a polarización, inestabilidad y menor confianza en las instituciones. Según Infocop, la principal conclusión del encuentro es que el problema va más allá de compartir contenidos engañosos y se convierte en una amenaza para la cohesión social.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), sección Los colegios hablan, COP Madrid

Noticias internacionales

La OMS actualiza su ficha sobre depresión: cerca de 322 millones de personas la padecen y los tratamientos psicológicos son la primera opción

La Organización Mundial de la Salud ha publicado el 11 de septiembre de 2026 una actualización de su ficha informativa sobre el trastorno depresivo, que Infocop recoge hoy. Con datos de 2023 procedentes del Global Burden of Disease, la OMS estima que alrededor del 4% de la población mundial experimentó depresión, un 5,2% de las personas adultas: un 6,2% de las mujeres y un 4,1% de los hombres. Entre las personas de 70 años o más la prevalencia estimada es del 5,4%, y más del 10% de las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz experimentan depresión. En conjunto, la depresión es aproximadamente 1,5 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La ficha señala que, incluso en los países de ingresos altos, solo alrededor de un tercio de las personas con depresión recibe tratamiento de salud mental, y cita como barreras la insuficiente inversión, la falta de profesionales formados y el estigma. En 2021 murieron por suicidio aproximadamente 727.000 personas, y el suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Sobre el tratamiento, la OMS indica que los tratamientos psicológicos son los primeros tratamientos para la depresión y que pueden combinarse con antidepresivos en los casos moderados y graves, mientras que los antidepresivos no son necesarios en la depresión leve, no deben usarse en niños y no son tratamiento de primera línea en adolescentes. Entre las intervenciones psicológicas eficaces menciona la activación conductual, la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y la terapia de resolución de problemas, que pueden ofrecerse de forma presencial u online.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, ficha informativa «Depressive disorder (depression)», 11 de septiembre de 2026

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio en Nature Medicine estima que la depresión podría costar unos 12 billones de dólares a la economía mundial entre 2025 y 2050

Nature Medicine ha publicado un modelo macroeconómico que estima las consecuencias de la depresión en 154 países y territorios, que representan aproximadamente el 96% de la población mundial. Según los resultados que recoge Infocop, la carga económica acumulada entre 2025 y 2050 sería de

12,435 billones de dólares de 2024, con un intervalo de incertidumbre del 95% de entre 10,369 y 14,884 billones. Esa cifra equivale al 0,460% del PIB mundial previsto en el periodo y a un coste medio de 1.429 dólares por persona. La reducción de la participación laboral y de la productividad aparece como el principal mecanismo de pérdida. Por países, Estados Unidos concentraría la mayor pérdida absoluta, con 4,087 billones de dólares, seguido de China, con 2,072 billones. En España, el modelo estima 200.616 millones de dólares de pérdidas acumuladas, el 0,620% del PIB previsto y 4.421 dólares por habitante. Los países de renta alta concentrarían el 63,5% de las pérdidas económicas, aunque los de renta media-baja acumularían el 47,7% de los años de vida ajustados por discapacidad asociados a la depresión en 2050. El cálculo principal no incluye la mortalidad: en el escenario en que el 60% de las muertes por suicidio se atribuye a la depresión, la carga ascendería a unos 14 billones de dólares, el 0,512% del PIB. Los autores sostienen que el tratamiento de la depresión no debería verse solo como un gasto sanitario y destacan la terapia cognitivo-conductual por internet y la integración de la atención en Atención Primaria como opciones coste-eficaces.

Fuente: Nature Medicine, difundido por Infocop con motivo del Día Europeo de la Depresión

Publicaciones científicas recientes

Cao, Z., Luo, Y., Jiao, L., Chen, W., Prettnner, K., Kuhn, M., Bloom, D. E., Jamison, D. T., Bärnighausen, T. W., & Chen, S. (2026). Global economic burden of depression in 154 countries from 2025 to 2050. *Nature Medicine*, 32(9), 3406–3416. <https://doi.org/10.1038/s41591-026-04548-7>

DOI: [10.1038/s41591-026-04548-7](https://doi.org/10.1038/s41591-026-04548-7)

Hallazgo: Los autores desarrollaron un modelo macroeconómico basado en la teoría del crecimiento económico, con datos del Banco Mundial y del Global Burden of Disease Study 2021, que incorpora el efecto de la depresión sobre la participación en el mercado laboral, la educación, la experiencia laboral y la acumulación de capital humano y físico. Compararon el PIB de 2025 a 2050 en dos escenarios: uno sin intervenciones para reducir la morbilidad por depresión y otro en el que la depresión se eliminara por completo. La diferencia acumulada se estima en 12,435 billones de dólares de 2024 (0,460% del PIB mundial), con la pérdida de participación laboral y de productividad

como principal factor. Los propios autores señalan limitaciones: el cálculo principal no recoge la mortalidad, los costes de tratamiento se estimaron sobre todo a partir de datos de Estados Unidos, la prevalencia procede en su mayoría de encuestas autoinformadas y los años vividos con discapacidad se usaron como indicador estandarizado, no como medida directa de productividad.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que la depresión puede analizarse también como un problema económico además de sanitario, y los autores proponen entender el tratamiento como una inversión. Dado que se trata de una proyección basada en un modelo y en supuestos, puede ser prudente leer las cifras como estimaciones con un margen de incertidumbre amplio y no como datos observados.

Herramientas clínicas e instrumentos

– Manuales de intervenciones psicológicas breves de la OMS para la depresión:

La OMS indica en su ficha que ha desarrollado manuales de intervenciones psicológicas breves para la depresión, pensados para ampliar el acceso a la atención y que pueden aplicarse por terapeutas no especialistas, de forma individual o grupal. Incluyen estrategias basadas en la activación conductual, el manejo del estrés, la resolución de problemas y el fortalecimiento del apoyo social, además de un manual de psicoterapia interpersonal grupal y otro de terapia cognitivo-conductual para la depresión perinatal. Son recursos institucionales de acceso público a través de la web de la OMS.

Prioridades del día

Intervenciones psicológicas de primera línea en depresión

Puede ser útil repasar las intervenciones que la OMS identifica como eficaces en su ficha actualizada (activación conductual, terapia cognitivo-conductual,

psicoterapia interpersonal y terapia de resolución de problemas) y el lugar que ocupan frente al tratamiento farmacológico según la gravedad y la edad.

Impacto funcional y laboral de la depresión

Puede ser relevante incorporar en la evaluación una exploración del funcionamiento laboral, académico y cotidiano, ya que el estudio de Nature Medicine sitúa la menor participación laboral y la menor productividad como principal vía de pérdida, y la OMS recuerda que la depresión puede afectar a prácticamente todos los ámbitos de la vida.

Alfabetización frente a la desinformación

Puede ser oportuno valorar si pautas sencillas de verificación (revisar la fuente, comprobar la fecha, desconfiar de los mensajes que buscan miedo o ira) encajan en la psicoeducación con pacientes y familias, teniendo en cuenta que las propuestas presentadas en la jornada del COP Madrid son aportaciones divulgativas y no guías clínicas validadas.