



Inversión histórica en salud mental, terapia digital para sanitarios y riesgos de las apps de bienestar psicológico

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2026

Resumen rápido del día

El Gobierno ha autorizado la distribución de 56,8 millones de euros para 2026 con el objetivo de reforzar la presencia de psicólogos en atención primaria y financiar campañas de prevención del suicidio, la mayor cifra comprometida hasta la fecha, aunque su ejecución concreta dependerá de cada comunidad autónoma. Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) publicado en abril muestra que una intervención psicológica web autoguiada mejora la salud mental del personal sanitario, identificando la resiliencia como el mecanismo de cambio más consistente. En paralelo, un análisis de la APA publicado en Monitor on Psychology alerta sobre el mercado de aplicaciones de salud mental: solo 5 de cada 116 apps revisadas para la depresión alcanzaron una puntuación aceptable en privacidad, y menos del 4% de las apps para la ansiedad han sido validadas en ensayos clínicos. El panorama de hoy combina avance en financiación pública con advertencias sobre la calidad y la seguridad de las herramientas digitales que llegan directamente al usuario.

Noticias nacionales

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El Gobierno autoriza 56,8 millones para psicólogos en centros de salud y prevención del suicidio

El Ministerio de Sanidad ha autorizado la distribución de 56,8 millones de euros para 2026, la mayor partida destinada hasta la fecha a la salud mental. Los fondos se repartirán entre la incorporación de psicólogos clínicos a los centros de atención primaria y campañas de sensibilización y prevención del suicidio dirigidas especialmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. La distribución final de los recursos dependerá de las decisiones de cada comunidad autónoma. Las listas de espera para una primera consulta de psicología clínica en la sanidad pública superan los seis meses en varias comunidades, y el objetivo declarado es mejorar el acceso y reducir los tiempos de espera en salud mental. En términos absolutos, la partida equivale a aproximadamente 1,20 euros por habitante, lo que sitúa la medida como un paso significativo pero todavía alejado de los ratios europeos de profesionales por población.

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

Una intervención psicológica online reduce el burnout en profesionales sanitarios al fortalecer la resiliencia

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y del Hospital Regional de Málaga han publicado los resultados de un estudio con 357 profesionales sanitarios de Málaga y Aragón. El trabajo analiza los mecanismos internos de un programa de intervención psicológica web autoguiada que integra mindfulness, compasión y aceptación. La principal conclusión es que la resiliencia actúa como el mediador más robusto y consistente para reducir el estrés percibido, la ansiedad y la depresión en este colectivo. Los autores destacan que determinados componentes específicos del mindfulness —observar las sensaciones, describirlas y no reaccionar impulsivamente— se asociaron a mayores cambios clínicos. Los resultados sugieren que el formato digital puede ser un canal eficaz para promover procesos psicológicos positivos y duraderos en entornos de alta presión. Más de la mitad de los médicos y el 44% de las enfermeras en España presentan al menos una dimensión del burnout, lo que da dimensión a la relevancia clínica del hallazgo.

La APA alerta sobre la falta de rigor y privacidad en las apps de salud mental

Un análisis publicado por la Asociación Americana de Psicología (APA) en *Monitor on Psychology* y difundido en medios profesionales de psicología alerta sobre el mercado de aplicaciones de salud mental. El informe revela que solo 5 de 116 aplicaciones para la depresión revisadas alcanzaron una puntuación aceptable en transparencia de privacidad, mientras que más de la mitad carecía de política de privacidad identificable. Menos del 4% de las apps para la ansiedad han sido validadas mediante ensayos clínicos controlados. El número total de aplicaciones de este tipo disponibles en el mercado supera las 10.000, según un estudio de Springer Nature. La APA señala que la mayoría se clasifica como productos de bienestar general, lo que las sitúa fuera del control regulatorio que sí se exige a las terapias digitales certificadas. La entidad recomienda que los profesionales consideren el entorno digital de sus pacientes como parte de la evaluación clínica, analizando qué herramientas utilizan y si estas pueden sumar a la terapia o dificultar el contacto social real.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Guía APA para evaluación de aplicaciones de salud mental:** La Asociación Americana de Psicología ha publicado una guía paso a paso para que los profesionales evalúen la fiabilidad de las herramientas digitales de salud mental antes de recomendarlas a sus pacientes. La guía analiza criterios de valor clínico, seguridad y privacidad, e identifica señales de alerta como la ausencia de política de protección de datos, la falta de respaldo empírico y los diseños orientados a incentivar el uso excesivo.
- **Intervenciones psicológicas web autoguiadas validadas para profesionales sanitarios:** El estudio del IBIMA muestra que intervenciones web autoguiadas que integran terapias de tercera generación —mindfulness, compasión y aceptación— pueden ser eficaces para la prevención y el abordaje del burnout en entornos

sanitarios de alta presión. Su formato escalable y de acceso flexible las convierte en una opción con potencial de implementación en el sistema de salud.

Prioridades del día

Revisar las herramientas digitales que recomendamos o que usan nuestros pacientes

Ante los hallazgos de la APA sobre la falta de privacidad y evidencia en gran parte de las apps de salud mental disponibles, puede ser útil explorar qué herramientas digitales están utilizando los pacientes fuera de sesión. Aplicar criterios básicos de revisión —política de privacidad identificable, respaldo empírico, ausencia de diseño que incentive el uso excesivo— antes de validar cualquier recurso digital.

Considerar la evaluación del burnout en la práctica con profesionales sanitarios

El estudio del IBIMA señala que más de la mitad de los médicos y el 44% de las enfermeras en la muestra presentaban al menos una dimensión de burnout. Si se trabaja con personal sanitario —en intervención individual, grupal o programas de empresa— puede ser relevante incorporar screenings específicos y explorar intervenciones basadas en resiliencia y mindfulness con respaldo empírico publicado.

La distribución autorizada por el Ministerio prevé cambios en la presencia de psicólogos en los centros de salud, aunque su concreción depende de cada comunidad autónoma. Puede ser oportuno revisar los circuitos de derivación

locales y estar atentos a posibles variaciones en el flujo de pacientes procedentes de la sanidad pública hacia la práctica privada.