



Un estudio analiza el riesgo subclínico de psicosis en la adolescencia, se amplía a 2027 el plazo para la factura electrónica de autónomos y la APA repasa en agosto la investigación sobre esquizofrenia: claves del 7 de agosto de 2026

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

La Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, editada por el Consejo General de la Psicología de España, publica en su segundo número de 2026 un estudio sobre redes de síntomas en adolescentes con riesgo subclínico de psicosis y otro sobre el funcionamiento sexual en mujeres con síndromes de sensibilización central. El Real Decreto-ley 15/2025 amplía hasta el 1 de julio de 2027 el plazo para que los autónomos, incluidos los profesionales sanitarios, adapten sus sistemas de facturación al Reglamento Veri*factu. Un estudio publicado en JAMA Psychiatry, que analiza más de 17 millones de publicaciones en la red social X, encuentra que la depresión se asocia a una mayor sensibilidad al refuerzo social de los «me gusta», un hallazgo que contrasta con la literatura de laboratorio previa. La Asociación Americana de Psiquiatría reúne en sus revistas de agosto nueva investigación sobre la etiología de la esquizofrenia y sobre tratamientos combinados en psiquiatría.

Noticias nacionales

Un estudio analiza las redes de síntomas en adolescentes con riesgo subclínico de psicosis

El segundo número de 2026 de la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, revista oficial de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP) y de la Sociedad Universitaria de Investigación en Psicología y Salud (SUIPS), editada por el Consejo General de la Psicología de España e indexada en la Core Collection de Web of Science, SCOPUS y REDIB, incluye un estudio de Mercedes Paino, Inma Fernández, Ana González-Menéndez, Elena García-Vega y Óscar Vallina-Fernández titulado «Redes de Síntomas y Contexto en Adolescentes con Riesgo Subclínico de Psicosis». El trabajo parte de que los trastornos psicóticos surgen de interacciones complejas entre factores genéticos, ambientales y socioemocionales, y de que los criterios habituales de Alto Riesgo Clínico de Psicosis (CHRp) identifican a jóvenes en riesgo pero tienen una escalabilidad limitada en la práctica. Como método complementario, los autores utilizan el Psychosis Risk Score (PRS), un índice dimensional basado en autoinformes, para detectar a adolescentes con riesgo subclínico. A partir de la teoría de redes, que concibe los trastornos mentales como sistemas dinámicos de síntomas y contexto, el estudio explora cómo interactúan los factores emocionales y contextuales según los distintos niveles de riesgo definidos por el PRS, con el objetivo declarado de identificar posibles dianas de intervención temprana.

Fuente: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (Consejo General de la Psicología de España)

Un estudio vincula el trauma y el estrés postraumático con el funcionamiento sexual en mujeres con síndromes de sensibilización central

El mismo número de la revista recoge un estudio de María Pilar Martínez, Carmen Huertas-Gómez, Elena Miró, Raúl Quevedo-Blasco y Ana Isabel Sánchez titulado «Funcionamiento Sexual en Mujeres con Síndromes de Sensibilización Central: El Papel del Dolor y el Estrés Postraumático». Los autores parten de que las personas con síndromes de sensibilización central

(CSS) presentan un marcado deterioro en múltiples ámbitos de vida, incluida la sexualidad, aunque señalan que la evidencia empírica sobre su relación con el trauma sigue siendo limitada. Para explorarlo, realizaron una encuesta online a 1.238 personas de población general, en la que examinaron el funcionamiento sexual, el trauma y sus secuelas, y diversas variables de salud, estado psicológico y de pareja. El estudio compara tres grupos: mujeres con síndromes de sensibilización central (179), mujeres con otras condiciones médicas (137) y mujeres sanas (508), lo que permite valorar de forma diferenciada el peso del dolor crónico y el estrés postraumático sobre la vida sexual en cada uno de estos perfiles.

Fuente: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La Asociación Americana de Psiquiatría reúne en agosto nueva investigación sobre esquizofrenia y tratamientos combinados

El número de agosto de The American Journal of Psychiatry, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, reúne varios trabajos centrados en la etiología y la fisiopatología de la esquizofrenia: un artículo sobre los avances más allá de los estudios de asociación del genoma completo, un análisis de los perfiles transcripcionales de subtipos de interneuronas de somatostatina y parvalbúmina en la corteza prefrontal dorsolateral humana y su relación con la esquizofrenia, un estudio sobre la asociación entre delecciones de genes reguladores fetales y el deterioro cognitivo en esquizofrenia, un trabajo que plantea el receptor cannabinoide CB1 como posible diana terapéutica, y una propuesta de ampliación de la definición de esquizofrenia resistente al tratamiento. El número incluye también un estudio, con el doctor Deepak D'Souza como autor principal, sobre la presentación cognitiva, electrofisiológica y conductual del primer episodio psicótico con o sin exposición previa al cannabis. En paralelo, el número de la revista Focus, dedicado este trimestre a los tratamientos combinados en psiquiatría y coordinado por Andrew van der Vaart y Scott Aaronson, del centro Sheppard Pratt, reúne artículos sobre la

combinación de ketamina y terapia cognitivo-conductual para potenciar la neuroplasticidad, sobre intervenciones digitales y biológicas integradas, sobre los mecanismos de las terapias asistidas con psicodélicos, sobre la estimulación transcraneal de corriente directa aplicada de forma contextual, sobre la combinación de estimulación magnética transcraneal y ketamina para la depresión resistente al tratamiento, y sobre las cuestiones éticas que plantean estos tratamientos combinados y novedosos.

Fuente: American Psychiatric Association (psychiatry.org)

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Software de facturación electrónica certificado según el Reglamento Veri*factu:** Sistemas informáticos de facturación adaptados a los requisitos técnicos del Reglamento Veri*factu, que permiten generar registros de facturación verificables, inalterables y trazables ante la Agencia Tributaria.

Prioridades del día

Preparar con antelación la adaptación a Veri*factu

Aunque el plazo se amplía hasta julio de 2027, puede ser útil ir revisando con antelación qué sistema de facturación se utiliza en la consulta y si ya cumple, o podrá adaptarse, a los requisitos de verificabilidad, trazabilidad e inalterabilidad que exige la nueva normativa.

Incorporar el enfoque de redes de síntomas en la valoración de adolescentes en riesgo

A la luz de estudios como el publicado en la Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, puede ser relevante explorar cómo interactúan los factores emocionales y contextuales en adolescentes con riesgo subclínico de psicosis, más allá de los criterios clínicos tradicionales de alto riesgo.

Los hallazgos sobre la sensibilidad al refuerzo social en la depresión pueden ser útiles para explorar en consulta el uso real de redes sociales de las personas con síntomas depresivos, más allá de los autoinformes generales, ya que el comportamiento real podría no coincidir con lo esperado según los modelos clásicos de anhedonia.