



El Consejo de Ministros mantiene 56,83 millones de euros para la salud mental, el COP-AO reivindica el papel de la psicología en mediación y un estudio de JAMA Network Open vincula el uso diario de IA con más síntomas depresivos: claves del 3 de septiembre de 2026

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El Consejo de Ministros ha autorizado mantener 56,83 millones de euros para reforzar la salud mental y la prevención del suicidio en las comunidades autónomas durante 2026. El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental ha reunido a más de 270 profesionales en una Jornada Nacional de Mediación celebrada en Córdoba, reivindicando el reconocimiento de los psicólogos mediadores como operadores jurídicos. Un estudio publicado en JAMA Network Open, con más de 20.000 adultos estadounidenses, ha encontrado una asociación entre el uso diario de inteligencia artificial generativa y un mayor riesgo de síntomas depresivos, ansiedad e irritabilidad. Y un análisis publicado en Australian Journal of General Practice cuestiona la solidez de la evidencia que respalda el uso prolongado de antidepresivos.

NORMATIVA · NACIONAL

El Consejo de Ministros mantiene 56,83 millones de euros para reforzar la salud mental y la prevención del suicidio en 2026

El Consejo de Ministros autorizó, en su reunión del 12 de mayo de 2026, la distribución territorial de 56.830.000 euros destinados a reforzar las políticas de salud mental y de prevención del suicidio durante el ejercicio presupuestario de 2026, manteniendo la misma cuantía que en el ejercicio anterior dentro de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026. La financiación se divide en dos bloques: 39 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 –de los que 26,8 millones se destinan a gastos corrientes, incluido personal vinculado a la ejecución de proyectos, y 12,2 millones a equipamiento– y 17,83 millones de euros para el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, de los que 12,83 millones se dedican a gastos corrientes y equipamiento y cerca de 5 millones a inversión. La gestión de estos fondos corresponde a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), quedando fuera del reparto la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco por su régimen foral; las administraciones deberán adherirse a las actuaciones financiadas y presentar una memoria de los proyectos para acceder a los créditos. El reparto combina un 5 % de distribución lineal con un 95 % según criterios poblacionales, y por primera vez la equidad, la promoción de los derechos y el enfoque comunitario son criterios obligatorios para aprobar los proyectos. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que recibirán mayor financiación en los distintos bloques.

Fuente: Según informa Infocop, medio oficial del Consejo General de la Psicología de España, citando la nota de prensa del Ministerio de Sanidad

HERRAMIENTA · NACIONAL

El COP-AO reivindica el papel de la psicología en la mediación tras reunir a más de 270 profesionales en Córdoba

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) celebró en junio en Córdoba la Jornada Nacional de Mediación, un encuentro de dos días, en modalidad presencial y online, que reunió a más de 270 profesionales de la psicología, el derecho y otras disciplinas implicadas en la resolución de conflictos. Durante la inauguración, la vicedecana del COP-AO, Ana María Domínguez Álvarez, reivindicó el reconocimiento de los psicólogos y psicólogas mediadores como operadores jurídicos, señalando que su formación específica en comportamiento humano resulta clave para desescalar conflictos y gestionar emociones. El director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón Mata, destacó que el servicio público de mediación penal ha evitado más de 4.200 juicios desde mayo de 2024, y anunció la creación de un nuevo servicio público de mediación civil y mercantil a lo largo de este año. La asesora del área de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, Marina Otero Reina, subrayó el papel de la psicología como ciencia idónea para la gestión de conflictos fuera del ámbito judicial. En las conclusiones, la coordinadora del Área de Psicología y Mediación del COP-AO, Rocío Cordero Belda, y la presidenta de su Delegación de Córdoba, Rocío Parrado Parrado, señalaron que la mediación sigue siendo una herramienta poco conocida por la ciudadanía, pese a que se aplica en ámbitos como el educativo, el laboral, el policial o el intercultural, además del familiar.

Fuente: Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO), a través de Infocop, medio oficial del Consejo General de la Psicología de España

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio de JAMA Network Open vincula el uso diario de inteligencia artificial generativa con más síntomas depresivos en Estados Unidos

Un equipo de investigadores del Massachusetts General Hospital, la Universidad de Harvard y la Universidad Northeastern, entre otras instituciones, ha publicado en JAMA Network Open un estudio que examina la relación entre el uso de inteligencia artificial generativa y los síntomas depresivos en la

población adulta de Estados Unidos. El trabajo analizó datos de una encuesta no probabilística realizada entre el 20 de abril y el 27 de mayo de 2025 a 20.847 adultos estadounidenses de 18 años o más, dentro de la oleada 35 del Civic Health and Institutions Project (CHIP-50), antes denominado COVID States Project. El 10,3 % de los participantes declaró usar inteligencia artificial generativa a diario o con mayor frecuencia, incluyendo un 5,3 % que la usaba varias veces al día; entre estos últimos, el 87,1 % la empleaba para uso personal, el 48,0 % para el trabajo y el 11,4 % para estudios. Los síntomas depresivos se midieron con el cuestionario PHQ-9. En los modelos de regresión ajustados por variables sociodemográficas, un mayor uso de IA se asoció con niveles más altos de síntomas depresivos y con una mayor probabilidad de presentar al menos síntomas depresivos moderados (odds ratio de 1,29; intervalo de confianza del 95 %: 1,15–1,46) en comparación con quienes no la usaban, con patrones similares para la ansiedad y la irritabilidad. Las asociaciones más marcadas aparecieron en quienes usaban la IA para fines personales y en los grupos de edad de 25 a 44 años y de 45 a 64 años. Los propios autores señalan que el diseño transversal del estudio no permite establecer una relación de causa y efecto, y plantean la necesidad de investigar el mecanismo de esta asociación.

Fuente: JAMA Network Open

Publicaciones científicas recientes

Horowitz, M. A., Wallis, K. A., y Moncrieff, J. (2026). Continuing antidepressants or not: Evaluating the potential benefits and harms. *Australian Journal of General Practice*, 55(6), 366–368.

DOI: [10.31128/AJGP-05-25-7690](https://doi.org/10.31128/AJGP-05-25-7690)

Hallazgo: El trabajo, elaborado por investigadores de Adelaide University y The University of Queensland, revisa la evidencia que respalda mantener el tratamiento antidepresivo más allá de doce meses. Los autores señalan que buena parte de esa evidencia procede de los llamados ensayos de prevención de recaídas, en los que se compara a personas que continúan la medicación con otras que la interrumpen de forma abrupta o rápida, sin distinguir adecuadamente entre síntomas de retirada y recaída depresiva. Al revisar el ensayo ANTLER, uno de los más citados a favor de la continuación del

tratamiento, los autores destacan que también informó de síntomas de retirada frecuentes y persistentes. Citan además un metaanálisis que halló tasas de recaída similares entre quienes reducían los antidepresivos de forma gradual con apoyo psicológico y quienes continuaban la medicación. Entre los riesgos asociados al uso prolongado señalan la disfunción sexual, que, según los estudios revisados, puede afectar al 50-80 % de las personas usuarias, además del embotamiento emocional, el aumento de peso, el insomnio y alteraciones cognitivas; también citan estudios observacionales que asocian estos fármacos con mayor riesgo de caídas, enfermedad cardiovascular y mortalidad prematura en personas mayores. Según los datos revisados, los síntomas de retirada pueden prolongarse durante meses o años y afectar hasta al 15 % de quienes han usado estos tratamientos durante largos periodos.

Implicación clínica: Los autores plantean, en términos condicionales, que la continuidad de los antidepresivos podría beneficiarse de una revisión periódica que valore tanto los posibles beneficios como los riesgos, y reclaman una mayor atención a las estrategias de retirada gradual con apoyo psicológico y a la toma de decisiones compartida entre el profesional prescriptor y el paciente.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Aplicaciones móviles de autorregulación del aprendizaje para el ámbito educativo:** Herramientas digitales, validadas científicamente en publicaciones especializadas, que permiten al alumnado autoevaluar sus estrategias de estudio y recibir consejos personalizados para mejorar hábitos como la gestión del tiempo, la motivación o la regulación emocional durante el aprendizaje. Un estudio publicado en la revista *Psicología Educativa* validó psicométricamente una escala de este tipo, integrada en una aplicación para teléfonos móviles, con la participación de más de 2.000 estudiantes universitarios de distintas disciplinas, y confirmó su validez para detectar diferencias en el compromiso académico y la procrastinación.

Prioridades del día

La mediación como recurso complementario en terapia familiar y de pareja

Puede ser útil valorar la mediación como recurso complementario ante determinados conflictos familiares o de pareja, dada la reivindicación del COP-AO de esta vía como alternativa eficaz, humana y de menor coste emocional frente al ámbito judicial.

Preguntar activamente por el uso cotidiano de inteligencia artificial en consulta

Puede ser relevante preguntar a los pacientes, sobre todo a los más jóvenes y a los adultos de mediana edad, por su uso diario de inteligencia artificial generativa, dado que un estudio reciente publicado en JAMA Network Open ha hallado una asociación –no necesariamente causal– entre su uso diario y un mayor riesgo de síntomas depresivos, ansiedad e irritabilidad.

Coordinar con el prescriptor la revisión de tratamientos antidepresivos prolongados

Puede ser oportuno, en pacientes con tratamiento antidepresivo de larga duración, plantear junto con el profesional prescriptor una revisión periódica que distinga entre posibles síntomas de retirada y recaída, apoyándose en el trabajo psicoterapéutico durante una eventual reducción gradual.