OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD EN PSICOLOGÍA

Instituto Politécnico de Psicología

viernes 13 de noviembre de 2026

Resumen rápido del día

Infocop publica una entrevista con Randy W. Kamphaus, quien defiende el cribado periódico de las dificultades emocionales y conductuales en la infancia y sostiene que la mayoría de los casos leves o moderados pasa desapercibida para familias y docentes. El COP Madrid acoge la presentación del segundo estudio «¿Cuánto perdura un deseo?», de la Fundación Pequeño Deseo. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Infocop recoge la guía de la EASD sobre malestar relacionado con la diabetes. Una revisión sistemática de 32 ensayos evalúa la entrevista motivacional breve en el consumo problemático de alcohol. El BOE ya publicó el Real Decreto 707/2026 de accesibilidad cognitiva, que entra en vigor el 2 de enero de 2027.

Noticias nacionales

CLÍNICA · NACIONAL

Kamphaus defiende cribados periódicos para detectar el malestar emocional y conductual infantil que familias y docentes no identifican

Infocop publica el 13 de noviembre de 2026 una entrevista con Randy W. Kamphaus, profesor de la University of Oregon y galardonado con el Premio AITANA 2026. La conversación la realiza Víctor Amorós, investigador de AITANA, con motivo de la conferencia que Kamphaus ofrecerá sobre detección temprana de dificultades subclínicas en el 12th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and Adolescents, que se celebra en Granada del 19 al 21 de noviembre. En la entrevista, Kamphaus afirma que el 90 % de los niños y niñas con problemas conductuales y emocionales de leves a

moderados no son identificados por sus padres ni por sus profesores. El texto no aporta una fuente ni una metodología concretas para esa cifra: el entrevistado se remite a numerosos estudios sin detallarlos. Como apoyo, recuerda un estudio de 2003 realizado con Michele Lease (Universidad de Georgia), con unos 500 alumnos de cuarto y quinto curso. En él, un grupo con problemas internalizantes significativos, con puntuaciones altas en ansiedad, depresión y quejas somáticas, no fue identificado por profesores ni familias, mientras que sus compañeros sí percibían su sufrimiento. Kamphaus defiende la evaluación multiinformante, que combina autoinforme, informe del profesorado e informe de la familia, y propone ofrecer a todos los niños de una comunidad cribados anuales o semestrales, en la escuela y en la atención pediátrica. Recomienda una fiabilidad mínima de 0,90, preferiblemente de 0,95 o superior, y minimizar los falsos negativos aunque aumenten los falsos positivos. Se trata de las posiciones del entrevistado, recogidas por Infocop.

Fuente: Infocop (entrevista de Víctor Amorós a Randy W. Kamphaus, artículo de Susana Villamarín)

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

El COP Madrid acoge la presentación del segundo estudio «¿Cuánto perdura un deseo?» de la Fundación Pequeño Deseo

Infocop informa de la presentación, en el salón de actos del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COP Madrid), del segundo estudio «¿Cuánto perdura un deseo?», desarrollado por la Universidad Pontificia de Salamanca e impulsado por la Fundación Pequeño Deseo. El trabajo analiza la huella emocional a largo plazo de cumplir deseos a niños y niñas con enfermedades graves y cómo esa experiencia se integra en su memoria emocional. Según la información publicada, el 100 % de los participantes recuerda el deseo diez años después, ya como adolescentes o adultos jóvenes, como un momento significativo asociado a emociones positivas. El agradecimiento es la emoción predominante y la experiencia refuerza la esperanza, la solidaridad y el reconocimiento hacia quienes hicieron posible el deseo. El impacto, señala el estudio, no se limita al niño o la niña, sino que se extiende a todo su entorno. El primer estudio, realizado en 2012 junto a la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y el COP Madrid, concluyó que cumplir un deseo aumenta las emociones positivas y reduce las negativas en los niños y

sus familias. En aquella primera investigación, el 97 % de los niños recurría al recuerdo del deseo cumplido para animarse en los momentos más difíciles. En el acto participaron Timanfaya Hernández, decana del COP Madrid, Cristina Cuadrado, directora general de la fundación, Javier Urra y Alberto Palacios, que participó en el primer estudio y habló como adulto. La noticia no indica el número de participantes ni el diseño metodológico, de modo que esos datos habría que consultarlos en el estudio.

Fuente: Infocop

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

Día Mundial de la Diabetes: la guía de la EASD sitúa el malestar relacionado con la diabetes en el 36 % de los adultos con diabetes tipo 2

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre y cuya campaña de 2026 de la OMS lleva el lema «Actuar a tiempo frente a la diabetes», Infocop publica un artículo de Andrea García sobre la necesidad de una atención integral. El texto recoge que, según la OMS, más del 40 % de las personas con diabetes en el mundo no están diagnosticadas. Se apoya sobre todo en la guía de práctica clínica de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), de Speight y colaboradores (2026, Diabetologia). Esa guía incluye un metaanálisis de 55 estudios con 36.998 adultos con diabetes tipo 2, que sitúa la prevalencia global del malestar relacionado con la diabetes en el 36 %. En diabetes tipo 1, un estudio de registro noruego con 10.186 participantes halló niveles elevados de malestar en el 22 %. Según Speight y colaboradores, este malestar no equivale a un trastorno depresivo, aunque puede coexistir con ansiedad o depresión. La guía recomienda incluir de forma habitual conversaciones sobre las dificultades psicológicas y usar instrumentos validados para identificarlas, medir su intensidad y seguir su evolución. Respalda de forma condicionada las intervenciones psicológicas y reconoce limitaciones en la calidad de la evidencia. Por su parte, los Standards of Care in Diabetes 2026 de la American Diabetes Association proponen evaluar periódicamente el bienestar

psicológico (depresión, ansiedad, miedo a la hipoglucemia, alteraciones alimentarias y posibles dificultades cognitivas) y derivar a profesionales de salud mental cualificados cuando la atención habitual no baste.

Fuente: Infocop (artículo de Andrea García, que cita la guía de la EASD, los Standards of Care 2026 de la ADA y la campaña de la OMS)

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Una revisión de 32 ensayos aleatorizados respalda beneficios a corto plazo de la entrevista motivacional breve en el consumo problemático de alcohol

En la víspera del Día Mundial Sin Alcohol, que se conmemora el 15 de noviembre, Infocop recoge la revisión sistemática de Ho, Tsai, Okoli y Hong (2026), publicada en Addictive Behaviors Reports, sobre la entrevista motivacional breve en adultos. La revisión sintetiza 32 ensayos clínicos aleatorizados publicados entre 2015 y 2025, con 6.543 participantes. No hubo metaanálisis por la heterogeneidad de intervenciones, poblaciones, instrumentos y periodos de seguimiento. Las intervenciones duraban entre 1 y 4 sesiones, de 20 a 60 minutos, y se aplicaban sobre todo en atención primaria y urgencias. En 24 de los 32 ensayos (75 %) hubo mejoras estadísticamente significativas a corto plazo en al menos un indicador de consumo, con más frecuencia en episodios de consumo intensivo, días de consumo elevado, consecuencias negativas y puntuaciones del cuestionario AUDIT. Los resultados fueron más consistentes en universitarios y adultos jóvenes (9 de 10 estudios) y en urgencias y contextos hospitalarios (8 de 9). Los beneficios aparecieron sobre todo en los primeros seis meses, y los estudios con contactos posteriores mostraron con más frecuencia mejoras mantenidas. En personas con depresión, ansiedad, TEPT u otros problemas graves de salud mental, los resultados fueron menos consistentes. En cuanto a la calidad, el riesgo de sesgo fue bajo en 3 estudios, con algunas dudas en 26 y alto en 3; el consumo se midió sobre todo por autoinforme y las pérdidas en el seguimiento variaron entre el 9 % y el 38 %. La certeza global de la evidencia se considera moderada.

Fuente: Infocop, que recoge la revisión de Ho et al. (2026) en Addictive Behaviors Reports

Publicaciones científicas recientes

Ho, M.-H., Tsai, J.-H., Okoli, C. T. C., & Hong, R.-M. (2026). Effectiveness of brief motivational interviewing for alcohol misuse: A systematic review of randomized controlled trials. Addictive Behaviors Reports, 24, Article 100727. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2026.100727

DOI: 10.1016/j.abrep.2026.100727

Hallazgo: La revisión sintetiza 32 ensayos controlados aleatorizados publicados entre 2015 y 2025 en adultos con consumo problemático de alcohol. Según el resumen del estudio, la entrevista motivacional breve redujo el consumo y los daños asociados, con beneficios a corto plazo, y disminuyó de forma consistente el consumo episódico intenso y las consecuencias relacionadas con el alcohol. Los efectos fueron más fuertes en poblaciones universitarias y de urgencias.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que los contactos de refuerzo podrían ayudar a mantener los efectos en el tiempo, aunque la evidencia a largo plazo sigue siendo limitada. Puede orientar la planificación de intervenciones breves en contextos asistenciales de primer contacto, teniendo en cuenta que Infocop señala que pueden ser insuficientes cuando coexisten problemas psicológicos, médicos y sociales.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Instrumentos validados de cribado del malestar relacionado con la diabetes:** La guía de la EASD recogida por Infocop recomienda usar instrumentos validados para identificar las dificultades psicológicas en personas con diabetes, medir su intensidad y seguir su evolución. Puede ser útil conocer qué escalas cuentan con validación en población española antes de incorporarlas a la consulta.

– **Escalas multiinformante de cribado emocional y conductual infantil:** Kamphaus defiende combinar autoinforme, informe del profesorado e informe de la familia, y exigir una fiabilidad mínima de 0,90 en las puntuaciones globales de cribado. Puede ser relevante revisar la fiabilidad y la validez de las escalas disponibles en el mercado español antes de usarlas con fines de detección.

Prioridades del día

Revisar cómo se detecta el malestar emocional en infancia y adolescencia

Puede ser útil explorar si, en las evaluaciones con menores, se combinan varias fuentes de información (el propio menor, la familia y el centro escolar) y se tratan las discrepancias entre informantes como información clínica. Puede ser oportuno tener presente que la cifra del 90 % procede de la entrevista y no se acompaña de fuente concreta.

Valorar el malestar psicológico en pacientes con enfermedad crónica

Puede ser relevante incorporar, en pacientes con diabetes, preguntas habituales sobre malestar emocional con instrumentos validados, tal como recoge la guía de la EASD, distinguiendo el malestar relacionado con la diabetes de un trastorno depresivo.

Preparar la documentación de consulta ante la accesibilidad cognitiva

Puede ser oportuno revisar con antelación a enero de 2027 cómo se presentan los consentimientos, las hojas informativas y los informes, para facilitar que cualquier persona pueda comprenderlos y solicitar formatos adaptados.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — viernes 13 de noviembre de 2026