



Un estudio de Oxford cifra en el 34,5 % la exposición adolescente a contenido de autolesión online, la imprevisibilidad infantil se confirma como factor de riesgo en salud mental y el Colegio de Madrid da la bienvenida a sus nuevas personas colegiadas: claves del 8 de agosto de 2026

SÁBADO 8 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio de la Universidad de Oxford halla que un tercio de los adolescentes ingleses se topó con contenido de autolesión online en el último mes, sobre todo por sugerencia del algoritmo. Otro trabajo, del Children's Hospital of Orange County, confirma que la imprevisibilidad del entorno familiar aporta información de riesgo en salud mental que los cribados de adversidad infantil habituales no recogen. Un tercer estudio, de la Universidad de Aarhus, encuentra que la capacidad de percibir señales internas del cuerpo funciona de forma independiente según el órgano. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, por su parte, dio la bienvenida institucional a sus nuevas personas colegiadas.

Noticias internacionales

Un estudio en más de 32.000 adolescentes ingleses halla exposición generalizada a contenido de autolesión online

Un equipo liderado por Holly Bear, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford, analizó los datos de la encuesta OxWell 2025 recogidos entre 32.102 estudiantes de entre 11 y 18 años en Inglaterra, en un estudio publicado en Nature Mental Health. De las 28.797 personas que respondieron a la pregunta sobre exposición a contenido de autolesión, el 34,5 % declaró haberse encontrado con este tipo de contenido en el último mes, mayoritariamente de forma no buscada. Entre quienes reportaron exposición, el 72,9 % la había vivido solo de forma pasiva, un 12,1 % por vías mixtas que combinaban exposición activa y pasiva, y porcentajes menores mediante búsqueda activa (2,7 %) o recepción activa por parte de terceros (3,0 %). La vía más frecuente fue la sugerencia automática del algoritmo del feed (66,2 % de quienes fueron expuestos), seguida del contenido incrustado en otras publicaciones (23,5 %). Cada una de las cinco vías de exposición identificadas se asoció con mayor soledad, más experiencias de agresión o coacción online y peores puntuaciones en ansiedad y depresión frente a quienes no reportaron exposición, con un perfil de riesgo especialmente marcado entre quienes tuvieron exposición activa o mixta. Por su diseño transversal, el estudio no permite establecer causalidad entre la exposición y el malestar psicológico. Las autoras concluyen que reducir el daño requerirá una respuesta de salud pública que combine mayor transparencia algorítmica, alfabetización digital en los centros educativos y apoyo específico para el grupo minoritario que busca este contenido de forma activa.

Fuente: Nature Mental Health

Un estudio de la Universidad de Aarhus halla que la percepción del propio cuerpo funciona de forma independiente según el órgano

Un equipo del Centro de Neurociencia Funcionalmente Integrativa de la Universidad de Aarhus, con Micah G. Allen como autor principal, publicó en Communications Psychology, del grupo Nature, un estudio sobre interocepción,

la capacidad de percibir señales internas del propio cuerpo. La investigación, enmarcada en el Visceral Mind Project, sometió a 241 participantes (167 mujeres y 74 hombres, con una edad mediana de 24 años) a dos pruebas psicofísicas: una tarea de discriminación de la frecuencia cardíaca, en la que debían juzgar si unos tonos auditivos iban más rápido o más lento que su propio pulso, y una tarea de sensibilidad a la resistencia respiratoria, en la que debían identificar cuál de dos inhalaciones había sido más difícil por una carga mecánica aplicada al circuito respiratorio. Los resultados, analizados con modelos bayesianos, no hallaron correlaciones significativas entre el rendimiento cardíaco y el respiratorio ni en sensibilidad ni en precisión, con la excepción de una asociación moderada en la confianza subjetiva sobre el propio juicio. El equipo interpreta estos hallazgos como evidencia de que la interocepción no funciona como una capacidad única y generalizada, sino que es en gran medida específica de cada órgano. Los autores señalan que este resultado obliga a revisar los modelos teóricos que asumen una interocepción unitaria y subraya la necesidad de emplear tareas psicofísicas específicas para cada modalidad, tanto en investigación cognitiva como en el ámbito clínico.

Fuente: Communications Psychology

Publicaciones científicas recientes

Glynn, L. M., Liu, S. R., et al., & Baram, T. Z. (2026). Unpredictability is a childhood adversity that contributes to mental health problems. *Nature Mental Health*, 4(8), 1219–1226.

DOI: [10.1038/s44220-026-00681-x](https://doi.org/10.1038/s44220-026-00681-x)

Hallazgo: El equipo, liderado por Laura M. Glynn y con Tallie Z. Baram como autora responsable, añadió el cuestionario breve de cinco ítems sobre imprevisibilidad en la infancia (QUIC-5) al cribado de adversidad infantil (PEARLS) ya implementado en 19 clínicas pediátricas de la red del Children's Hospital of Orange County, en California. Compararon en cerca de 30.000 niños y niñas la relación de cada cribado con diagnósticos de salud mental. Tanto las puntuaciones de adversidad infantil (PEARLS) como las de imprevisibilidad (QUIC-5) se asociaron de forma dosis-dependiente con mayor probabilidad de depresión, síntomas externalizantes, trastornos del sueño, ansiedad y síntomas somáticos, tanto en el autoinforme de los menores

como en el de sus cuidadores. En el autoinforme juvenil, las odds ratio para quienes tenían cuatro o más exposiciones frente a quienes no tenían ninguna oscilaron entre 1,7 y 7,2 para PEARLS y entre 1,6 y 6,1 para QUIC-5. Al incluir ambos cribados de forma simultánea en el mismo modelo, cada uno aportó información de riesgo independiente del otro, y para los trastornos del sueño el QUIC-5 resultó un predictor más fuerte que el PEARLS.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que incorporar preguntas sobre imprevisibilidad del entorno parental y doméstico puede aportar información de riesgo que los cribados de adversidad infantil habituales no capturan, especialmente en depresión y trastornos del sueño. Los propios autores plantean que esta combinación podría facilitar una detección más temprana de menores vulnerables, aunque señalan que se trata de un estudio observacional realizado en un único sistema sanitario, por lo que su extrapolación a otros contextos asistenciales requeriría más investigación.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Recursos de alfabetización digital sobre algoritmos para adolescentes:** Materiales educativos, disponibles a través de centros escolares y colegios profesionales, orientados a que adolescentes, familias y docentes comprendan cómo los algoritmos de las redes sociales seleccionan el contenido que se les muestra y cómo modificar esa selección o reportar contenido no deseado, en línea con las recomendaciones del estudio de Oxford sobre exposición a contenido de autolesión online.

Prioridades del día

Explorar la exposición pasiva a contenidos de riesgo en redes con pacientes adolescentes

Puede ser útil explorar con las familias y con los y las adolescentes las vías de exposición pasiva a contenidos de autolesión en redes sociales, dado que el

estudio de Oxford asocia incluso la exposición no buscada con mayor soledad y más sintomatología ansiosa y depresiva.

Valorar el cribado de imprevisibilidad del entorno familiar en la anamnesis infantil

Puede ser relevante valorar la incorporación de preguntas sobre imprevisibilidad del entorno doméstico como complemento a los cribados habituales de adversidad infantil, ya que el estudio de Glynn et al. sugiere que aporta información de riesgo no capturada por los cribados de adversidad infantil convencionales.

No asumir una interocepción unitaria al diseñar intervenciones centradas en el cuerpo

Puede ser oportuno no dar por hecho que la capacidad de una persona para percibir señales cardíacas refleja también su capacidad para percibir señales respiratorias, dado que el estudio de Aarhus halla independencia entre ambos dominios; esto puede ser útil al valorar qué modalidad corporal trabajar en cada intervención.