Un estudio con 200 powerlifters españoles halla algún grado de riesgo de TCA en el 22 %, la Comisión Earth–Brain–Health asocia el cambio ambiental con la salud mental y el COP Madrid aborda el acompañamiento tras una tentativa de suicidio: claves del 15 de octubre de 2026

JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Un estudio con 200 powerlifters españoles, recogido por Infocop, halla algún grado de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en el 22 % de la muestra. El COP Madrid organiza, según informa Infocop, una mesa redonda sobre el acompañamiento a las familias tras una tentativa de suicidio, y la Academia de Psicología de España convoca un webinar gratuito sobre salud mental y salud para el 21 de octubre. La Comisión Earth–Brain–Health, publicada en Nature Mental Health, asocia el calor, la contaminación del aire y el ruido, entre otros factores ambientales, con depresión, ansiedad y deterioro cognitivo, aunque la solidez de la evidencia varía.

Noticias nacionales

INVESTIGACIÓN · NACIONAL

Un estudio con 200 powerlifters españoles halla algún grado de riesgo de TCA en el 22 % de la muestra

Infocop recoge un estudio de la Universitat de València, publicado en 2026 en la Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, que analiza la relación entre las prácticas de control de peso y los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en powerlifters españoles. Los autores, Gerardo J. Cobo, Enrique Cantón y David Peris-Delcampo, trabajaron con 200 deportistas residentes en España, de entre 18 y 40 años, y emplearon el Cuestionario de Hábitos Alimentarios en Deportistas (CHAD), un instrumento validado que evalúa el miedo a engordar, la autoimagen corporal y el malestar psicológico relacionado con el peso. Según el resumen del artículo, se trata de un estudio transversal. El 22 % de la muestra presenta algún grado de riesgo de TCA: un 11,5 % con riesgo moderado y un 10,5 % con riesgo alto. Las mujeres puntúan más alto en todas las dimensiones evaluadas, mientras que no se observan diferencias significativas por edad ni por categoría de peso. El volumen de entrenamiento, medido en días y horas, no se asocia con un mayor riesgo, y la frecuencia de entrenamiento muestra una ligera relación negativa con el malestar psicológico. Como contexto, la noticia indica que el número de deportistas de powerlifting afiliados en España se ha duplicado en unos cinco años y que la prevalencia de TCA en la población general europea se sitúa en torno al 2,2 %. Los autores concluyen que el riesgo depende de factores biopsicosociales, como la presión sociocultural, las expectativas del entorno y las características individuales, y proponen estrategias de prevención, evaluación e intervención específicas para este deporte.

Fuente: Infocop (estudio publicado en la Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico)

CLÍNICA · NACIONAL

El COP Madrid aborda el acompañamiento psicológico a las familias tras una tentativa de suicidio

Infocop informa de una mesa redonda sobre el acompañamiento psicológico a las familias tras una tentativa de suicidio, organizada por el Grupo de Trabajo de Estudios e Investigación de la Conducta Suicida del COP Madrid con motivo

del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Intervienen Álvaro Toledo, coordinador del grupo de trabajo, y Javier Muñoz, psicólogo especializado en la prevención de la conducta suicida. Según la noticia, el programa aborda las reacciones emocionales habituales de los familiares tras una tentativa, los factores protectores, las pautas de comunicación que favorecen la protección y la recuperación de la persona afectada y las estrategias de autocuidado para los familiares. También analiza los errores o las respuestas frecuentes que pueden aumentar el malestar o dificultar la recuperación. El objetivo declarado es proporcionar a los profesionales herramientas específicas para acompañar tanto a quien ha realizado la tentativa como a su familia, reforzar la formación especializada sobre las necesidades de las familias y atender al sistema familiar en su conjunto. La actividad se dirige a profesionales y estudiantes de Psicología. El artículo no precisa la fecha, la hora ni el formato de la mesa redonda, ni indica cómo inscribirse o si tiene coste, por lo que esos detalles deben consultarse directamente con el COP Madrid.

Fuente: Infocop

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

La Academia de Psicología de España convoca un webinar gratuito sobre salud mental y salud el 21 de octubre

Infocop difunde un webinar gratuito de la Academia de Psicología de España (APE) titulado «Salud mental o salud. Divide y perderás», que forma parte de su ciclo «Los Miércoles con la Academia». La sesión se celebra el miércoles 21 de octubre de 2026, de 19:00 a 20:30 horas, en formato online a través de Zoom, y puede seguirla cualquier profesional o persona interesada desde cualquier lugar del mundo. María Paz García Vera, Académica de Número de la APE, modera la sesión, e interviene Miguel Ángel Vallejo Pareja, también Académico de Número. Según la noticia, el contenido gira en torno a la relación entre la salud mental y la salud y a la importancia de abordar ambas desde una perspectiva integrada, en un espacio de intercambio de ideas con opinión experta. La inscripción es gratuita mediante un formulario de registro de Zoom enlazado en el artículo, y la información adicional está disponible en la página del evento en la web de la APE. El ciclo propone espacios de análisis y discusión sobre temas relevantes para la Psicología. Infocop no indica si la

sesión da derecho a certificado ni a créditos de formación, y tampoco ofrece más datos sobre el calendario del resto del ciclo.

Fuente: Infocop

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

Una comisión en Nature Mental Health asocia el cambio ambiental con depresión, ansiedad y deterioro cognitivo

Nature Mental Health publicó en línea el 12 de octubre de 2026 el informe de la Comisión Earth–Brain–Health, firmado por un amplio grupo de autores entre los que figuran Gunter Schumann, Jürg Luterbacher, Andreas Meyer-Lindenberg y Paul Thompson. Según su resumen, el cambio ambiental está alterando las condiciones en las que se desarrolla el cerebro y se sostiene la salud mental. El calor, la contaminación del aire, el ruido, los fenómenos meteorológicos extremos, la urbanización y la pérdida de espacios verdes se asocian con depresión, ansiedad y deterioro cognitivo, aunque la solidez de la evidencia varía. Los efectos recaen con más fuerza sobre países de ingresos bajos y medios, pequeños estados insulares en desarrollo, niños, personas mayores, personas con discapacidad y grupos marginados, que están poco representados en la investigación. Los mecanismos descritos son biológicos (neuroinflamación, alteraciones endocrinas y circadianas, cambios epigenéticos), psicológicos (pérdida de control y de sentido) y sociales (desplazamiento, aislamiento), y pueden ser más graves durante los periodos sensibles del desarrollo y parcialmente irreversibles. El informe identifica como principales obstáculos los organizativos y financieros, y propone ocho recomendaciones orientadas a la prevención anticipada a lo largo de la vida, a entornos diseñados para la salud mental y a una distribución más justa de la exposición. Su meta principal es que, en diez años, ninguna intervención ambiental, climática o urbana importante se planifique ni se evalúe sin incluir la salud cerebral y mental como resultados. El texto completo está tras un muro de pago, por lo que esta nota se basa en el resumen y en los metadatos publicados.

Fuente: Nature Mental Health (informe de la Comisión Earth–Brain–Health)

Publicaciones científicas recientes

Cobo, G. J., Cantón, E., & Peris-Delcampo, D. (2026). Del peso en la tarima al peso en la mente: relación entre prácticas de control de peso y síntomas de TCA en powerlifters españoles. Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, 11, Artículo e4. https://doi.org/10.5093/rpadefa4

DOI: 10.5093/rpadefa4

Hallazgo: En una muestra de 200 powerlifters españoles de entre 18 y 40 años evaluados con el CHAD, el 22 % presentó algún grado de riesgo de TCA, con un 11,5 % de riesgo moderado y un 10,5 % de riesgo alto. Las mujeres puntuaron más alto en todas las dimensiones evaluadas, no hubo diferencias significativas por edad ni por categoría de peso y el volumen de entrenamiento no se asoció con un mayor riesgo. El resumen del artículo describe un diseño transversal.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que el riesgo de TCA en este deporte no se explica solo por el peso corporal ni por la carga de entrenamiento, y pueden orientar el diseño de estrategias específicas de prevención, evaluación e intervención. El diseño transversal no permite establecer relaciones causales, y los autores recomiendan investigación longitudinal que tenga en cuenta el género.

Schumann, G., et al. (2026). Earth–Brain–Health Commission. Nature Mental Health, 1-32. https://doi.org/10.1038/s44220-026-00737-y

DOI: 10.1038/s44220-026-00737-y

Hallazgo: El informe de la comisión revisa cómo el calor, la contaminación del aire y el ruido, los fenómenos meteorológicos extremos, la urbanización y la pérdida de espacios verdes se asocian con depresión, ansiedad y deterioro cognitivo, con una solidez de la evidencia que varía según el factor. Describe mecanismos biológicos, psicológicos y sociales, y señala que los grupos más afectados están poco representados en la investigación. La lista de autores del

registro consultado aparece truncada y el texto completo no es de acceso abierto, de modo que esta descripción se basa en el resumen.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que puede ser pertinente incorporar la salud cerebral y mental como resultado en la evaluación de intervenciones ambientales, climáticas y urbanas, que es la meta que propone la comisión para los próximos diez años. Al tratarse de un informe de comisión con evidencia de solidez variable, sus conclusiones deben leerse como orientaciones y no como efectos causales confirmados.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Cuestionario validado de hábitos alimentarios en deportistas:** El estudio sobre powerlifters empleó un cuestionario validado para deportistas, el CHAD, que evalúa el miedo a engordar, la autoimagen corporal y el malestar psicológico relacionado con el peso. Los autores recomiendan estrategias de evaluación específicas para este deporte, y la fuente consultada no detalla los puntos de corte de cada nivel de riesgo.

Prioridades del día

Explorar el riesgo de TCA en deportistas de fuerza

Puede ser útil incluir en la valoración de deportistas de fuerza preguntas sobre miedo a engordar, autoimagen corporal y malestar por el peso, ya que el estudio observa algún grado de riesgo en el 22 % de 200 powerlifters. Se trata de un diseño transversal, que no permite hablar de causalidad.

Revisar la formación sobre el trabajo con familias tras una tentativa

Puede ser relevante revisar los contenidos de formación sobre reacciones emocionales de los familiares, pautas de comunicación y autocuidado, que son los que, según Infocop, aborda la mesa redonda del COP Madrid.

Considerar el entorno ambiental como factor contextual

Puede ser oportuno tener en cuenta, como factor contextual en la evaluación clínica, la exposición a calor, contaminación, ruido o falta de espacios verdes, con la cautela de que la propia comisión reconoce que la solidez de la evidencia varía.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — jueves 15 de octubre de 2026