

17.

- अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है तथा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8° उत्तरी अक्षांश से 37° उत्तरी अक्षांश है।
- भारत की कुल अक्षांशीय दूरी 29° है। - इसका देशांतरिय विस्तार 68° पूर्वी देशांतर से 97° पूर्वी देशांतर है।

18.

- भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में एक-दूसरे को आपस में काटती है।
- यह मानक समय रेखा भारत के उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है।
- कर्क रेखा देश के 8 राज्यों - गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, एवं मिजोरम से होकर गुजरती है।

19.

- अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से 20 किमी. दूर पुष्पावर्ती नदी की घाटी में स्थित है।
- यह घाटी महान हिमालय और जास्कर श्रृंखलाओं की हिमाच्छादित चोटियों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में है।
- घाटी के बीचों-बीच बहने वाली पुष्पावर्ती नदी के दोनों किनारों पर पहाड़ी ढालों पर खिलने वाले रंग-बिरंगे मौसमी फूल और घास के मैदान इस घाटी की खूबसूरती में चार चाँद लगा देते हैं।

20.

- पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है।
- सौर ऊर्जा की मदद से उत्पादक (समस्त पेड़-पौधे) प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा अन्य दोनों उपभोक्ता वर्ग इस पर निर्भर रहते हैं।
- सूर्य ऊष्मा की कमी से पारितंत्र की उत्पादकता और जैव-विविधता दोनों में कमी आती है।

21.

- पर्यावरण के निर्माण व विकास में सहायक वनस्पति को पारिस्थितिकी वृक्ष कहा जाता है।

- यूकेलिप्टस भूमि की नमी का अवशोषण कर उसे बंजर भूमि में परिवर्तित कर देता है इसलिए ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहलाते हैं।
- बबूल, नीम तथा पीपल पारिस्थितिकी मित्र है।

22.

- प्रत्येक पोषण स्तर (trophic level) पर, जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा श्वसन के माध्यम से ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में चला जाता है। जब एक जीव अपने दैनिक कार्यों (जैसे चलना, शिकार करना, भोजन पचाना) के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, तो यह श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिससे ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है।
- यह ऊर्जा क्षय ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम (Second Law of Thermodynamics) के अनुसार होता है, जो कहता है कि ऊर्जा के प्रत्येक स्थानांतरण में कुछ ऊर्जा अनुपयोगी रूप (जैसे ऊष्मा) में खो जाती है।

23.

- उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में आबनूस (एबोनी), महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं।
- उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में बाँस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, पीपल, दुर्गा, महुआ, आँवला, सेमल, कुसुम और सागोन आदि वृक्ष पाए जाते हैं।
- उष्ण कटिबंधीय काँटेदार वन बबूल, बेर, खजूर, खैर, खेजड़ी और पलाश आदि पाए जाते हैं।
- पर्वतीय वन चीड़, देवदार, सिल्वर-फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं।
- मैंग्रोव वन में नारियल, ताड़, क्योडा व एँगार के वृक्ष पाए जाते हैं।

24.

- भारत में 'शोला' वन विंध्याचल पहाड़ियों पर नहीं पाए जाते हैं।
- नीलगिरि, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण वनों को शोला के नाम से जाना जाता है।
- इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैंग्रोलिया, लॉरेल, सिनकोना और वैटल आर्थिक महत्त्व के हैं।